



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: 2020 ജനുവരി 23 മുതൽ ജനുവരി 27 വരെ)



കണ്ണൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിലിക്കോട്-ഉം
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുനരീതിക്കുന്നത്

വിളക്കുന്ന നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ 07/2021

തീയതി: 22/01/2021

എ. പിന്നീടു നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
0.0	33.2 – 34.3	23.9-24.5	65–90	06 -08

ബി. വരുന്ന അന്വേദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	23.01.2021	24.01.2021	25.01.2021	26.01.2021	27.01.2021
മഴ, മി.മീ	0	0	0	0	0
കുടിയ താപനില, °C	33	33	33	33	33
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	25	25	25	25	25
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	80	80	80	80	80
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	60	60	60	60	60
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	6	5	7	5	5
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	320	230	230	270	210
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	0	1	2	2	2

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫട്ടം	പ്രധാനങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ								
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ		മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല. നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ പച്ചകരികളിൽ വാട (ബാക്കിരിയ, പുഷ്ട മുലമുള്ള) രോഗങ്ങൾ പടരുന്നതിന് അനുകൂലമാകും									
തെങ്ങ്	വിവിധ ഫട്ടം	<p>കൊന്നൻ ചെല്ലി</p>  <table border="0"> <tr> <td>ഉയരം</td> <td>കുറഞ്ഞ</td> </tr> <tr> <td>തെങ്ങിനങ്ങൾ</td> <td>പൊതുവെ</td> </tr> <tr> <td>കുടുതൽ</td> <td>ആക്കമണ</td> </tr> <tr> <td>വിഡേയരാണ്</td> <td></td> </tr> </table>	ഉയരം	കുറഞ്ഞ	തെങ്ങിനങ്ങൾ	പൊതുവെ	കുടുതൽ	ആക്കമണ	വിഡേയരാണ്		<p>തെങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുനിന്നും ചെല്ലിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ണുകളെ കുത്തിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ബോർഡോ കൂഫൻ കോണ്ട് വണ്ണുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിരക്കുന്നത് മുൻവിൽ കുടി ഉണ്ടായെങ്കാവുന്ന പുഷ്ട ബാധയെ തടയാൻ സഹായിക്കും.</p> <p>2. തെങ്ങിന്റെ മും വ്യത്തിയാക്കിയ ശേഷം 6 ശ്രാം ഫെർട്ടറി (Ferterra) 250ശ്രാം മണിലും കുടിക്കലെർത്തിയ മിശ്രിതം നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ പരിചരണം 3 പ്രാവശ്യം -ജനുവരി, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യണം.</p> <p>തോട്ടങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം അവലംബിക്കുക.</p>
ഉയരം	കുറഞ്ഞ										
തെങ്ങിനങ്ങൾ	പൊതുവെ										
കുടുതൽ	ആക്കമണ										
വിഡേയരാണ്											

പച്ചക്കറികൾ	വിവിധ ഘട്ടം	ബാക്കീരിയൽ വാട്ട് 	തടത്തിൽ ഷ്ടീച്ചിംഗ് പാഡർ 25 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി തയ്യാറാക്കിയ ലായൻ കുതിർക്കുക . രണ്ട് ദിവസം കഴിത്തെ സർട്ടേഫോറേസ്റ്റിൽ 500 മീലിഗ്രാം പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി ഇലകളിൽ തളിക്കുക. വീണ്ടും രണ്ട് ദിവസത്തിനു ശേഷം രൈറ്റോലാൻ 3ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തിയ ലായൻ തടത്തിൽ കുതിർക്കുക.
വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകൾ	വിവിധ ഘട്ടം	വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകളിൽ വൈററിസ് രോഗം 	രോഗം വന്ന ചെടികൾ പരിചെടുത്ത് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുക. രോഗം പരത്തുന്ന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായി ദൈഹമെൻസ് തയ്യാറാൻ 1 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.
വഴുതന	വിവിധഘട്ടം	എപിലാക്ട് വണ്ട് 	എപിലാക്ട് വണ്ട് വണ്ടിന്റെ എല്ലാ വളർച്ചാഫെജാളും നശിപ്പിച്ചു കളയുക. വേപ്പെല്ലു വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം 20 മിലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി ഒഴിക്കുക. വേപ്പെല്ലു കുരു സത്ത് 5 ശതമാനം വീരുത്തിൽ കലക്കി ഒഴിക്കുക
കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ	വേരിലെ മീലി മുടകൾ: മുഖപ്പത്തിയ ഇലകൾ കട്ടും മണ്ണ നിറത്തിലാവുകയാണ് ബാഹ്യ ലക്ഷ്യം. തടത്തിലെ മൃഗ്ഗ് നീക്കിയാൽ മീലി മുടകൾ വേരിൽ പറിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. 	തടത്തിലെ മൃഗ്ഗ് നീക്കിയതിനു ശേഷം തടത്തിൽ കോർപ്പോറേസ് കീനാൾ ഒന്നിന് (രണ്ടു മീലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) കുതിർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളി ഓനിന് മുപ്പതു ഗ്രാം വീതം ഫിപ്പോൺിൽ തരികൾ വീതരുകയോ ചെയ്യുക.

ഒപ്പ്/-

നോസ്യൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി