



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈളളാനിക്കര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



ഒല്ലുക്കര ബോക്സ്, തൃശ്ശൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കുഷ്ണി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 44/2020(87), ചൊല്ലുച്ച്

തീയതി 27.10.2020

അടുത്ത 5 ദിവസത്തെക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	28.10.2020	29.10.2020	30.10.2020	31.10.2020	01.11.2020
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	16.5	7.1	2.5	10.7	16.5
ഉയർന്ന താപനില (°C)	36.7	37.2	35.2	35.9	36.3
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	23.7	24.1	24.5	24.9	24.7
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദേഹ (%)	97	96	94	96	95
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദേഹ (%)	50	50	55	51	53
കാറ്റിന്ത്യേഗത(കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	4	4	3	4	3
കാറ്റിന്ത്യേ ദിശ (ഡിഗ്രി)	68	113	248	60	64
മേഘവ്യാപ്തി (കെട്ട)	5	6	7	7	8

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ സാമാന്യം ദേശീയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ കീടനാശിനിപ്രയോഗം നടത്തരുത്.		
നെല്ല് (മുണ്ടകൾ) ഞാറുപരുവം	ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴു	മുട്ടികെട്ടിയ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാൽ, നെല്ലിൽ ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിന് 2 സിസി ടെട്ടക്കോഗ്രം കാർബ് ചെറു കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വയലിന്റെ പലാശത്ത് ഓലയുടെ അടിഭാഗത്തായി കൂട്ടി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 2 മിലി ക്രീനാൽഫോസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈളളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു തജിക്കുക.
	പട്ടാളപ്പുഴു	നെല്ലിൽ പട്ടാളപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി, <ul style="list-style-type: none"> • പാടത്ത് കുറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂറുകില്ലും വൈള്ളം കെട്ടി നിർത്തുക. • നെൽ ചെടികളിലും പാടത്തിന്റെ വരവുകളിലും കളകളിലും 3 മി.ലി ക്രോംബൻടനിലിപ്പോൾ പത്ത് ലിറ്റർ വൈളളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ വളരെത്താടാപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. • നടീൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പാടങ്ങളിൽ ക്രോംബൻടനിലിപ്പോൾ ശ്രാന്തുശിശി 4 കി.ഗ്രാം ഒരു ഏക്കരിൽ എന്ന തോതിൽ വളരെത്താടാപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. • പാടവരവും ചുറ്റുപാടുകളും കള വിമുക്തമാക്കുക.
പാഴ	നടീൽ പരുവം	വാഴ നടുന്ന സമയത്ത് ഒരോ വാഴക്കും 250 ഗ്രാം കുമ്മായം വീതം ഇട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
വഴുതന	വൈളളിച്ച	വഴുതനയിൽ വൈളളിച്ചയുടെ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2 ശതമാനം വീരുമുള്ള വേപ്പേണ്ണ് വൈളുത്തുള്ളി എമർഷർഷൻ തജിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ലെക്കാനിസീലിയം ലെക്കാനി എന്ന മിത്രകുമിൾ 20ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈളളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി പത്തു ദിവസം ഇടവിട്ട് തജിക്കുക.
മുഗസംരക്ഷണം	അധിക അഴുതമുലമുള്ള ദഹനക്കേട് ഒഴിവാക്കുവാനായി 30 ഗ്രാം സോഡാപോട്ടിയും 1 ടിസ്പുണ്ട് യീസ്റ്റ് കുതിർത്തതും തീറ്റയിൽ ചേർത്ത് ദിവസേന നൽകുക.	