



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈജ്ഞാനികര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



എറണാകുളം ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എന്റ് 06/2019(11), ചൊല്ലാഴ്ച

തീയതി 05.02.2019

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	06.02.2019	07.02.2019	08.02.2019	09.02.2019	10.02.2019
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	0.3	0.2	0	0	0
ഉയർന്ന താപനില (°C)	33	32	32	32	32
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	24	24	24	24
മേഘവ്യാപ്തി (കേംടി)	7	6	5	5	5
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	95	95	95	95	95
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	50	50	50	50	50
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	8	14	18	18	16
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	250	250	290	320	290
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ വരും 5 ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല.					

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

പിളകൾ	വളർച്ചാവലട്ടം	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
സൗല്പ് (കോർപ്പാടങ്ങളിൽ)	പാലുറയ്ക്കുന്ന പരുവം	മുഖ്യ	സൗല്പിലെ മുണ്ടായ നിയന്ത്രിക്കാൻ <ul style="list-style-type: none"> ➤ പാടങ്ങളിലെ വൈള്ളം വാർത്ത കളയുക ➤ രണ്ട് ശ്രാം തയാമതോക്ക്‌സാം പത്ത് ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 മില്ലി ഇമിലിയാങ്കോപിഡ് പത്ത് ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക.
വാഴ	-	കുറുനാമ്പുരോഗം	കുറുനാമ്പുരോഗമുള്ള വാഴ വെട്ടി സർപ്പിക്കുക. വാഴപോന്ന് ഇംഗ്രേഷ് രോഗം പരത്തുന്നത്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 1.5 മില്ലി ദൈഹമത്തോയെറ്റ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.
തെങ്ങ്	-	കുമ്പുചീയൽ	തെങ്ങിലെ കുമ്പുചീയൽ രോഗത്തിന്റെ മുൻകരുതലായി സുപ്പിരഞ്ഞൾ ഇട മാക്കാസെബ് സാഷ് (5 ശ്രാം) മുന്നുപായ്ക്കൾ വീതം ഒരോ തെങ്ങിന്റെ കുമ്പിനു ചുറ്റും വയ്ക്കുക. കുടാതെ മണഡിലെ അഴുകിയ ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിമാറ്റി, കുമ്പിൽ ഭോർഡോ കുഴന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക.
പച്ചക്കറികൾ (പയർ)	കായ്ക്കുന്ന പരുവം	ഇലപോറ്റ്	പയറിലെ ഇലപോര്റ്റിന്റെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാൻ പാകമായ പയർ വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം 2 മില്ലി ഫിലോപോന്റ് 5SC ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക.
മുഖസംരക്ഷണം	തൊഴുത്തിലും മേച്ചിൽ സമലങ്ങളിലും കുടിക്കാൻ ശുശ്വരം ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക. കൊതുകു മുട്ടയിട്ടു പെരുകുന്നത് തയ്യാറാക്കി വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക. (സി.എ.എ.ഡി.ഇ.സി.സി.എസ്., കെ.വി.എ.എസ്.യു., മണ്ണുത്തി)	മുഖ്യ	പയറിൽ മുഖ്യയുടെ ആക്രമണം കണ്ണാൽ 2% വീരുമുള്ള വേഹപ്പുണ്ണ് എമർഷണൾ തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിസിലിയം ലൈക്കാൻ എന്ന മിത്രകുമിൾ 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ 10 ദിവസം ഇടപിട്ട കൊടുക്കുക. രൂക്ഷമാണകിൽ 3 മി.ലി ഇമിലിയാങ്കോപിഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ശ്രാം തയാമതോക്ക്‌സാം 10 ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക.