



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളട്ടിൻ



എറണാകുളംജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്താട തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എൽ 13/2021 (25) ചൊല്ലാഴ്ച

തീയതി 23.03.2021

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	24.03.2021	25.03.2021	26.03.2021	27.03.2021	28.03.2021
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	5	5	3	1	2
ഉയർന്ന താപനില (°C)	33	33	33	33	33
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	25
കൃടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ധത (%)	90	90	90	90	90
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ധത (%)	57	57	57	57	57
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	18	18	16	18	20
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ധിഗ്രി)	270	270	250	250	250
മേഘവ്യാപ്തി (കെംട്ട്)	7	7	6	2	7

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സാമാന്യം ദേശപ്പെട്ട മശക്ക് സാധ്യത. കേരളത്തിൽ ശരാശരി മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: കാർഷികോൽപ്പനാങ്ങൾ ഉണക്കുന്നോഴ്സ്, കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്തുന്നോഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.		
നെല്ല് (മുണ്ടകൾ) കൊയ്ത്തു പരുവം	ചാഴി	നെല്ലിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചാഴിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടവും വരവും കൂടുതലിലൂപ്പം വരുത്താക്കുക. ഒരു പാടശേഖരത്ത് ഒരേ മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് കൃഷി ഇരകി ഒരേ സമയത്ത് കീടനാശിനി പ്രയോഗം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മത്തി ശർക്കര മിശ്രിതം 20 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കൈറ്റിൻ അധിഷ്ഠിത സ്വീവോമോണാസ് 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ തളിക്കുക. ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ പത്ര മില്ലി അസാധിയാക്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മില്ലി മാലത്തയോൺ ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലകി തളിക്കുക. (ചാഴിക്കെത്തിരെ കീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് രാവിലെ 9 മണിക്ക് മുമ്പോ, വൈകീട്ട് 3 മണിക്കു ശേഷമോ ആയിരിക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുതളി പരാഗണത്തെ പ്രതികുലമായി ബാധിക്കും).
തെങ്ങ്	പരിചരണം	അന്തരീക്ഷം ഉപയോഗം ചെയ്യോ പ്രയോഗം, ഉണങ്ങിയതോ ആയ ചകിരിയിട്ട് മുടുന്നത് നല്കാണ. തെങ്ങിന്റെ ചുവപ്പിൽനിന്ന് മുന്നോറ്റ് അകലാത്തതിൽ വരികൾക്കിടയിൽ ചാലുകൈരിയോ, ഓരോ തെങ്ങിന്റെ കടയ്ക്കപ്പെട്ടും തടിയിൽനിന്നും രണ്ട് മില്ലി അകലാത്തതിൽ വട്ടത്തിൽ ചാലുകൈരിയോ, അതിൽ ചകിരി നിർത്തിയ ശേഷം മണ്ണിട്ടുമുട്ടാം. ചകിരിയുടെ കൂഴിന്തെ ഉൾഭാഗം മുകളിലേയ്ക്ക് വരത്തകവിധിയിലാണ് ചകിരി ചാലുകളിൽ അടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനുമുകളിൽ മണ്ണിട്ടുമുട്ടാം. ചകിരി അടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം 5-7 വർഷക്കാലം നിലനിൽക്കും. ചകിരിക്കുപകരം ചകിരിപ്പേരും തെങ്ങാനിന് 25കി.ഗ്രാം ഏന്നതോതിൽ ഓരോവർഷവും തടത്തിലിട്ട് മുടുന്നതുമുള്ളപ്പെട്ടും സംരക്ഷിക്കാൻ ഉതകും.
പച്ചക്കറികൾ	നീരുറ്റികുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾ	അന്തരീക്ഷ ഉപയോഗം കൂടി വരുന്നതിനാൽ നീരുറ്റികുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ആച്ചയിലെഡാരികൾ 2% വീരുമുള്ള വേപ്പുള്ളവൈള്ളത്തുള്ളി മിശ്രിതം തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 20 ഗ്രാം ലക്കാനിസീലിയം ലക്കാൻ ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലകി തളിക്കുക
മുഗസംരക്ഷണം	കനുകാലികൾക്ക് അപകടകാരികളായ സുര്യ പിക്കിരണങ്ങൾ എൽക്കരാതിരിക്കാൻ കാലത്ത് 9 മണിക്ക് മുൻപോ വൈകീട്ട് നാല് മണിക്ക് ശേഷമോ മാത്രം മേയാൻ അനുവദിക്കാവു. അതിൽ തന്ന വൈകീട്ട് മേയാൻ വിടുന്നത് ആൺ കൂടുതൽ നല്കു	