



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വെള്ളാനിക്കര
Email: cohagmet@kau.in&kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



എറണാകുളംജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എന്ന് 20/2020(40), വെള്ളിയാഴ്ച

തീയതി 15.05.2020

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	16.05.2020	17.05.2020	18.05.2020	19.05.2020	20.05.2020
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	10	10	20	20	10
ഉയർന്ന താപനില (°C)	34	34	34	34	34
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	25
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദേഹ (%)	92	92	92	92	92
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദേഹ (%)	67	67	67	67	67
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	12	14	16	20	22
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	270	290	340	340	320
മൊലവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	8	8	8	6	8

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ സാമാന്യം ദേശീയ മഴയ്ക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സമലാജിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യത.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ:വിളകളെ രോഗകീടങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്, മുൻകരുതലായി ജൈവകീടരോഗ നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.		
തെങ്ങ്	കൊന്ധവച്ചലി	തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡ നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം250 ശ്രാം വേപ്പിന് പിണ്ണാക്ക് തുല്യ അളവിൽ നേർത്ത മണലുമായി (250 ശ്രാം)ചേർത്ത് കുറേപാലയുടെ ചുറ്റുമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ഇലക്കവിളുകളിൽ നന്നായി നിറക്കുക. പർഷ്യത്തിൽ മുന്നു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ആവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.(ജനുവരി,മെയ്,സെപ്റ്റംബർ,ഐക്കണ്ടാബർ)അല്ലെങ്കിൽ നാവപ്തലിൻ്/പാറ്റഗുളികകൾ 120 ശ്രാം (ഏറ്റവേശം 4 ഏണ്ട്)45 ദിവസത്തിലോരുക്കിൽ കുറേപാലയുടെ ചുറ്റുമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ ഇലക്കവിളുകളിൽ നേർത്ത മണലോടുകൂടി മുടുകയും ചെയ്യാം.അല്ലെങ്കിൽ വളം കുഴികളിൽ മെറ്റാരെസിയം അരെനസൊപ്പിയേ(250 മി.ലി. മെറ്റാരെസിയം കൾച്ചർ+750 മി ലി. വെള്ളം) തളിക്കുക.
ജാതി	ഇല പൊഴിച്ചിൽ	ജാതിയിൽ ഇലപൊഴിച്ചിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീരമുള്ള ഭോംഡോ മിഗ്രിതം കലക്കി തളിച്ചി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
വാഴ	പിണ്ടിപ്പുഴു	വാഴയിൽ പിണ്ടിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണത്തിന് മുൻകരുതലായി 50 ശ്രാം വേപ്പിന്റെപിണ്ണാക്ക് പൊടിച്ചത് ഇലക്കവിളുകളിൽ ഇടുക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ	-	ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞളും നടുന സമയമാണ്. മുട്ട് ചീയൽ രോഗം തടയുന്നതിനായി പിത്തിഞ്ചി 0.3% മാക്കോസെബ്/സ്യൂഡോമോണാസ് ലായനിയിൽ 30 മിനിറ്റ് മുക്കിവെച്ച ശേഷം നടുക.
പച്ചകരികൾ	-	പച്ചകരികൾ നടുവേംഡ് മണ്ണിൽ സ്യൂഡോമോണാസ് കൾച്ചർ ചേർക്കുന്നതു വഴി കുമിൾരോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ തടയാവുന്നതാണ്