



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം, ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്,
വെള്ളാനിക്കര.

കാർഷിക നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ
(ടെലിഫോൺ:04872371931)

എറണാകുളം

E mail: kauagmet@yahoo.co.in, cohagmet@kau.in

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 26/15, ചൊവ്വാഴ്ച

തീയതി 23..06.2015

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	24.06.2015	25.06.2015	26.06.2015	27.06.2015	28.06.2015
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	26	16	28	54	44
ഉയർന്ന താപനില (°C)	32	32	32	32	32
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	25
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	8	7	8	8	8
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	90	90	90	90	90
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	80	80	80	80	80
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ)	018	018	018	018	018
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	250	250	250	270	270

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാഘട്ടം/രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല് (വിരിപ്പ്)	ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴു തൂതൂരപ്പൻ	ഇടവിട്ടുള്ള മഴമൂലം നെൽച്ചെടിയിൽ ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിന്റെയും തൂതൂരപ്പന്റെയും ആക്രമണം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിന് 2 സിസി ട്രൈക്കോഗ്രാമ കാർഡ് ചെറു കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വയലിന്റെ പലഭാഗത്ത് കുത്തി വെക്കുക. ട്രൈക്കോഗ്രാമ കാർഡുകൾ രാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ മാറ്റേണ്ടതാണ്. ആക്രമണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ 2 മി.ല്ലി ക്വിനാൽഫോസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർടാപ്പ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 25 ഗ്രാം ഒരു ഹെക്ടറിന് എന്ന തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുക.
വാഴ	മാണവ	മാണവ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കുലവെട്ടിയ ശേഷമുള്ള വാഴത്തട 1.5 അടി നീളത്തിൽ മുറിച്ച് നെടുമുടി പിളർന്ന് വാഴത്തോട്ടങ്ങളിൽ അവിടവിടെയായി കമിഴ്ത്തിയിടുക. വളർച്ചക്കുള്ളിൽ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇവയെ ശേഖരിച്ച് നശിപ്പിക്കാം.
തെങ്ങ്	കൊമ്പൻചെല്ലി	250 ഗ്രാം വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് പൊടിച്ചത് തുല്യ അളവ് മണലുമായി ചേർത്ത് നാമ്പോലയ്ക്കു ചുറ്റുമുള്ള മൂന്നോ നാലോ ഓലപ്പട്ടയ്ക്കുകളിൽ നിറയ്ക്കുക.
പച്ചക്കറികൾ	ആമ വെട്ടി (എപ്പിലാക്സ് വെട്ടി)	ആമ വെട്ടി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ക്വിനാൽഫോസ് 2 മി.ല്ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിച്ചു കൊടുക്കുക