



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര
Email: cohagmet@kau.in&kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളട്ടിൻ



എറണാകുളംജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്താട്ട തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എൽ 37/2021 (73) പൊലൂച്ച്

തീയതി 07.09.2021

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	08.09.2021	09.09.2021	10.09.2021	11.09.2021	12.09.2021
മഴ (മില്ല.മീറ്റർ)	10	10	10	10	10
ഉയർന്ന താപനില (°C)	28	29	30	30	31
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	24	24	24	24	24
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദര (%)	100	100	100	100	100
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദര (%)	78	78	78	78	78
കാറ്റിന്തേവഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	7	7	8	10	8
കാറ്റിന്തേവഗത (ഒക്ട)	270	270	320	320	320
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	8	4	7	5	6
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും ഏ.എ.എൽന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച ജീല്ലയിൽ നേരിയ തോതിൽ മായ്ക്ക് സാധ്യത. കേരളത്തിൽ ശരാശരിയെക്കാൾ കുടുതൽ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.					

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: മഴയില്ലാത്ത സമയത്തു മാത്രം കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്താവു.		
നെല്ല് (വിശ്വാസ്) പാലുവിയക്കുന്ന പരുവം	ചാഴി	നെല്ലിലെ ചാഴിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ രണ്ട് മിലി മാലത്തിയോൺ ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തജിക്കുക. (ചാഴിക്കെതിരെ കീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് രാവിലെ 9 മണിക്ക് മുമ്പോ, വൈക്കീട് 3 മണിക്കൂ ശേഷമോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുതലി പരാഗണത്തെ പ്രതികുലമായി ബാധിക്കും.)
നെല്ല് (മുണ്ടകൾ)	നിലം ഒരുക്കൽ	മുണ്ടകൾ കൃഷി ഇരക്കുന്ന കോൾ പാടങ്ങളിൽ നിലം ഒരുക്കി കുമ്മായം ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും, സൊറ്ററി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സൊറ്ററി തയ്യാറാക്കുന്നതിനു മുൻപ് വിത്ത് സ്പൈഡോമോണാസുമായി കൂട്ടികലർത്തുന്നത് രോഗബാധയകുറുന്നതിനു സഹായിക്കും. (ഒരു കിലോഗ്രാം വിത്തിൽ പത്ത് ഗ്രാം സ്പൈഡോമോണാസ് എന്ന തോതിൽ കലർത്തുക).
കുരുമുളക്	ദ്രോതവാടം	മഴക്കാലത്ത് കുരുമുളക്കിലെ ദ്രോതവാട രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായി രണ്ടു കിലോ വെടക്കോഡാർമ, 90 കിലോ ചാണകപ്പോടിയും, 10 കിലോ വൈപ്പിൻ പിണ്ണാക്കുമായി കൂട്ടി കലർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഇളർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ടും തജിച്ചുതേരുക്കൽ വയ്ക്കുക. ഈ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ വീതം ഓരോ കുരുമുളക് ചെടിക്ക് ചുവടിലും ഇട്ടു കൊടുക്കുക.
	സാവധാന വാടം	കുരുമുളകിൽ സാവധാന വാട് രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി, മുന്ന് ഗ്രാം കോപ്പർ ഓക്സിഡോറൈറ്റിൽ ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലകി ഓരോ ചെടിയുടെ ചുവടിലും മണ്ണു കൂതിരിക്കുന്ന വല്ലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.
കവുങ്ങൾ	മഹാളി രോഗം	കൃഷിയിടം വരുത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. പുർണ്ണമായും രോഗം ബാധിച്ച മരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക. (പ്രതിരോധ നടപടിയായി ഒരു ശതമാനം വീരുമുളക് ബോർഡോ മിശ്രിതം തജിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രാം കോപ്പർ ഓക്സിഡോറൈറ്റിൽ ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ പശ ചേരുത് 45 ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിൽ തജിച്ചു കൊടുക്കുക).
ജാതി	ഇലപൊഴിച്ചിൽ	മഴക്കാലത്ത് ജാതിയിൽ ഇലപൊഴിച്ചിൽ പാതയിൽിട്ടുള്ള മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീരുമുളക് ബോർഡോമിശ്രിതം കലകി തജിച്ചു കൊടുക്കുവുന്നതാണ്.
ഇണി, മണ്ണതൾ	തണ്ടുതുരപ്പൻ	ഇണി, മണ്ണതൾ എന്നിവയിൽ തണ്ടുതുരപ്പൻ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനു പ്രതിവിധിയായി ബ്യൂവോറി 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലകി തജിക്കുക.
പച്ചക്കുറികൾ വൈള്ളതിവർഗ്ഗങ്ങൾ	മുരുങ്ങോമപും	അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദര കുടുന്നതുമുലം വൈള്ളരിവർഗ്ഗ പച്ചക്കുറികളിൽ മുരുങ്ങോമപും എന്ന കുമിൾ രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. (പ്രതിവിധിയായി 2.5 ഗ്രാം മാക്കോസൈബ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലകി തജിക്കുക.
പച്ചക്കുറികൾ (മുളക്)	കരിവള്ളിക്കേട്	മഴക്കാലത്ത് മുളകിൽ കരിവള്ളിക്കേട് എന്ന രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. (പ്രതിവിധിയായി 1% വീരുമുളക് ബോർഡോമിശ്രിതം കലകി തജിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 20 ഗ്രാം സ്പൈഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലകി തജിക്കുക.
മുഗസംരക്ഷണം	കാലിതൊഴുത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്കുമാറ്റം	പരിസ്ഥിതിക്കുമാറ്റം വൈള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കൊതുക്കുന്നത് തടയുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിക്കുമാറ്റം ശരീരത്തിലേം, തൊഴുത്തിലേം കൊതുക്കുന്നതും ഇരുച്ചുമുണ്ട് എന്നതിനു മുൻപും വിശദമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. (caadecs, kvasus,മണ്ണുത്തി)

(Information given by RRS Vytila)