



**കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല**  
**കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,**  
**അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര**  
**Email: [cohagmet@kau.in](mailto:cohagmet@kau.in)&[kauagmet@yahoo.co.in](mailto:kauagmet@yahoo.co.in)**  
**കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളട്ടിൻ**



**എറണാകുളംജില്ല**

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്താട്ട തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എൽ 37/2021 (74) വൈള്ളിയാഴ്ച

തീയതി 10.09.2021

**അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:**

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	11.09.2021	12.09.2021	13.09.2021	14.09.2021	15.09.2021
മഴ (മില്ല.മീറ്റർ)	10	10	20	30	40
ഉയർന്ന താപനില (°C)	31	31	30	29	29
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	24
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദര (%)	92	92	92	92	92
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദര (%)	76	76	76	76	76
കാറ്റിന്ത്യേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	8	7	7	8	6
കാറ്റിന്ത്യേഗത (ഡിഗ്രി) (ഒക്ട)	320	290	320	250	270
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	7	8	8	8	8

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട മശയ്കൾ സാധ്യത. കേരളത്തിൽ ശരാശരി മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.

**കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ**

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: മഴയില്ലാത്ത സമയത്തു മാത്രം കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്താവു.		
നെല്ല് (വിശ്വാസ്) പാലുവായ്ക്കുന്ന പരുവം	ചാഴി	നെല്ലിലെ ചാഴിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ രണ്ട് മിലി മാലത്തിയോണ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തജിക്കുക. (ചാഴിക്കെതിരെ കീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് രാവിലെ 9 മണിക്ക് മുമ്പോ, വൈകീട് 3 മണിക്കൂ ശേഷമോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുതലി പരാഗണത്തെ പ്രതികുലമായി ബാധിക്കും.)
നെല്ല് (മുണ്ടകൾ)	നിലം ഒരുക്കൽ	മുണ്ടകൾ കൃഷി ഇരക്കുന്ന കോൾ പാടങ്ങളിൽ നിലം ഒരുക്കി കുമ്മായം ഇട്ടുകൊടുക്കുകയും, ഞാറ്ററി തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാറ്ററി തയ്യാറാക്കുന്നതിനു മുൻപ് വിത്ത് സ്പൈഡോമോണാസുമായി കൂട്ടികലർത്തുന്നത് രോഗബാധയകുറുന്നതിനു സഹായിക്കും. (ഒരു കിലോഗ്രാം വിത്തിൽ പത്ത് ഗ്രാം സ്പൈഡോമോണാസ് എന്ന തോതിൽ കലർത്തുക).
കുറുമുളക്	ദ്രോതവാടം	മഴക്കാലത്ത് കുറുമുളക്കിലെ ദ്രോതവാട രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനായി രണ്ടു കിലോ വെടക്കോഡായ്‌സ്, 90 കിലോ ചാണകപ്പോടിയും, 10 കിലോ വേഫ്രിൻ പിണ്ണാക്കുമായി കൂട്ടികലർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഇളർപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ടും താഴ്ചത്തേൽക്ക് പിയക്കുക. ഈ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ വീതം ഓരോ കുറുമുളക് ചെടിക്ക് ചുവടിലും ഇട്ടുകൊടുക്കുക.
	സാവധാന വാടം	കുറുമുളക്കിൽ സാവധാന വാട് രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായി, മുന്ന് ഗ്രാം കോപ്പുർ ഓക്സിഡോറൈറ്റിനു ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി ഓരോ ചെടിയുടെ ചുവടിലും മണ്ണുകൂടി നിന്നും വലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.
കവുങ്ങൾ	മഹാളി രോഗം	കൃഷിയിടം വരുത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. പുർണ്ണമായും രോഗം ബാധിച്ച മരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക. (പ്രതിരോധ നടപടിയായി ഒരു ശതമാനം വീരുമുളക് ബോർഡോ മിശ്രിതം താഴ്ചക്കു). അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രാം കോപ്പുർ ഓക്സിഡോറൈറ്റിനു ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ പശ ചേർത്ത് 45 ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിൽ താഴ്ചപ്പു കൊടുക്കുക.
ജാതി	ഇലപൊഴിച്ചിൽ	മഴക്കാലത്ത് ജാതിയിൽ ഇലപൊഴിച്ചിൽ വാടാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീരുമുളക് ബോർഡോ മിശ്രിതം കലക്കി താഴ്ചപ്പു കൊടുക്കുവുന്നതാണ്.
ഇണി, മണ്ണതൾ	തണ്ടുതുരപ്പൻ	ഇണി, മണ്ണതൾ എന്നിവയിൽ തണ്ടുതുരപ്പൻ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനു പ്രതിവിധിയായി ബ്യൂവോറി 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി താഴ്ചക്കു.
പച്ചക്കുറികൾ വൈള്ളതിവർഗ്ഗങ്ങൾ	മുഖുരോമപുശ്പ്	അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദര കുടുന്നതുമുലം വൈള്ളരിവർഗ്ഗ പച്ചക്കുറികളിൽ മുട്ടുരോമപുശ്പ് എന്ന കുമിൾ രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. (പ്രതിവിധിയായി 2.5 ഗ്രാം മാക്കോസൈബ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി താഴ്ചക്കു.
പച്ചക്കുറികൾ (മുളക്)	കരിവള്ളിക്കേട്	മഴക്കാലത്ത് മുളക്കിൻ കരിവള്ളിക്കേട് എന്ന രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. (പ്രതിവിധിയായി 1% വീരുമുളക് ബോർഡോ മിശ്രിതം കലക്കി താഴ്ചക്കു. അല്ലെങ്കിൽ 20 ഗ്രാം സ്പൈഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി താഴ്ചക്കു.
മുഗസംരക്ഷണം	കാലിത്താഴുത്തിന്റെ (സാമ്പാദനിക മുളക്)	പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കൊതുക്കുന്നത് തടയുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ പസുകളുടെ ശരീരത്തിലിലോ, തൊഴുത്തിലിലോ, കൊതുക്കുന്നതിനും ഇരുച്ചുമുണ്ട് എത്തിരെയുള്ള മരുന്ന് വിദഗ്ധദേഹപദ്ധതിയാണ്. (caadecs, kvasap,മണ്ണുത്താൻ)

(Information given by RRS Vytila)