



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനികര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



എറണാകുളം ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എന്റ് 39/2019(77), ചൊവ്വാഴ്ച

തീയതി 24.09.2019

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	25.09.2019	26.09.2019	27.09.2019	28.09.2019	29.09.2019
മഴ (മില്ലി.മൈറ്റർ)	2	30	20	0.5	10
ഉയർന്ന താപനില (°C)	31	31	31	31	31
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	25
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	93	93	93	93	93
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	73	73	73	73	73
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	6	10	14	8	10
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	230	200	200	230	270
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	4	8	8	4	5

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കെ.എ.യൂവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്ന രണ്ടുഭിവസതേക്ക് മഴയുടെ തീവ്രത കുടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ: വിളകളിലെ രോഗകീടങ്ങൾ പടരാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക.		
നെല്ല് (വിരിപ്പ്) കൊയ്ത്തു പരുവം	ബാക്കിരിയൽ ഇല കരിച്ചൽ	മഴക്കാലത്ത്, നെല്ലിൽ ബാക്കീരിയ മുലമുള്ള ഇലകൾക്കിൽ പടരാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ 20 ശ്രാം പച്ചാണകം ഒരുലിറ്റ് വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തെളിയെടുത്തതും, 20ശ്രാം സൃഷ്ടോമോണാസ് ഒരുലിറ്റ് വൈള്ളത്തിൽ കലക്കിയതും ചേർത്ത് തളിക്കാവുന്നതാണ്.
വംഡ	പിണ്ടിപ്പുഴു	മഴക്കാലമായതിനാൽ, വാഴയിൽ പിണ്ടിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാൻ 2.5 മി.ലി ക്രോഡ്‌പെറിഫോസ് അല്ലക്കിൽ 2 മി.ലി കൃഷാൽഫോസ് ഒരുലിറ്റ് വൈള്ളത്തിന് എന്ന തോതിൽ ഇലക്കവിളുകളിലും, ദാരങ്ങളിലും ഓല്ലവിധിയം പര ചേർത്ത് തളിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
ജാതി	കായ് അച്ചുകൾ, ഇല പൊഴിച്ചിൽ	മഴക്കാലത്ത്, ജാതിയിൽ കായ്‌അച്ചുകൾ, ഇലപൊഴിച്ചിൽ എന്നീ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകരുതലായി രണ്ടു കിലോ ടെട്ടേക്കോഡർ, 90 കിലോ ചാനകപ്പുടിയും, 10 കിലോ വേപ്പിൻവിണ്ണാക്കുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഇലർപ്പം നിലനിൽക്കുത്തെവെള്ളും രണ്ടാഴ്ചവെച്ച മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ വിതം ഓരോ ചെടിക്ക് ചുവടിലും ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം സൃഷ്ടോമോണാസ് 20 ശ്രാം ഒരുലിറ്റ് വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക അല്ലക്കിൽ 1% വീരുമുള്ള വോർഡോ മിശ്രിതം കലക്കി തളിക്കുക. മൺിലെ അർത്ഥത്തം കുറയ്ക്കാനായി കുമ്മായം ഇട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
പച്ചമരികൾ (പയർ)	മുണ്ട	പയറിൽ മുണ്ടയുടെ ആക്രമണം കണ്ടാൽ 2% വീരുമുള്ള വേപ്പുണ്ണ എമർഷൻ തളിക്കുക. അല്ലക്കിൽ വെർട്ടിസിലിഡം ലെക്കാനി എന്ന മിത്രകുമിൾ 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ 10 ദിവസം ഇടവിട്ട് കൊടുക്കുക. രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ 3 മി.ലി ഇമിഡാഫ്ലോപിഡ് അല്ലക്കിൽ 2 ശ്രാം തയാമെതോക്സാം 10 ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക.
മുഗസംരക്ഷണം		<ul style="list-style-type: none"> കനുകാലികൾക്ക് നിത്യവും പച്ചപ്പുള്ളിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക. വിറ്റാമിൻ ധാതു ലവണ മിശ്രിതം നിർദ്ദിഷ്ട അളവിൽ നിത്യേന നൽകുക. (CAADECCS, KVASU മന്ത്രാലയി)