ഗ്രാമീൺ കൃഷി മൗസം സേവാ

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ എറണാകുളം ജില്ല

പ്രവചന കാലയളവ് 27.11.2021 മുതൽ 01.12.2021 വരെ

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജ്, വെള്ളാനിക്കരയും
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത്

എ.എ.എസ് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 48/2021,(96) വെള്ളിയാഴ്ച	തീയ്യതി: 26/11/2021

1. അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	27.11.2021	28.11.2021	29.11.2021	30.11.2021	01.12.2021
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	20	20	10	20	5
ഉയർന്ന താപനില (°C)	29	30	30	30	31
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	23	25	25	25	24
കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	96	96	96	96	96
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	80	80	80	80	80
കാറ്റിന്റെവേഗത(കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	8	10	12	6	6
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	250	200	200	250	340
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട്സ)	8	8	7	7	6

അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴയുടെ പ്രവചനം

2021 നവംബർ 27	2021 നവംബർ 28	2021 നവംബർ 29	2021 നവംബർ 30	2021 ഡിസംബർ 1
സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ടമഴ. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ				മിതമായ മഴ

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് : ജില്ലയിൽ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട മഴയ്ക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യത.
കേരളത്തിൽ ശരാശരി മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.

2: വിള പരിപാലനത്തിനുള്ള കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ		കാർഷിക/മൃഗസംരക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ (RRS Vyttila)
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: തോട്ടങ്ങളിൽ നീർവാർച്ച സൗകര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുക. തെളിഞ്ഞ ആകാശം ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്തുക. നെല്ല്, റബ്ബർ, കൊപ്രാ മുതലായ കാർഷികോല്പന്നങ്ങൾ നനയാതെ സൂക്ഷിക്കുക. കാറ്റിന് വേഗത കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഴക്ക് താങ്ങു കാലുകൾ നൽകുക. പച്ചക്കറി പന്തലുകൾ ബലപ്പെടുത്തുക.			
നെല്ല് (മുണ്ടകൻ)	പോള ചീയൽ		ഹെക്സകോനാസോൾ 5 ഇ സി 1.5 മി.ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക
മഞ്ഞൾ	ഇലകരിച്ചിൽ		കാർബൻറ്റാസിം + മാങ്കോസബ് 2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു തളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാങ്കോസബ് 3 ഗ്രാം / ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1 % ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കാം. വിള പരിവർത്തനം ചെയ്യുക. രോഗം ബാധിച്ച ചെടികളിൽ നിന്നും വിത്ത് എടുക്കാതിരിക്കുക. വിത്ത് മഞ്ഞൾ ബോർഡോ മിശ്രിതത്തിൽ അര മണിക്കൂർ മുക്കി വെച്ച തണലിൽ ഉണിക്കിയ ശേഷം സൂക്ഷിക്കുക
വൃക്ഷ വിളകൾ	പിങ്ക് രോഗം		ഹെക്സകൊണസോൾ 5 ഇ.സി. 2 മി.ലി. ഒരു ലി. വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു തളിക്കുക. മഴ മാറിയ ശേഷം രോഗ ബാധിതമായ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷം മുറിവിൽ 10 % ബോർഡോ മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്സി ക്ലോറൈഡ് (10 ഗ്രാം./ലി.) തേച്ചു കൊടുക്കുക.
മത്സ്യ കൃഷി	മത്സ്യ കർഷകർക്ക് കുളമൊരുക്കുവാനുള്ള സമയമാണ്. തിലാപ്പിയ, അനാബസ് എന്നീ മത്സ്യങ്ങൾ ആറു മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ്. ചെറിയ മത്സ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഹാപ്പയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.		