

**ഗ്രാമീൺ കൃഷി മന്ദസം സേവാ**

**കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ എറണാകുളം ജില്ല**

(പ്രവചന കാലയളവ് 15.12.2021 മുതൽ 19.12.2021 വരെ)



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല  
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,  
അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജ്, വെള്ളാനിക്കരയും  
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത്



എ.എ.എസ് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 51/2021,(101) ചൊവ്വാഴ്ച തീയതി: 14/12/2021

**1. അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:**




കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	15.12.2021	16.12.2021	17.12.2021	18.12.2021	19.12.2021
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	2	2	2	2	2
ഉയർന്ന താപനില (°C)	32	32	32	32	32
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	25
കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	80	80	80	80	80
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	60	60	60	60	60
കാറ്റിന്റെ വേഗത(കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	6	8	6	6	8
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	270	270	250	230	230
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	6	6	4	4	5

**അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴയുടെ പ്രവചനം**

2021 ഡിസംബർ 15	2021 ഡിസംബർ 16	2021 ഡിസംബർ 17	2021 ഡിസംബർ 18	2021 ഡിസംബർ 19
വളരെ നേരിയ മഴ				

**കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് :** ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ നേരിയ തോതിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കേരളത്തിൽ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറവ് മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.

**2: വിള പരിപാലനത്തിനുള്ള കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ**

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക/മൃഗസംരക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ (RRS Vyttila)	
<p><b>പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ:</b> കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടി വരുന്നതിനാലും, ബാഷ്പീകരണം കൂടുകയും, വരണ്ട അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാലും ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ വിളകൾക്ക് നന്നെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കാറ്റിന് വേഗത കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വാഴക്ക് താങ്ങു കാലുകൾ നൽകുക. പച്ചക്കറി പനലുകൾ ബലപ്പെടുത്തുക.</p>			
നെല്ല് (മുളംകു)	പോള ചീയ് / കട ചീയ്		ഹെക്ടോകോനാസോ 5 ഇ സി 1.5 മി.ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക
വൃക്ഷ വിളകൾ	പിക് രോഗം		ഹെക്ടോകോനാസോ 5 ഇ.സി. 2 മി.ലി. ഒരു ലി. വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു തളിക്കുക. മഴ മാറിയ ശേഷം രോഗ ബാധിതമായ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ ശേഷം മുറിവിൽ 10 % ബോർഡോ മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ഓക്സി ക്ലോറൈഡ് (10 ഗ്രാം./ലി.) തേച്ചു കൊടുക്കുക.
ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ	പരിചരണം		കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ എന്നിവയ്ക്ക് മഴയില്ലെങ്കിൽ ഹെയ് / കമ്പ് (ഭക്ഷയോഗ്യമായ ഭാഗം) രൂപപ്പെടുന്നതുവരെ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം ജലസേചനം നൽകാവുന്നതാണ്. കോളിഫ്ലവറിന്റെ കമ്പ് വന്നുതുടങ്ങി പകുതി മുപ്പെത്തുമ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ് നിറം മഞ്ഞളിക്കാതിരിക്കാൻ ചുറ്റുമുള്ള 3-4 ഇലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കെട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്
മുട്ടക്കോഴികൾ	<p>ശൈത്യകാല സംരക്ഷണം മുട്ടക്കോഴികളിൽ- വൈറസ് / ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ വാക്സിനേഷൻ/ ആന്റിബയോട്ടിക് നൽകുക. തീറ്റ ഫംഗ് ബാധ ഏല്ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ശൈത്യകാലത്ത് മുട്ടയുല്പാദനം കുറയാതിരിക്കാൻ കൂട്ടിനുള്ളിൽ 16 മണിക്കൂർ വരെ ബ്ലീബ് വെട്ടിച്ചു നൽകുക.</p>		