



**കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും**  
(പ്രാബല്യം: 2020 ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 21 വരെ)



## കണ്ണൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിലിക്കോട്-ഉം  
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുന്നിതിരക്കുന്നത്

ബുള്ളടിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/ക.എൽ.ആർ 14/2021

തീയതി: 16/02/2021

### എ. പിന്നിട അഞ്ച് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
0.0	33.4 – 34.0	22.5-24.2	63–87	00 -08

### ബി. വരുന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	17.02.2021	18.02.2021	19.02.2021	20.02.2021	21.02.2021
മഴ, മി.മീ	0	0	0	0	0
കുടിയ താപനില, °C	34	34	34	34	34
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	24	24	24	24	24
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	88	88	88	88	88
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	63	63	63	63	63
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	10	16	10	10	12
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	230	270	230	230	230
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	4	5	7	5	4

### സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫട്ടം	പ്രാണിങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	മഴള്ള് സാധ്യതയില്ല.		പൊതുവെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടും. മണ്ണിൽനിന്നും വിളകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായെങ്കാവുന്ന ഇരുപ്പ നഷ്ടം കുറക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.
പച്ചക്കറികൾ	വിവിധ ഫട്ടങ്ങൾ		നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി വേഷ്യിപ്പിച്ച കീടനാശിനി 4 മിലി രൈ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തയ്യാറാക്കി, പുഷ്പപിക്കുന്നതിന് രോഴ്സ് മുന്പു വരെ 7 ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിൽ ഇലയുടെ ഇരുവശത്തും തളിക്കുക. ആക്കമണം രൂക്ഷമാവുകയാണെങ്കിൽ അക്കാര എന കീടനാശിനി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 3 ശാം എന്നതോതിൽ നേർപ്പിച്ച തളിക്കുക.

കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ	ചീച്ചൽ രോഗം 	മുൻകരുതലായി ദൈനംദിനവും സാമ്പുഷ്ടമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിള്ളാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണമായി ചേർത്തിളക്കുക. രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണു തുടങ്ങിയാൽ രോഗാമിൽ രണ്ടു ഗ്രാം രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണ് കുതിർക്കുക. ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	മഞ്ഞലീപ് 	1) താഴെത്തെ നിരയിലെ രണ്ടു പഴോപകൾ വെട്ടി മാറ്റുക 2) തടത്തിൽ ചകിരി ചോറ് കനോസ്റ്റ് വിതരുക 3) ഉണങ്ങിയ ഓഫകൾ കൊണ്ട് പുതയിടുക 4) കണികാ ജലസേചനം സ്വീകരിക്കുക 5) തെങ്ങാനിന് തടത്തിൽ 200ഗ്രാം ബോറാക്സ്, 500ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സർഫേറ്റ്, 100ഗ്രാം സിക്ക് സർഫേറ്റ് എന്നിവ ചേർത്ത് മണ്ണമായി യോജിപ്പിക്കുക. തെന്നെത്തെന്നുകളെ തന്നെ നൽകി സംരക്ഷിക്കുക
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കൊന്ധൻ ചെള്ളി 	തെങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുനിന്നും ചെള്ളിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ണുകളെ കുത്തിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ബോർഡോ കൂഫോർഡ് കൊണ്ട് വണ്ണുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിരക്കുന്നത് മുറിവിൽ കൂടി ഉണ്ടായെങ്കാവുന്ന പുഷ്ട ബാധയെ തടയാൻ സഹായിക്കും. 2. തെങ്ങിന്റെ മും വ്യതിയാക്കിയ ശേഷം 6 ഗ്രാം ഫെർട്ടറ (Ferterra) 250ഗ്രാം മണ്ണലും കൂട്ടിക്കലെർത്തിയ മിശ്രിതം നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ പരിചരണം 3 പ്രാവശ്യം -ജനുവരി, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യണംതാണ്. തോട്ടങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം അവലംബിക്കുക.
മാം	കായ പിടിക്കുന്ന ഘട്ടം	കായീച്ച് 	നിലത്തു വീണ്ടു കിടക്കുന്ന കായീച്ചുകളെ എടുത്തു 60 സിഎം ആഴത്തിൽ കൂഴി ഉണ്ടാക്കി നശിപ്പിക്കുക. തോട്ടങ്ങളിൽ ഫീറമോൺ കെനികൾ (@ 1 trap/15സെന്റീമീറ്റർ) സ്ഥാപിക്കുക.
കറവ പശുകൾ	കുളവു രോഗം, സാംക്രമിക ചർമ്മ മുഴ രോഗം എന്നീ രൈററും രോഗങ്ങൾ		അടുത്തുള്ള മുഖാശുപത്രിയിൽ നിന്നും വാക്സിൻ നൽകുക. തൊഴുത്തും പരിസരവും ശുചിയായി സുക്ഷിക്കുക.