

आजादी  
का  
अमृत महोत्सव



കാലാവന്ധാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും  
കണ്ണൂർ ജില്ല

(പ്രാബല്യം: 18.05.2022 മുതൽ 22.05.2022 വരെ)



## കാലാവന്യം മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 18.05.2022 മുതൽ 22.05.2022 വരെ)



### കണ്ണൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം  
പിലിക്കോട്-ഇം ഇന്ത്യ കാലാവന്യം വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ 39/2022

തീയതി: 17/05/2022

എ. പിന്നിട്ട് അഞ്ചേ ദിവസത്തെ കാലാവന്യം

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
58.0	28.0-30.7	23.4-25.3	83-95	00-06


ബി. വരുന്ന അഞ്ചേ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവന്യം മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	18-05-2022	19-05-2022	20-05-2022	21-05-2022	22-05-2022
മഴ, മി.മീ	40	20	30	5	12
കുടിയ താപനില, °C	29	29	30	31	31
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	24	25	25	26	26
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	95	95	95	95	95
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	83	83	83	83	83
കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	10	8	3	3	3
കാറിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	340	320	320	340	320
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	4	4

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫലം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
തീവ്രമായതോ അതി തീവ്രമായതോ ആയ മഴ			
<p>ആദ്യത്തെ മുന്നു ദിവസം തീവ്രമായ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലി മുതൽ 204 .5 മില്ലി വരെ) മഴലഭിക്കും. തുടർന്ന് ശക്തികുറഞ്ഞതോ സാധാരണ മഴയോ(ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 2 .5 മില്ലി മുതൽ 64.4 മില്ലി വരെ) ലഭിക്കും. വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച് അടുത്തയാഴ്ച ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ കുടുതൽ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്</p> <p>ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഭത അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം പുർണ്ണമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ഉള്ളാവ് സ്ഥാരണയിൽ കുറവായിരിക്കും</p>			

<p><u>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</u></p>	<p>വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മൺതശ്ര, കോപ ഉല്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെയിലത്തിട്ടുണ്ടുകുക. വിളംതു നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങൾ എത്രയും വേഗം കൊയ്യതൊഴിയുക, കൊയ്യതെടുത്ത കറുകൾ വയലിൽ തന്നെ കൂട്ടിയിടരുത്.</p> <p>മുട്ടു കാണ്യ വിളകളായ വാഴ, പച്ചക്കരികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശരംതായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> <p>നീർ വാർഷ എല്ലാപ്പമാക്കുന്നതിന് ജലനിർധന ചാലുകൾ തുറന്നിട്ടുക .</p> <p>വള്ളം, വിത്ത്, കാലിത്തിറ്റുകൾ എന്നിവ ഉഞ്ഞപ്പം തട്ടാത്തതും കീടങ്ങൾ ഉല്പാത്തതുമായ മുറികളിൽ ഉയർത്തികൊട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സൃഷ്ടിക്കുക.</p> <p>കനുകാലികളെ ബലക്ഷയമുള്ള തൊഴുത്തുകളിൽ പാർപ്പിക്കരുത്</p> <p>വുക്ക വിളകൾ നടാനുള്ള തയ്യാറാടുപ്പുകൾ തുടങ്ങാം. വിളകൾ നടവേബാൾ, ചെടികൾ തമിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അകലം ഉറപ്പാക്കണം. മേൽ മണ്ണിന്റെ കുട രജാവ വളങ്ങൾ മിശ്രിതം ചെയ്യു വേണം കുഴികൾ മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം നിറക്കാൻ. വർഷ കാലം തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി തെക്കൾ നടാം.</p> <p>വിളകൾക്ക് രാസ വളം നൽകുന്നത് അൽപ്പ ദിവസതേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക.</p>	
<p>നെല്ല്: വിരുപ്പു (നേനാം വിള)</p>	<p>നിലമൊരുക്കൽ</p>	<p>മുഴ ലഭിക്കുമ്പെന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാടം ഉഴുതൽ ആരംഭിക്കുക. ആദ്യത്തെ ഉഴുതലിൽ തന്നെ പച്ചില വളങ്ങൾ, ഉണക്കിപോടിച്ച ചാണക വളം എന്നിവ (മൊത്തത്തിൽ ഷൈക്കുടിനും അഞ്ചു ടൺ നിരക്കിൽ) മണ്ണുമായി ചേർക്കുക.</p>
<p>നെല്ല്: വിരുപ്പു (നേനാം വിള)</p>	<p>നീംസാറി തയ്യാറാക്കൽ</p>	<p>നീംസാറി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ചുരുങ്ഗിയത് 1 കി. ശ്രാം ഉണക്കിപ്പാടിച്ച ചാണകം/കനേബസ്റ്റ് മണ്ണിൽ നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കേണ്ടതാകുന്നു.</p> <p>രോഗബാധ തടയുന്നതിനായി നടുന്നതിന് മുൻപ് വിത്ത്, സുപ്പഡോണസ് (പത്തു കിലോ ശ്രാം വിത്തിനു 10 ശ്രാം സുപ്പഡോണസ് എന്ന തോതിൽ) കലർത്തി തയ്യാറാക്കിയാണ്.</p>
<p>തെങ്ങ്</p>	<p>നിലമൊരുക്കൽ</p>	<p>നടാൻ വേണ്ടി നിലമൊരുക്കാം. വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തെങ്ങിന് അനുഗ്രാഹിക്കുക. നടാനുള്ള കുഴികൾക്ക് 1 മീറ്റർ വിത്തം നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചെക്കൽ പ്രദേശമാണെങ്കിൽ കുഴികൾക്ക് 1.2 മീറ്റർ വിത്തം നീളവും വീതിയും ആഴവും വേണം. മേൽമണ്ണും ചാണകപ്പാടിയും ചാരവും കുട്ടിക്കലെർത്തിയ മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് കുഴിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നിറക്കുക. തെക്കുഴിയിലിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴക്കാലത്ത് കുഴിയിലേക്ക് വെള്ളം ലഭിച്ചിരണ്ടാതിരിക്കാൻ ചുറ്റും വരവും തീർക്കുക</p>

തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>കൊന്പൻ ചെല്ലി</p>  <p>ഉയരം കുറഞ്ഞ തെങ്ങുകൾ പൊതുവെ കുടുതൽ ആക്രമണ വിധേയരാണ്</p>	<p>തെങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുനിന്നും ചെല്ലിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ണുകളെ കുത്തിയെടുത്ത് സശിഷ്ടിക്കുക. ബോർഡേയാ കുഴന്ന് കൊണ്ട് വണ്ണുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിരക്കുന്നത് മുറിവിൽ കുടി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പുഷ്ട് ബാധയെ തടയാൻ സഹായിക്കും.</p> <p>ഉപയോഗ സുന്ധമായ മീറ്റ് വലകൾ ഒരു മീറ്റ് നീളത്തിലും അര മീറ്റ് വീതിയിലും മുറിച്ചെടുത്തു തെങ്ങിന്റെ മുന്നാമത്തെയും നാല്പാമത്തെയും ഐക്കവീളുകളിൽ വിശ്രദിച്ച നടുഭാഗത്തു ചെറുകല്ലുകൾ വച്ച് ഉൾഭാഗത്തെക്കു തള്ളി അമർത്തി വെക്കുക. ഓലത്തണ്ണിന്റെ രണ്ട് ബാഹ്യതക്കും പുറത്തെക്കു തുണി നിൽക്കുന്ന വലയുടെ വരുൺഡ് നന്നായി വിടർന്നിരിക്കണം. പാറിവരുന്ന വണ്ണുകൾ കാലുകൾ വലയിൽ കുടുങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാതെ നശിച്ചു പോകും, പുതു ഓലകൾ വിടരുന്നതിനുസരിച്ച് വല മുകളിലോട് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.</p>
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>ചെന്പൻ ചെല്ലി</p> 	<p>നീയ്ക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ:-</p> <p>നേർപ്പിച്ച ഇമിഡാക്ഷോർഫില്സ് (1മിലി പത്തു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) ലായൻ ചെല്ലി തുരന്ന ദ്വാരണങ്ങളിൽ നിരയെ ഒഴിക്കുക.</p> <p>തോട്ടങ്ങളിൽ സന്പുർണ്ണ ശുചിത്വം അവലംബിക്കുക.</p>
ഇണച്ചി/മണ്ണത്തർ	നടുന്ന സമയം	<p>നിലമൊരുക്കുവോൾ രൈറ്കോഡൈർമ്മ സമ്പൂഷ്ടമാക്കിയ ചാണകം ( നൂറു കിലോഗ്രാം ചാണകത്തിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം രൈറ്കോഡൈർമ്മ). ഉപയോഗിക്കുക.</p> <p>അരല്ലകിൽ</p> <p>നൂറു ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 25 ശ്രാം വീതം രൈറ്കോഡൈർമ്മ മണ്ണിൽ നേരിട്ട് ചേർത്തു യോജിപ്പിക്കുക.</p> <p>നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള സമലം നടന്നായി തെരഞ്ഞെടുക്കുക</p>	
കനുകാലിക ൾ	വിവിധ ഘട്ടം	അകിട് വീക്കം	<p>തൊഴുത്തിന്റെ തര ഇളർപ്പ രഹിതമായി സുക്ഷിക്കുന്നത് അകിട് വീക്കം വരുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും</p> <p>അടുത്തുള്ള മുഗാശുപത്രിയുമായി ആലോച്ചിച്ച് കനുകാലികൾക്ക് കുത്തിവെപ്പുകൾ നൽകുക</p>

പ്രദേശ	ഗർഭകാലം	ബേഖുസല്ലോസിസ്	<p>പ്രദേശക്കിടാങ്ങൾക്കു 4 മാസത്തിനും 8 മാസത്തിനും ഇടയിലുള്ള പ്രായത്തിൽ കുത്തിവെപ്പുകൾ നൽകുക മുഗങ്ങൾക്ക് ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുക.</p> <p>ഗർഭം അപസിഷ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടായാൽ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള മുഗാശുപത്രിയിൽ അറിയിക്കുകയും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുക</p> <p>ബേഖുസല്ലോസിസ് മനുഷ്യരിലേക്കുന്ന പടരുന്നതിനാൽ മുഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നയാൾ നല്ല വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കണം</p>
--------	---------	---------------	---

ഒപ്പ്/-  
സോഡി ഓഫീസർ  
ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി