

आजादी  
का  
अमृत महोत्सव



കാലാവന്ധാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും  
കണ്ണൂർ ജില്ല

(പ്രാബല്യം: 18.06.2022 മുതൽ 22.06.2022 വരെ)



## കാലാവന്യം മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 18.06.2022 മുതൽ 22.06.2022 വരെ)



### കണ്ണൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം  
പിലിക്കോട്-ഇം ഇന്ത്യ കാലാവന്യം വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ 48/2022

തീയതി: 17/06/2022

എ. പിന്നിട്ട ദിവസത്തെ നാല് കാലാവന്യം

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
42.5	31.4 – 33.8	24.4 – 26.0	76 - 92	0.0 – 0.0

ബി. വരുന്ന അന്വേഷണങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവന്യം മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	18-06-2022	19-06-2022	20-06-2022	21-06-2022	22-06-2022
മഴ, മി.മീ	20	15	15	16	30
കുടിയ താപനില, °C	33	33	33	33	33
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	24	24	24	24	24
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	92	92	92	92	92
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	78	78	78	78	78
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	4	3	5	5	3
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	320	290	320	290	270
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫലം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
<b>മഴ, ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടാളിൽ കനത്തമഴ</b>			
<p><u>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</u></p> <p>സാധാരണ മഴ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 2.5 മീലി മുതൽ 64.4 മീലി വരെ) ലഭിക്കും. ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടാളിൽ കനത്തമഴ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 115.5 മീലി വരെ) ലഭിക്കും വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച് അടുത്തയാഴ്യും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഭത അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം പുർണ്ണമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ഉള്ളാവ് സ്വാധാരണയിൽ കുറവായിരിക്കും</p>			

<p><b>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</b></p>	<p>മുട്ടു കാണ്യ വിളകളായ വാഴ, പച്ചകരികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> <p>വളം, വിത്ത്, കാലിന്ത്രീറകൾ എന്നിവ ഇരുപ്പം തടാത്തത്യും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത്യുമായ മുൻകളിൽ ഉയർത്തിക്കൊട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുഷ്ഠിക്കുക.</p> <p>വിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തേങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പുർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുൻചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം. തോട്ടങ്ങളിൽ നല്ല നീർ വാർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുക.</p> <p>വുക്ഷ വിളകൾ നടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങാം. വിളകൾ നടുവേബാൾ, ചെടികൾ തമിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അകലം ഉറപ്പാക്കണം. മേൽ മര്മ്മിന്റെ കുടു ജൈവ വളങ്ങൾ മിശ്രിതം ചെയ്യു വേണം കുഴികൾ മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം നിറക്കാൻ. വർഷ കാലം തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി തെതകൾ നടാം.</p> <p>ഗ്രാഫ്ക് / ടെച്നിച്ച് ബഡ്യ് തെതകൾ നടുവേബാൾ ടെക്നിച്ച് ഭാഗം താരനിരപ്പിനു രണ്ടു മുതൽ മുന്നു സെ. മീ. മുകളിൽ ആയി വരെതകവെള്ളും നടുക. ഓട്ടീനു താഴെ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇലകൾ, ശ്രീവരങ്ങൾ എന്നിവ അറുത്തു മാറ്റിരക്കാണ്ടിരിക്കുക.</p> <p>വുക്ഷ വിളകൾക്ക് നനാം ഗധു വളം ചേർക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്</p>		
<p>നെല്ല്: വിരുപ്പു (നനാം വിള)</p>	<p>പരിച്ചു നടീൽ (ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭ്യമായയിട അഭിം)</p>	<p>പാടത്തു നിന്നും വെള്ളവും വളവും ഒഴുകി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വരവുകളിലെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം ചെളി ഉപയോഗിച്ച് ആടക്കുക.</p> <p>നടുനതിന് മുൻപ് സുപ്പോൾ ലായനിയിൽ (250 ഗ്രാം 750 മില്ലി ലഭ്യത്തിൽ) താരിന്റെവേരുകൾ 20 മിനിട്ടു നേരം മുകളി വെള്ളുന്നത് പുപ്പൽ രോഗബാധ തടയുന്നതിനും നനായി വേരുകൾ വളരുന്നതിനും സഹായകമാകും.</p> <p>പരിച്ചുനടുന സമയത്ത് മധ്യകാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് സെൻറിന് 400 ഗ്രാം തുറിയ, 900 ഗ്രാം മസൂറിഫോസ്, 150 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്-ഉം ഹസ്കാലമുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് സെൻറിന് 400 ഗ്രാം തുറിയ, 700 ഗ്രാം മസൂറിഫോസ്, 120 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്-ഉം അടിവളമായി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പൊട്ടാഷ് വളപ്പെയോഗം കുമായം ചേർത്ത് രണ്ടായ്ക്കു കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ.</p>	
<p>നെല്ല്</p>	<p>പരിച്ചു നടയിടങ്ങൾ</p>	<p style="text-align: center;">ഇലകൾ കുഴിക്കിൽ</p> 	<p>20 ഗ്രാം പച്ച ചാണകം രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലകി തെളിയെടുത്തു തളിക്കണം. ഷ്ടീച്ചിംഗ് പാഡലർ കിഴികളിലാക്കി ഏകരിന് 2 കിലോ ഇട്ടു കൊടുക്കണം. സർട്ടപ്പറ്റോസൈൽക്കിൽ ഏകരിന് 100 ഗ്രാം 200 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഏന തോതിൽ കലകി തളിക്കുക.</p>
	<p>പരിച്ചു നടയിടങ്ങൾ</p>	<p style="text-align: center;">തണ്ടുതുരപൻ</p> 	<p>രൈഡേംബരാമ മുട്ട കാർബൂകൾ ഉപയോഗിക്കാണുന്നതാണ് രൂപ ഏകരിന് രണ്ട് . കാർബൂകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്</p> <p>ആക്കമണം ഉണ്ടാക്കിയ തോട്ടാംഡാനിലിപ്പോൽ 18.5% W/W SC 3മില്ലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഏന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടിട്ടുക.</p>

തെങ്ങ്	നടിൽ	<p>നടാൻ വേണ്ടി നിലമൊരുക്കാം. ബൈള്ളക്കട്ടുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തെങ്ങിന് അനുയോജ്യമല്ല</p> <p>നടാനുള്ള കുഴികൾക്ക് 1 മീറ്റർ വീതം നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചെങ്കൽ പ്രദേശമാണെങ്കിൽ കുഴികൾക്ക് 1.2 മീറ്റർ വീതം നീളവും വീതിയും ആഴവും വേണം.</p> <p>മേൽമണ്ണും ചാണകപ്പാടിയും ചാരവും കുട്ടിക്കലെർത്തിയ മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് കുഴിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നിറക്കുക.</p> <p>ഇതിന്റെ നടുകൾ ഒരു തെങ്ങാം മുടാൻ വിധം പിള്ളക്കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ തെരെ വെച്ച് മണിക്ക് ഉറപ്പിക്കുക. താങ്ങുകാൽ നാട്ടി അതിനോട് മുകൾഭാഗം ചേർത്ത് കൈടുക. തീരുതയേറിയ വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ മടങ്ങത ഓലയോ വാഴക്കോളാ കുഴിക്കരയിൽ കുത്തി വെക്കുക.</p> <p>തെക്കകുഴിയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാൽത്തിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴക്കാലത്ത് കുഴിയിലേക്ക് വെള്ളം ലഭിച്ചിരണ്ടാൽത്തിരിക്കാൻ ചുറ്റും വരുവ് തീർക്കുക</p>
തെങ്ങ്	വള പ്രയോഗം	<p>കായ്ക്കുന്ന തെങ്ങുകൾക്കു തെങ്ങാനിന് 1 - 2 കിലോ കുമ്മായം തടത്തിൽ വിതരി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക. രണ്ടായ്ക്കു ശേഷം 25 കിലോ പച്ചിലവളം/ ചാണകവളം / കാബോറ്റ് എന്നിവ നൽകുക. അതോടൊപ്പം രാസവളങ്ങളും (യുറിയ: 330 ഗ്രാം + രാജ്ഞഹോസ് 530 ഗ്രാം + പൊട്ടാഷ് 560 ഗ്രാം + മെഗ്നീഷ്യൂം സർഫോർഡ് 250 ഗ്രാം + ബോറാക്ട് 100 ഗ്രാം) നൽകുക. ഒരു വർഷം പ്രായമായ തെങ്ങുകൾക്ക് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ നന്നാം രണ്ടു വർഷം പ്രായമായവക്ക് മുന്നിൽ രണ്ടുഭാഗവും വളങ്ങൾ ചേർക്കുക. മുന്നു വർഷത്തിനു മേലോടു പുർണ്ണതോതിൽ തന്നെ വളപ്രയോഗം നടത്തുക.</p>
കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	താങ്ങുകാലുകളുടെ കൊന്പുകൾ കൊതി തണൽ ക്രമീകരിക്കുക
വാഴ	നടിൽ സമയം	രോബറ്റ് , പുവൻ, ഞാലിപ്പുവൻ, പാളയക്കോടൻ മുതലായ ഇനങ്ങൾ നാടാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. നടാനുള്ള കനുകൾ രോഗബാധയില്ലാത്ത വാഴത്തോടുത്തിൽനിന്നു മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
വാഴ	കുലയ്ക്കുന്ന ഘട്ടം	നേന്ത്രൻകുലകളെ നേർത്തതകും സുതാര്യവുമായ പോളിത്തിൻ പാളികൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞത് സുക്ഷിക്കുക
പച്ചകരികൾ	നടിൽ സമയം	<p>ചീര, വെണ്ട, വഴുതിന, മുളക്, കറിവേപ്പില മുതലായ വർഷകാലത്തിനു അനുയോജ്യമായ പച്ചകരികൾ നാടാൻ തുടങ്ങാം. പോട്ടേയിലോ ചെറു പോളിത്തിൻ ബാഗുകളിലോ മുളപ്പിച്ചു വേരുകൾക്ക് കഷ്ഠമേൽക്കാത്ത വിധം മാറ്റി നടുന്നതാണ് നല്ലത്.</p> <p>പച്ചകരിക്കുഷിക്കായി നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സെൻഡ് ഓനിന് രണ്ടു കിലോഗ്രാം കുമ്മായം വിതരി ഉഴുതു മറിക്കുക. കളകളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവഗ്രിപ്പുങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക. രണ്ടായ്ക്കു ശേഷം ഉയർത്തിയ വരുവുകളിലോ കുന്നകളിലോ ദട്ടക്കോഡാർമ്മ സന്പുഷ്ടമാക്കിയ രജവവളങ്ങൾ മണ്ണുമായി ഇളക്കി ചേർത്ത് പച്ചകരി തെക്കൾ നടക്ക.</p>

ഇന്തി	വിവിധ ഘട്ടം	<b>ബാക്ട്രീരിയൽ വാട്ടം</b>  	രോഗബാധയില്ലാത്തിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിത്തിഞ്ചി മാത്രം നടാൻ ഉപയോഗിക്കുക. നടുന്നതിനു മുൻപ് വിത്തിഞ്ചി സർട്ടെഫ്റ്റോസൈള്ലിൽ 200 മില്ലി ഗ്രാം രൈ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലകി തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയിൽ മുഷ്ടു സെക്കന്റ് നേരം മുക്കുക. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ രൈ സെറ്റിന് മുന്നുകിലേം വിത്തം കുമ്മായം മണ്ണിൽ ചേർത്തിളക്കുക. ടെട്ടക്കോഡായർമ, സൃജയോമോസസ് എന്നീ ജീവാന്വകൾ ഉപയോഗിക്കുക. രോഗം ബാധിച്ച ചെടികൾ മുൻചൂഢു വെള്ളത്തിൽ മുകിയാൽ മുൻവിൽ നിന്നും നേർത്ത വെള്ളത്ത ബാക്ട്രീരിയൽ ലായനി നൂലുപോലെ പുറത്തു വരുന്നത് കാണാം. അവ പിഴുതുമാറ്റി രൈശത്തമാനം വീരുമുള്ള ബോദ്ധനാമിശ്രിതം കൊണ്ട് തടം കുതിർക്കുക.
ക്രൂമാവ്	വിവിധ ഘട്ടം	പുഷ്ട രോഗങ്ങൾ	മുൻകരുതലായി രൈ ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോദ്ധനാ മിശ്രിതത്തിൽ പശ ചേർത്ത് ചേർത്ത് തളിക്കുക. രോഗ ലക്ഷണം കാണുകയാണെങ്കിൽ രോഗം ബാധിച്ച കുമ്മകൾ മുൻചൂഢു മാറ്റി മുൻചൂഢു ഭാഗത്തുനിന്ന് 15 സെ, മീ വരെ നീളത്തിൽ പശ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ബോദ്ധനാ കുഴന്പ് പുരുട്ടുക.
കോഴി	വിവിധ ഘട്ടം	അംഗുഖാധി	കുടുകളുടെ തീയിൽ ഇളർപ്പം നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇളർപ്പം നിലനിന്നാൽ തീയിൽ വീഴുന്ന കാംഘുത്തിൽ നിന്നും അമോൺ വാതകം പുരുത്തെങ്കു വർക്കുകും.. അത് കോഴികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ പ്രതികുലമായി ബാധിക്കും

ഒപ്പ്/-  
 നോയൽ ഓഫീസർ  
 ശാഖിനെ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി