



കാലാവസ്ഥാ മുന്നിയിപ്പ് കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 22.06.2024 മുതൽ 26.06.2024വരെ)



കണ്ണൂർജില്

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക റവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിനമ്പൾ: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ- 50/2024

തീയതി: 21/06/2024

എ.പിനിട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കൂടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഡ്രത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
68.1	29.0 – 33.6	24.4 – 25.2	76 – 95	00 – 04

ബി.വരുനാഞ്ചീവസങ്കുളംകലാവസ്ഥാ മുന്നിയിപ്പ്

സൂചിക	22-06-2024	23-06-2024	24-06-2024	25-06-2024	26-06-2024
ശരാശരിമഴ, മി.മീ	18	26	22	28	40
കൂടിയതാപനില, °C	29	29	29	30	30
കുറഞ്ഞതാപനില, °C	24	24	24	26	26
കൂടിയആപേക്ഷിക ആർഡ്രത, %	94	94	94	94	94
കുറഞ്ഞആപേക്ഷിക ആർഡ്രത, %	77	77	77	77	77
കാറിന്റെവേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	4	2	8	8	6
കാറിന്റെവിശ, ഡിഗ്രി	270	320	270	270	270
മേഘവിന്ധാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫെഡം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷികനിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ		അതിശക്തിയായ മഴ **	ഒറ്റപെട്ട അതിശക്തിയായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഡ്രത അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം പുർണ്ണമായും മേഘവിന്ധത്തായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ഉണ്ടാവുന്ന സ്വാധാരണയിൽ കുറവായിരിക്കും. ജൂൺ 23ന് അതിശക്തിയായ മഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 204.4 മിലി മുതൽ അതിലും കൂടുതൽ മഴ) ജൂൺ 21,22,24,25 എറ്റപെട്ട അതിശക്തിയായ മഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 115.6 മിലിമുതൽ 204.4 മിലി വരെ)

<p><u>പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ</u></p>	<p>വിത്ത്, റബ്ബർ, ക്ഷുദ്രജീവി, മണ്ണശർ, കോപ ഇല്ലംങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ദൈഹിപത്രികുംണങ്ങുക. വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പാടങ്ങൾ എത്രയും വേഗം കൊയ്യതെന്നുകൂടി, കൊയ്യതെടുത്ത കുറകൾ വയലിൽ തന്നെ കുട്ടിയിടരുത്.</p> <p>മുട്ടു കാണ്യ വിളകളായ വാഴ, പച്ചക്കറികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> <p>അവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നീർ വാർച്ച എഴുപ്പമാക്കുന്നതിന് ജല നിർശമന ചാലുകളിലെ അനാവശ്യ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക.</p> <p>വളം, വിത്ത്, കാലിത്തരിറകൾ എന്നിവ ഇരുപ്പം തടാതത്തും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുരികളിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സൃഷ്ടിക്കുക.</p> <p>കനുകാലികളെ ബലക്ഷയമുള്ള തൊഴുത്തുകളിൽ പാർപ്പിക്കരുത്</p> <p>അന്തരീക്ഷ ഉംഖാവ് കുടുതലുള്ള തിവസങ്ങളിൽ പകൽ 12 മണിയ്ക്കും 3 മണിയ്ക്കും ഇടയിൽ കാർഷിക വൃത്തികൾ ഒഴിവാക്കുക.</p> <p>വുക്ക വിളകൾ നടക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങാം. വിളകൾ നടക്കേപ്പാൾ, ചെടികൾ തമിൽ ശാന്ത്രീയമായ അകലം ഉറപ്പാക്കണം. മേൽ മണ്ണിന്റെ കുടു ജൈവ വളങ്ങൾ വിശ്രിതം ചെയ്യു വേണം കുഴികൾ മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം നിറക്കാൻ. വർഷ കാലം തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി തെക്കൾ നടാം.</p> <p>മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് മാത്രം കീടനാശിനി തളിക്കുക.</p>	
<p>നെല്ല്: വിരുപ്പു (നൗം വിള)</p>	<p>നിലമൊരുക്കൽ</p>	<p>മഴ ലഭിക്കുമ്പെന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാടം ഇഴുതൽ ആരംഭിക്കുക. അരുദ്യത്തെ ഇഴുതലിൽ തന്നെ പച്ചില വളങ്ങൾ, ഉണക്കിപൊടിച്ച ചാണക വളം എന്നിവ (മൊത്തത്തിൽ പെട്ടെന്നു അഭ്യുദായി ചെയ്യുന്നതിൽ) മണ്ണുമായി ചേർക്കുക.</p>
<p>നെല്ല്: വിരുപ്പു (നൗം വിള)</p>	<p>പരിച്ചു നട്ടിൽ (ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം പല്ലുമായി ചേരുകയിട്ടിൽ)</p>	<p>പാടത്തു നിന്നും വെള്ളവും വളവും ഒഴുകി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വരവുകളിലെ ദ്വാരങ്ങളെല്ലാം ചെളി ഉപയോഗിച്ച് അടക്കുക.</p> <p>നടുന്നതിന് മുൻപ് സുഖ്യമോണാം ലായനിയിൽ (250 ശ്രാം 750 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ) തൊറിന്റേവരുകൾ 20 മിനിട്ടു നേരം മുകളി വെയ്ക്കുന്നത് പുശ്രം രോഗബാധ തടയുന്നതിനും നൗംയി വേരുകൾ വളരുന്നതിനും സഹായകമാകും.</p> <p>പരിച്ചുനടുന്ന സമയത്ത് മധ്യകാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് സെസ്റ്റിന് 400 ശ്രാം യുറിയ, 900 ശ്രാം മസുറിഫോം, 150 ശ്രാം പൊട്ടാഷ്-ഉം ഹൈസുകാലമുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് സെസ്റ്റിന് 400 ശ്രാം യുറിയ, 700 ശ്രാം മസുറിഫോം, 120 ശ്രാം പൊട്ടാഷ്-ഉം അടിവളമായി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പൊട്ടാഷ് വളപ്പോഗം കുമ്മാധിയം ചേർത്ത് രണ്ടാഴ്ച കഴിത്തെത്തിനുശേഷം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ.</p>
<p>നെല്ല്</p>	<p>നീംസി/പരിച്ചു നടയിടങ്ങൾ</p>	<p>തണ്ടുതുരപ്പൻ</p>  <p>ടെട്ടേക്കോഗാമ മുടക്കാർഡിയുകളാണ് രൂപ ഏകരിന്ന് രണ്ട്. ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആക്രമണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടാറാൻട്രാനിലിപ്പോൽ 18.5% W/W SC 3മില്ലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിതല്ലിക്കുക.</p>

നെല്ല്	നഞ്ചാവി/പരിച്ചു നടയിടങ്ങൾ	ഓല ചുരുട്ടി പൂഴു 	ഓല ചുരുട്ടി പൂഴു ആക്രമണം ഉണ്ടാക്കിൽ മുളളുള്ള കിസു വലിച്ചു ഓലചുരുളുകൾ തുറക്കുക. ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഷ്ടൂബാൻ ദൈ അമേരിക്ക 1 മീറ്റർ 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിച്ച് കൊടുക്കുക.
തെങ്ങ്	നടിൽ	വെള്ളക്കെടുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തെങ്ങിന് അനുയോജ്യമല്ല നടാനുള്ള കുഴികൾക്ക് 1 മീറ്റർ വിതം നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചെകൾ പ്രദേശമാണെങ്കിൽ കുഴികൾക്ക് 1.2 മീറ്റർ വിതം നീളവും വീതിയും ആഴവും വേണം. മേൽമുള്ളും ചാണകപ്പാടിയും ചാരവും കുട്ടിക്കലാർത്തിയ മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് കുഴിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നിറക്കുക. ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഒരു തേങ്ങാ മുടാൻ വിധം പിള്ളക്കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ തെ വെച്ച് മള്ളിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക. താങ്ങുകാൽ നാട്ടി അതിനോട് മുകൾഭാഗം ചേർത്ത് കെടുക. തിരുവത്തേരിയ വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ മടങ്ങ ഓലയോ വാഴക്കോ കുഴിക്കരയിൽ കൂത്തി വെക്കുക. തെക്കുഴിയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴക്കാലത്ത് കുഴിയിലേക്ക് വെള്ളം ലഭിച്ചിരഞ്ഞാതിരിക്കാൻ പുറ്റും വരുന്ന് തീർക്കുക	
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കൊന്ധൻ ചെള്ളി  ഉയരം കുറഞ്ഞ തെങ്ങുകൾ പൊതുവെ കുടുതൾ ആക്രമണ വിധേയരാണ്	കൊന്ധൻ ചെള്ളി : തെങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുനിന്നും ചെള്ളിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ണുകളെ കുത്തിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ബോർഡോ കുഴന്പ് കൊണ്ട് വണ്ണുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിറക്കുന്നത് മുറിവിൽ കുടി ഉണ്ടായെങ്കാവുന്ന പുഷ്ട ബാധയെ തടയാൻ സഹായിക്കും. ഉപയോഗ സുന്ധാര മീൻ വലകൾ ഒരു മീറ്റർ നീളത്തിലും അര മീറ്റർ വീതിയിലും മുറിച്ചെടുത്തു തെങ്ങിന്റെ മുന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ലൈക്കെല്ലുകളിൽ വിരിച്ചു നടുഭാഗത്തു ചെറുക്കല്ലുകൾ വച്ച് ഉൾഭാഗത്തെക്കു തള്ളി അമർത്തി വെക്കുക. ഓലത്തണ്ടിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തെക്കും പുറതേതക്കു തുണ്ടി നിൽക്കുന്ന വലയുടെ വരങ്ങൾ നന്നായി വിടർന്നിരിക്കണം. പാറിവരുന്ന വണ്ണുകൾ കാലുകൾ വലയിൽ കുടുങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാതെ നശിച്ചു പോകും, പുതു ഓലകൾ വിടരുന്നതിനുസരിച്ച് വല മുകളിലോട് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

കുരുമുളക്ക്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>ചീച്ചൽ രോഗം</p> 	<p>ചീച്ചൽ രോഗം : മുൻകരുതലായി തെടക്കേബാധിമ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ വേപ്പിൾ പിന്നാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രോഗാമിൽ രണ്ടു ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണ് കുതിർക്കുക.</p> <p>ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തജിക്കുക.</p>
പച്ചകരികൾ	നടീൽ സമയം	<p>ചീര്, വാണി, വഴുതിന, മുളക്, കറിവേപ്പില മുതലായ വർഷകാലത്തിനു അനുയോജ്യമായ പച്ചകരികൾ നാടാൻ തുടങ്ങാം. പോദേയിലോ ചെറു പോളിത്തീൻ ബാഗുകളിലോ മുളപ്പിച്ചു വേരുകൾക്ക് കഷ്ടമേൽക്കാത്ത വിധം മാറ്റി നടുന്നതാണ് നല്ലത്.</p> <p>പച്ചകരിക്കുമ്പീകരായി നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സെൻസർ നന്നിന് രണ്ടു കിലോഗ്രാം കുമായം വിതറി ഉഴുതു മരിക്കുക. കളകളുടെ വേരുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീകം ചെയ്യുക. രണ്ടാഴ്ചയും ശേഷം ഉയർത്തിയ വരവുകളിലോ കുനകളിലോ തെടക്കേബാധിമ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ ജൈവവളങ്ങൾ മണ്ണുമായി ഇളക്കി ചേർത്ത് പച്ചകരി തെക്കൾ നടുക.</p>	
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	<p>ഇലപ്പുള്ളി രോഗം</p> 	<p>തടത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. മുൻകരുതലായി സ്വീഡാമോൺസ് ലായനി (20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയത്) രണ്ടാഴ്ചയിടവേളകളിൽ തളിക്കുക രോഗം ബാധിച്ചാൽ:- രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. കാർബൻഡാസിം അല്ലെങ്കിൽ മാങ്കാസബ് ഇവ രണ്ടാഴ്ച ഇടവേളയിൽ മാറി മാറി 2 മില്ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക</p>
കവുങ്ങ്	കായ്ക്കുന്ന സമയം	<p>പുകുല കരിച്ചിലും അടക്ക പൊഴിച്ചിലും</p> 	<p>ഉയർന്ന താപ ആർട്ട് സഫിതി തുടരുന്നതിനാൽ രോഗം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഷൈൽകോണസോൾ 1 മില്ലി/ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡോ മിശ്രിതം 1 % എന്ന തോതിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക.</p>

കപ്പ	രണ്ടു മാസം വരെ പ്രായം	മൊറൈസൈക് രോഗം		ചെടികളുടെ ആരോഗ്യം കഷയിക്കാതിരിക്കാനും വിളവ് നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനും ഇനി പറയുന്ന കരുതലുകൾ സീക്രിക്കറുക. ചെടി ഒന്നിന് 100 ശ്രാം വീതം ഡോജോമെറ്റ് ചുറ്റും നൽകി മണ്ണുമായി ഇളക്കി ചേർക്കുക. മുന്നാഴ്ത്തു ശേഷം 50 ശ്രാം ഫാക്റ്റോഫോസ് + 10 ശ്രാം പൊട്ടാഷ് + ഒരു ശ്രാം സിക് സൾഫേറ്റ് നൽകുക. നാലുത്തെല്ലു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും 10 ശ്രാം പൊട്ടാഷ് നൽകുക. അടുത്ത തവണങ്ങതെക്ക് ഈ ചെടികളിൽ നിന്നും നടീൽ വസ്തുകൾ ശേഖരിക്കരുത്.
പശു	കറവപ്പൾ	അകിടു വീക്കം		അകിടു വീക്കം :രോഗം വരുന്നത് തടയാനായി പശുകളിലുടെയും പരിസരങ്ങളിലുടെയും ശുചിത്വം എപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തുക, കറവയന്നംബാരോതവണയുംപയോഗംകഴിഞ്ഞ യുടനെകഴുകിസുകൾക്കുക.പ്രാണിശല്യം നിയന്ത്രിക്കുക, പശുകൾക്ക് രോഗപത്രിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന ദോണിക്കുകൾ നൽകുക.രോഗപലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള മുഗാശുപത്രിയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെടുക. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സ നൽകിയാൽ രോഗം ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാം.

**മു അപായവർഗ്ഗ സൂചന (അത്വനിവാരണത്തിനായ്)

താക്കീത് (ഇന്ത്യൻപടിയെടുക്കുക)	ജാഗര (യഥാരാവുക)	ശ്രദ്ധ (കാത്തോർക്കുക)	നിസ്വാരം (നടപടികൾആവശ്യമില്ല)
-----------------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------------

ഒപ്പ്/-
നോയൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ കൂട്ടിക്കാലാവന്നമ്പേരപ്പയറ്റി