



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: 2020 ജൂലൈ 22 മുതൽ ജൂലൈ 26 വരെ)



കണ്ണൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിലിക്കോട്-ഉം
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയൂക്തമായി പുനര്ത്തിക്കുന്നത്

ബഹുമാനിക്കുന്ന നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ 58/2020

തീയതി: 21/07/2020

എ. പിന്നിട്ട് അഞ്ചു ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	കാറിഞ്ഞ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
193.0	25.2 – 31.3	23.4 – 25.0	84– 98	00 -14

ബി. വരുന്ന അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	22.07.2020	23.07.2020	24.07.2020	25.07.2020	26.07.2020
മഴ, മി.മീ	18	20	19	22	10
കുടിയ താപനില, °C	31	31	31	31	31
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	25	25	25	25	25
കുടിയ ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	98	98	98	98	98
കുറഞ്ഞ ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	86	86	86	86	86
കാറിഞ്ഞ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	10	12	14	12	10
കാറിഞ്ഞ ദിശ, ഡിഗ്രി	200	250	230	230	250
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	7	7	7	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അപ്റ്റം	പ്രക്രിയാൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
രപാത്യു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം .	തെങ്ങിൽ തെക്കളുടെ മുഖ്യ ഭാഗങ്ങൾ വല കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുക. തോട്ടങ്ങൾ ശുചിയായി സുക്കിക്കുക.	
നെല്ല്	ചെന്നപ്പ് പൊട്ടുന്ന അപ്റ്റം	കളനിയന്ത്രണവും വള്ളപ്രയോഗവും	മധ്യകാല മുഴുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് സെൻ്റ്രിന് 400 ശ്രാം യുറിയ, 150 ശ്രാം പൊട്ടാഷ് എന്നീ വളങ്ങളും ഫ്രെസ്കാല മുഴുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് സെൻ്റ്രിന് 220 ശ്രാം യുറിയ, 120 ശ്രാം പൊട്ടാഷ് എന്നീ വളങ്ങളും അടിവളമായി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. വളമിടുന്നതിനു മുന്നേ കളകൾ മുഴുവനായും പരിച്ചു മാറ്റുക. പാടത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ നിർത്തി വേണം വളം ചേർക്കാൻ. വളം ചേർത്ത് 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ജലനിരപ്പ് 5 സെ.മീ. കനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക. മഴയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം വളം ചേർക്കുക.

		തെക്കൻ നടാൺ പറ്റിയ സമയമാണ്. നടാനുള്ള കുഴികൾക്ക് 1 മീറ്റർ വിത്ത് നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചെകൾ പ്രദേശമാണെങ്കിൽ കുഴികൾക്ക് 1.2 മീറ്റർ നീളവും വീതിയും ആഴവും വേണം.	
തെങ്ങ് നടിൽ	നടുന്നതിനു മുൻപ് മേൽമ്മൈനും ചാണകപ്പൊടിയും ചാരവും കുട്ടിക്കലെർത്തി മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചു കുഴിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നിറയ്ക്കണം. ഇപ്രകാരം നികത്തിയ ശേഷം, നടുവിൽ തെരുവും പാകത്തിൽ ചെറു കുഴി തയാറാക്കി കല്ലാടി ഭാഗത്തു മൈൽ വിഴാത്ത വിധത്തിൽ തെരുവും ഉറപ്പിക്കുക. തെരുവിൽ മറിഞ്ഞു വീഴാതിരിക്കാൻ താങ്ങു കൊടുക്കുക. കുഴിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒളിച്ചിരഞ്ഞാതിരിക്കാൻ ചുറ്റും വരുന്നതീർക്കുക.		
നെല്ല്	ചെന്നപ്പ് പൊട്ടുന്ന ഘട്ടം	തണ്ടു തുരപ്പൻ	ആക്രമണം ഉണ്ടാക്കില്ല ടാക്കുമി 3 ഗ്രാം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കി തളിക്കുക.
		വാട്ട്	ഫ്രൂജിയോൺ അബ്ലൈറ്റിൽ നാട്ടിവോ (2 മീറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിക്കുക.
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കൊന്ധൻ ചെളി	1. തെങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുനിന്നും ചെളിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചു വണ്ടുകളെ കുത്തിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ബോർഡേ കുഴുന്ന് കൊന്ധൻ വണ്ടുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിറക്കുന്നത് മുൻവിൽ കുടി ഉണ്ടായെങ്കാവുന്ന പുഷ്ട് ബാധയെ തടയാൻ സഹായിക്കും. 2. തെങ്ങിന്റെ മണം വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം 6 ഗ്രാം ഫെർട്ടറ (Ferterra) 250 ഗ്രാം മണല്ലും കുട്ടിക്കലെർത്തിയ മിശ്രിതം നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ പരിചരണം 3 പ്രാവശ്യം -ഇന്നുവരി, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യണമെന്ന്. തോട്ടങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം അവലംബിക്കുക.
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	ഇലപുള്ളി രോഗം	രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി തോട്ടത്തിനു വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിച്ചു കളയണം. മുറിച്ചു മാറ്റിയ ഇലകൾ താത്താരു കാരണാവശാലും തോട്ടത്തിൽ ഇടരുത്. വാഴയിൽ കോൺടാഫ് അബ്ലൈറ്റിൽ തിൽറ്റ് ഇവയിൽ എത്തക്കിലും (2 മീറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ) തളിക്കുക. 20% പൊട്ടാഷ് വളം അധികമായി നൽകുക.

കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	വാട്ടം		റീഡോമിൽ (2ഗ്രാം രൂപ പിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ) അല്ലെങ്കിൽ കോപർ ഓസ്ട്രീ ക്ലോബേറേഡ് (3ഗ്രാം രൂപ പിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ) തളിക്കുക. ഇതേ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായൻ അഞ്ചു പിറ്റർ വിത്തം ഓരോ വള്ളിയുടെയും ചുവട്ടിലെ മണ്ണിൽ കുതിർക്കുകയും ചെയ്യുക
വെള്ളരിവർഗ്ഗ വിളകൾ	വളർച്ച ഘട്ടം	മൊത്തേസക് രോഗം		വിശ്വാസയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രം വിത്തുകൾ വാങ്ങുക. രോഗം പരത്തുന്ന കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേഷധിഷ്ഠിത കീടനാശിനി (4 മിലി രൂപ പിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ) തളിക്കുക.

ഒപ്പ്/-

നോയൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ ക്ഷേഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി