



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

കണ്ണൂർ ജില്ല

(പ്രാബല്യം: 23.07.2022 മുതൽ 27.07.2022 വരെ)



കാലാവന്ധമാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 23.07.2022 മുതൽ 27.07.2022 വരെ)

കണ്ണൂർ ജില്ല



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവന്ധമാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ 58/2022	തീയതി: 22/07/2022
---	-------------------

എ. പിന്നിട ദിവസത്തെ നാല് കാലാവന്ധ

മഴ, മി.മീ	കൂടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഡത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
24.9	29.3 – 31.2	23.8 – 25.3	77 - 95	00 - 12

ബി. വരുന്ന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവന്ധമാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	23-07-2022	24-07-2022	25-07-2022	26-07-2022	27-07-2022
മഴ, മി.മീ	2	2	1.5	5	2
കൂടിയ താപനില, °C	31	31	31	31	31
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	24	24	24	24	24
കൂടിയ ആപേക്ഷിക ആർഡത, %	95	95	95	95	95
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർഡത, %	80	80	80	80	80
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	8	6	6	8	6
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	320	340	340	320	340
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	7	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
മഴ**			
<u>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</u>	<p>മഴ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 15.5 മിലി വരെ) ലഭിക്കും</p> <p>വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച് അടുത്തയാഴ്യും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.</p> <p>ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഡതയും സാധാരണമായ അന്തരീക്ഷ ഉഘാവും അനുഭവപ്പെടും.</p> <p>ആകാശം മേലാവൃതമായിരിക്കും.</p>		

<p>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</p>	<p>കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവേഷ്ട ഉയർന്ന താപനിലയും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയും ചീച്ചൽ, വാട്ട് എന്നീ രോഗങ്ങൾ പടരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത വിളകൾക്ക് താഴെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംപിക്കുക.</p> <p>വീണുകിടക്കുന്ന തേങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പുർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം. തോട്ടങ്ങളിൽ നാലു നീറ് വാർഷിക ഉറപ്പുവരുത്തുക.</p> <p>വിളകൾക്ക് വളപ്പെയോഗം ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. വിളകളുടെ വളർച്ചാഫട്ടം അനുസരിച്ച് വളം നൽകുക. വൃക്ഷ വിളകൾക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നാം ശഡു വളപ്പെയോഗം നടത്തിയിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ഉടനെ പുർത്തീകരിക്കുക.</p>		
<p>നെല്ല്</p>	<p>പിന്ന പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഫട്ടം</p>	<p>പാടത്തെ വെള്ളം താഴ്ത്തിയതിനു ശേഷം വരവുകൾ അടച്ച് വളപ്പെയോഗം ചെയ്യുക. ഹസ്കാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് ഏകരിന് 20 കിലോ യുറിയയും 12 കിലോ പെട്ടാഷ്ടും ചേർക്കുക. മധ്യകാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ഏകരിന് 40 കിലോ യുറിയയും 15 കിലോ പൊട്ടാഷ്ടും ചേർക്കുക. രോഗ കീട ബാധകൾ കൂടുതലായുള്ള പ്രവേശങ്ങളിൽ യുറിയയുടെ അളവ് മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗമായി പുരുക്കുക.</p>	
<p>നെല്ല്</p>	<p>വിവിധ ഫട്ടം</p>	<p>കരിച്ചൽ/ചീച്ചൽ രോഗം</p>	<p>മുൻകരുതലായി ലീച്ചിങ് പാഡർ (എകരിന് 2 കിലോ) സുഷിരങ്ങളുള്ള കിഴികളിലാക്കി വെള്ളം കണ്ടതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക</p> <p>രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നാട്ടിവോടു കൂടിശ്രീ നാശിനി 4 ഗ്രാം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക തളിക്കുക</p>
<p>കുരുമുളക്</p>	<p>വിവിധ ഫട്ടം</p>	<p>പൊള്ളു വണ്ട് </p>	<p>രൈലിറ്റർ ബോർഡോ മിശ്രിതത്തിൽ കീനാൽമേഡ് 25 EC രണ്ടു ലിറ്റി എന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക</p>
<p>കുരുമുളക്</p>	<p>വിവിധ ഫട്ടം</p>	<p>വാട രോഗം </p>	<p>വാട രോഗത്തിനെതിരെ മുൻകരുതലായി ടെടക്കോഡർമ സന്ധുഷ്ടമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിള്ളാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വീതം തടത്തിൽ വിതരി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p>
<p>കുരുമുളക്</p>	<p>വിവിധ ഫട്ടം</p>	<p>ചീച്ചൽ രോഗം </p>	<p>മുൻകരുതലായി ടെടക്കോഡർമ സന്ധുഷ്ടമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിള്ളാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വീതം തടത്തിൽ വിതരി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രോഗം കൂടി മുളക്കുക. ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ രോഗം തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണ് കൂതിർക്കുക.</p> <p>ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതെ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.</p>

തെങ്ങ്	വള പ്രയോഗം	ഈ സീസൺിൽ ഇതുവരെ വളപ്രയോഗം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ഗധു ഉടനെ നൽകുക. തെങ്ങാനിന് 25 കിലോ പച്ചിലവളം/ ചാണകവളം / കംബോറ്റ് എന്നിവ നൽകുക. അതോടൊപ്പം രാസവളങ്ങളും (യുറിയ: 330 ശ്രാം + രാജ്ഞഹോസ് 530 ശ്രാം + പൊട്ടാഷ് 560 ശ്രാം + മെഗ്നീഷ്യൂം സൾഫോറ്റ് 250 (ശ്രാം + ബോറാക്സ് 100 ശ്രാം) നൽകുക. ഒരു വർഷം പ്രായമായ തെങ്ങുകൾക്ക് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും രണ്ടു വർഷം പ്രായമായവക്ക് മുന്നിൽ രണ്ടുഭാഗവും വളങ്ങാൻ ചേർക്കുക. മുന്നു വർഷത്തിനു മേലുട്ടു പൂർണ്ണതോതിൽ തന്നെ വളപ്രയോഗം നടത്തുക.	
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കുന്നപ്പിയൽ	മാങ്കാസേബ് നിരച്ച, സുഷിരങ്ങൾ ഈ ചെറു പോളിത്തീൻ പാക്കറ്റുകൾ (2 ശ്രാം) തയ്യാറാക്കുക. തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡ വ്യതിയാക്കിയ ശേഷം,, മുൻകരുതലായി, ഇങ്ങനെയുള്ള മുന്നു പാക്കർ വീതം ഓരോ തെങ്ങിന്റെയും കുന്നിനു ചുറ്റും കവിളിൽ വയ്ക്കുക. മഴ പെയ്യുന്നോൾ മരുന്ന് കുറേശയായി ലെഡ്ഡിരിങ്ങുന്നത് വഴി ഈ രോഗം ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും. അശ്വകിൽ വ്യതിയാക്കിയ ശേഷം തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡയിലും, കുന്നിലും, മുൻകരുതലായി, 1% വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുക.
കവുങ്ങ്	കായ്യുന്ന ഘട്ടം	മഹാളി	ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം കുപകളിലും ഇലകളിലും തളിച്ച് കൊടുക്കുക.
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം (അന്തരം വാഴ)	കട ചീയൽ	മുൻകരുതലായി ന്റെപ്പറ്റാസൈസ്റ്റിൽ ലായനി (@2ശ്രാം പത്തു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) അശ്വകിൽ കോപ്പർ ഷൈറ്റേഡാക്സൈസ് (@20ശ്രാം പത്തു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) വാഴത്തടത്തിൽ കുതിർക്കുക
ഇണ്ണി	വിവിധ ഘട്ടം	വാട്ടം	ഒരു സെൻട്ടിന് മുന്നുകിലോ വീതം കുമായം മണ്ണിൽ ചേർത്തിളക്കുക. ടെട്ടേക്കാസലർമ, സുഖ്യോമാണസ് എന്നീ ജീവാണുകൾൾ ഉപയോഗിക്കുക. രോഗം വന്ന ചെടികൾ പിഴുതുമാറി ഒരുശത്രമാനം വീര്യമുള്ള ബോർഡോമിശ്രിതം കൊണ്ട് തടം കുതിർക്കുക.

പനി	വിവിധ ഘട്ടം	ആഫോക്കൻ പനി	<p>പനിക്കുടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ഇൻഡസ്റ്റ്രിയൽമായി സുക്ഷിക്കുക. സമ്പർഖം ശുചത്വം പാലിക്കുക. തിരിയിലും കുടിനു ചുറ്റും ആണു നശീകരണത്തിനായി കുമായം വിതരുക.</p> <p>സൈപെർമെത്രിൻ ഒരു മീറ്റി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി തയ്യാറാക്കിയ ലായനി സേപ്പയറിൽ എടുത്തു പനിക്കുടിൻര തിരിയിലും ചുമരുകളിലും തജിക്കുക. കാട്ടുപനികൾ വരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തുക.</p> <p>പുരത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആർക്കാരേ പനിക്കുട സന്ദർഭിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.</p> <p>വളർത്തു പനിയോ പുരത്തു എവിടെയെങ്കിലും കാട്ടു പനിയോ അപ്രതീക്ഷിതമായി ചത്തു കിടക്കുന്നതായി കാണുകയാണെങ്കിൽ വിവരം എത്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള മുഗാശുപത്രിയിൽ അറിയിക്കുക.</p>
-----	-------------	-------------	---

**മഴ അപായ വർഷ്ണ സൃഷ്ടി (അനുരത നിവാരണത്തിനായ്)

താക്കിൽ (ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	(ശ്രദ്ധ (കാതോർക്കുക)	നിസ്താരം (നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല)
---------------------------------	------------------------	-------------------------	----------------------------------

ഒപ്പ്/-
സോഡിയം ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി