

आजादी
का
अमृत महोत्सव



കാലാവന്ധാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
കണ്ണൂർ ജില്ല

(പ്രാബല്യം: 27.04.2022 മുതൽ 01.05.2022 വരെ)



കാലാവന്യം മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 27.04.2022 മുതൽ 01.05.2022 വരെ)



കണ്ണൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഇം ഇന്ത്യ കാലാവന്യം വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ 33/2022

തീയതി: 26/04/2022

എ. പിന്നിട്ട് അഞ്ച് ദിവസത്തെ കാലാവന്യം

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭ്ബത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
3.4	35.2-37.1	26.1-28	71-83	00.0-4.0

ബി. വരുന്ന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവന്യം മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	27-04-2022	28-04-2022	29-04-2022	30-04-2022	01-05-2022
മഴ, മി.മീ	6	0	0.1	4	0
കുടിയ താപനില, °C	36	36	36	36	36
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	28	27	27	27	27
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർഭ്ബത, %	75	75	75	75	75
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർഭ്ബത, %	62	62	62	62	62
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	6	6	6	8	10
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	250	250	250	270	270
മേലു വിന്റുസം, ഒക്ടാ	7	6	5	6	7

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫലം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
<u>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</u>			<p style="background-color: #90EE90; color: black; padding: 10px;">അങ്ങിങ്ങായി ഇടിമിനാലോട് കുടിയ രൂപൈഖ്യ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത.</p> <p>ഉയർന്ന ഉയർപ്പാവും അന്തരീക്ഷ ആർഭ്ബതയും അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം തെളിഞ്ഞതോടൊത്തീകരിക്കാതി മേലാവൃതമോ പുർണ്ണമായും മേലാവൃതമോ ആയിരിക്കും.</p> <p>പകൽ 12 മണിയ്ക്കും 3 മണിയ്ക്കും ഇടയിൽ കാർഷിക വ്യത്തികൾ ഒഴിവാക്കുക.</p> <p>അങ്ങിങ്ങായി രൂപൈഖ്യ മഴകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.</p> <p>വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച് അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചകളിൽ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ കുടുതൽ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്</p>

<p>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</p>	<p>ററ്റപ്പട്ട മഴ: വിത്ത്, റമ്പുർ, കഷുവണ്ടി, മണ്ണതൾ, കോപ്പ ഉല്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെയിലത്തിട്ടുണ്ടുകുക. വിളവെന്നു നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങൾ എത്രയും വേഗം കൊയ്യെത്താഴിയുക, കൊയ്യെത്തുത്ത കുറകൾ വയലിൽ തന്നെ കൂട്ടിയിടരുത്.</p> <p>മുട്ടു കാണ്യ വിളകളായ വാഴ, പച്ചകരികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> <p>അവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നീർ വാർച്ച എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ജല നിർഗമന ചാലുകളിലെ അനാവശ്യ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക.</p> <p>വള്ളം, വിത്ത്, കാലിത്തിറ്റുകൾ എന്നിവ ഇംഗ്ലീഷ് തട്ടാത്തതും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുറികളിൽ ഉയർത്തികെട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുക്ഷിക്കുക.</p> <p>അന്തർക്കശി ഉംഖുവാവ് കുടുതലുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പകൽ 12 മണിഫ്ഫും 3 മണിഫ്ഫും ഇടയിൽ കാർഷിക വൃത്തികൾ ഒഴിവാക്കുക</p> <p>വുക്ക വിളകൾ നടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങാം. വിളകൾ നടുന്നോൾ, ചെടികൾ തമിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അകലം ഉറപ്പാക്കണം. മേൽ മണ്ണിന്റെ കുടു ജൈവ വളങ്ങൾ മിശ്രിതം ചെയ്യു വേണു കുഴികൾ മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം നിറക്കാൻ. വർഷ കാലം തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി തെക്കൾ നടാം.</p>	
<p>നെല്ല്: വിരുപ്പു (നൊം വിള)</p>	<p>നിലമൊരു കരൽ</p>	<p>മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാടം ഉഴുതൽ ആരംഭിക്കുക. ആദ്യത്തെ ഉഴുതലിൽ തന്നെ പച്ചില വളങ്ങൾ, ഉണക്കിപൊടിച്ച ചാണക വളം എന്നിവ (മൊത്തത്തിൽ ഷൈക്കറിനു അഞ്ചു ടൺ നീരകൾ) മണ്ണുമായി ചേർക്കുക.</p>
<p>കുരുമുളക്</p>	<p>കായ്ക്കുന്ന ഐട്ടം</p>	<p>കനത്ത മഴകളിൽ പുന്നോടി വേഗം ലെപ്പിച്ചിരഞ്ഞുന്നതിനാൽ തിരികളിൽ തുല്യമായി പരാഗണം നടക്കാതെ വരും. ആയതിനാൽ, തുല്യമായ പരാഗണം സഹായിക്കാൻ മഴയില്ലാത്ത ഇടവേളകളിൽ ശക്തി കുറച്ച് തിരികളിൽ വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുക്കുക.</p>
<p>തെങ്ങ്</p>	<p>നിലമൊരു കരൽ</p>	<p>നടാൻ വേണ്ടി നിലമൊരുക്കാം. നടാനുള്ള കുഴികൾക്ക് 1 മീറ്റർ വീതം നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചെക്കൽ പ്രദേശമാണെങ്കിൽ കുഴികൾക്ക് 1.2 മീറ്റർ വീതം നീളവും വീതിയും ആഴവും വേണു. മേൽമണ്ണും ചാണകപ്പാടിയും ചാരവും കൂട്ടിക്കലെർത്തിയ മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് കുഴിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നിറക്കുക. തെക്കുഴിയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴക്കാലത്ത് കുഴിയിലേക്ക് വെള്ളം ലെപ്പിച്ചിരഞ്ഞാതിരിക്കാൻ ചുറ്റും വരവു് തീർക്കുക</p>

തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>കൊന്പൻ ചെല്ലി</p>  <p>ഉയരം കുറഞ്ഞ തെങ്ങുകൾ പൊതുവെ കുടുതൽ ആക്രമണ വിധേയരാണ്</p>	<p>തെങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുനിന്നും ചെല്ലിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ണുകളെ കുത്തിയെടുത്ത് സശിഷ്ടങ്ങുക. ബോർഡേയാ കുഴന്ന് കൊണ്ട് വണ്ണുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിരക്കുന്നത് മുൻവിൽ കുടി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പുഷ്ട ബാധയെ തടയാൻ സഹായിക്കും.</p> <p>ഉപയോഗ സുന്ധായ മീറ്റ് വലകൾ ഒരു മീറ്റ് നീളത്തിലും അര മീറ്റ് വിതിയിലും മുൻചെടുത്തു തെങ്ങിന്റെ മുന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഐക്കവീളുകളിൽ വിശ്വിസ് നടുഭാഗത്തു ചെറുകല്ലുകൾ വച്ച് ഉൾഭാഗത്തെക്കു തള്ളി അമർത്തി വെക്കുക. ഓലത്തണ്ണിന്റെ രണ്ടു ബാഹ്യതക്കും പുറത്തെക്കു തുണി നിൽക്കുന്ന വലയുടെ വശങ്ങൾ നന്നായി വിടർന്നിരിക്കണം. പാറിവരുന്ന വണ്ണുകൾ കാലുകൾ വലയിൽ കുടുങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാതെ നശിച്ചു പോകും, പുതു ഓലകൾ വിടരുന്നതിനുസരിച്ച് വല മുകളിലോട് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.</p>
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>കുന്പചീയൽ</p> 	<p>വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മുൻകരുതലായി ഓരോ തെങ്ങിന്റെയും കുന്പിനു ചുറ്റും കവിളിൽ രെടക്കോഡൈർമ്മ കൈഴ്ച് നിക്ഷേപിക്കുക.</p> <p>അമ്പകിൽ മാക്കോസേബ് നിരച്ച്, സുഷിരങ്ങൾ ഇട ചെറു പോളിത്തിന്റെ പാകരുകൾ (2 ശ്രാം) തയ്യാറാക്കുക. തെങ്ങിന്റെ മൺ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം,, മുൻകരുതലായി, ഇങ്ങനെയുള്ള മുന്നു പാകരു് വിതം ഓരോ തെങ്ങിന്റെയും കുന്പിനു ചുറ്റും കവിളിൽ വയ്ക്കുക.</p> <p>അമ്പകിൽ തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡയിലും, കുന്പിലും, മുൻകരുതലായി, 1% വീര്യമുള്ള ബോർഡേ മിശ്രിതം തളിക്കുക. 1% വീര്യമുള്ള ബോർഡേ മിശ്രിതം തളിക്കുക.</p>
കവുങ്ങ്	കായ്ക്കുന്ന ഘട്ടം	മഹാജി	<p>ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോർഡേയാ മിശ്രിതം കുപകളിലും ഇപകളിലും തളിച്ച് കൊടുക്കുക.</p>

കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	ചീചുൽ രോഗം 	മുൻകരുതലായി ടെടങ്കോഡാഡർമ സന്ദുഷ്യമാക്കിയ വേപിൻ പിസ്റ്റാക്ക്-ചാണക മിസ്രിതം 150 ഗ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണമായി ചേർത്തിളക്കുക. രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണു തുടങ്ങിയാൽ രീഡോമിൽ രണ്ടു ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണ് കുതിർക്കുക. ഇലകളിൽ ചീചുൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിസ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	ഇലപുള്ളി രോഗം 	രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. ടിൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാഫ് ഇവയിലേതെങ്കിലും 2 മീലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	തടതുരപ്പൻ വണ്ണ് 	കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കുക. ബ്യൂവേറിയ ബനിയാന എന്ന മിത്ര കുമിൾ 5 , 6 , 7 മാസങ്ങളിൽ ഒരു ലിറ്റർിന് 20 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കലക്കി ഓലക്കവിളുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വണ്ണിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ തുരന്ന ഭാരങ്ങളോ മണ്ണത്തിലേക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഫിപ്രോനിൽ 0.015% (ഒരു ലിറ്റർ 3 മീലി എന്ന തോതിൽ) ഓലക്കവിളുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.
മൃഗ സംരക്ഷണം	വിവിധ ഘട്ടം	അരത്തോഷ്മാവ് 	ധാരാളം ശുദ്ധ ജലം എപ്പോഴും കൂടിക്കാൻ ലഭ്യമാക്കും. ശരീര ഭാരത്തിന്റെ 60 ശതമാനത്തിലെല്ലാകും ജലാംശമാണെന്നതും പാലിൽ ജലാശം 80 ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നതും മറക്കാതിരിക്കുക. എളുപ്പം ദഹിക്കുന്ന വരാഹാരത്തിന്റെ അളവു കൂടുക. ഇതോടൊപ്പം സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, സിക്ക്, മാംഗനൈസ്, കോഷർ എന്നിവ അടങ്കിയ ധാതുവരണ മിസ്രിതം കൂടി നൽകുക. ദിവസത്തിൽ ചുടുകൂടുതലും സമയങ്ങളിൽ തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പകൽ സമയങ്ങളിൽ, തൊഴുത്തിന് വെളിയിലാണെങ്കിൽ, മുഗങ്ങളെ തന്നെ മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിർത്തുക.

ഒപ്പ്/-
നോഡൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി