



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 29.10.2022 മുതൽ 02.10.2022 വരെ)

കണ്ണൂർ ജില്ല



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.എൽ.ആർ 86/2022

തീയതി: 28/10/2022

എ. പിന്നിട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
0.0	33.5 – 34.7	22.8 – 24.0	58.5 – 79.8	04 - 06

ബി. വരുന്ന അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	29-10-2022	30-10-2022	31-10-2022	01-11-2022	02-11-2022
മഴ, മി.മീ	0.1	0.1	2	1	2
കുടിയ താപനില, °C	34	34	34	34	32
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	23	23	23	23	25
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	80	80	80	80	80
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	60	60	60	60	60
കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	4	2	2	2	2
കാറിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	290	250	230	250	270
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	2	3	8	5	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ശക്തികുറഞ്ഞ മഴ ലഭിക്കും **			
<p>ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 15.5മീലി വരെ മാത്രം തീവ്രതയുള്ള രൂപപ്പെട്ട ശക്തികുറഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.</p> <p>ഇടിയ്ക്കും മിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്.</p> <p>അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചകളിലും ശരാശരി (ആഴ്ചയിൽ 73 മീലി മീറ്റർ) മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതി ദിന കുടിയ ഉഖ്താവ്, കുറഞ്ഞ ഉഖ്താവ് എന്നിവ ശരാശരിയിൽ താഴെ ആയിരിക്കും.</p> <p>ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഭത അനുഭവപ്പെടും. മഴയില്ലാത്ത ഇടവേളകളിൽ അധികരിച്ച ഉഖ്തവും മഴ സമയത്ത് ശരാശരിയിൽ താഴ്ന്ന ഉഖ്താവും അനുഭവപ്പെടും</p>			

പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	<p>നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ ശ്രദ്ധയുള്ള പച്ചകൾ. കാലാതീരുമായി ഏന്തിവയുടെ കൂഷികൾ അനുയോജ്യമാണ്.</p> <p>വീണുകിടക്കുന്ന തേങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പുർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുറിച്ചുമാറ്റി തിയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം.</p> <p>വാഴ പോലുള്ള മുട്ടകാണ്ഡവും എളുപ്പത്തിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതുമായ വിളകൾക്ക് താങ്ങുകൾ നൽകി സംരക്ഷിക്കും</p> <p>വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മഞ്ഞൾ, കൊപ്പ, വള്ളം എന്നിവ സുരക്ഷിതമാക്കി സുക്ഷിക്കുക</p>			
രണ്ടാം വിള (മുണ്ടകൾ)പാ ം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയം	<p>മൺിൽ ഇരുന്നിരസ്സ് അംശം കുടുതലായതുകൊണ്ട് മൺിൽ പുളിരസം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും നെല്ലിരസ്സ് വളർച്ച മുരടിക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. മൺ പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ആവശ്യമായ അളവിൽ കുമ്മായം/ഡോളമേയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മൺ പരിശോധന സാധ്യമായില്ല എങ്കിൽ പരിച്ചു നടുന്നതിനു രണ്ടാം മുൻപേ പാടത്തു രണ്ടു തവണ എക്കിലും വെള്ളം കയറ്റി നന്നായി വാർത്തു കളയുക. അതിനു ശേഷം കുമ്മായം/ഡോളമേയർ സെസ്റ്റിന് 2കിലോ ശ്രാം എന്ന തോതിൽ മുള്ളുമായി നന്നായി ചേർത്തിളക്കണം. പരിച്ചു നടത്തിന് ശേഷം 30-40 ദിവസം കഴിയുന്നോൾ വീണും മേൽപ്പറഞ്ഞ അളവിൽ പാടത്തു വിതറി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പൊട്ടാഷ് വളപ്രയോഗം കുമ്മായം ചേർത്ത് രണ്ടാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമേ പാടുള്ളൂ. നിലമൊരുക്കുന്ന സമയത്തു ചാണകം /കുന്നോസ്സു, പച്ചില വളം എന്നിവ സെസ്റ്റിന് 20കിലോ ശ്രാം എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് ഉഴുതു മരിക്കണം.</p> <p>പാടത്തെ വെള്ളവും പോഷകാംശങ്ങളും നഷ്ടപെടാതിരിക്കാൻ ചുറ്റുമുള്ള വരവുകളിലെ വിളുപ്പും ദ്രാവങ്ങളും ചാലി ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കുക.</p>			
പച്ചകൾകൾ	തെതകൾ	<p>മൺിൽ, സെസ്റ്റ് നെന്നിന് നാല് കിലോ വീതം കുമ്മായം വിതരുക. കുടാതെ ടൈറ്റോഡൈർഫ് സപുഷ്ടമാക്കിയ ചാണകമോ കുന്നോസ്സു ഉപയോഗിക്കുക. ഈ വാട്ട് രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.</p> <p>പരിച്ചു നടുന്നതിനു തൊട്ടു മുന്നേ വേർ പ്രസ്തുതയോമാണാസ് ലായനി (20മില്ലി. പ്രസ്തുതയോമാണാസ് രൈ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ)-ൽ അര മണിക്കൂർ മുക്കി വെക്കുക. നേരിട്ട് വിത്ത് നടത്താണെങ്കിൽ തെതകൾക്ക് ലായനി ഇലകളിൽ തജ്ജിക്കുക. ഈ തെതകൾ കരുതേതാടെ വളരുന്നതിന് സഹായകമാകും.</p>		
നെല്ല്	ഞാറ്റ്/ തെതകൾ	 ഓല ചുരുട്ടിപ്പുഴു	<p>മുള്ളുള്ള കവു നെല്ലോലകൾക്കിടയിലും വലിച്ച് ചുരുളുകൾ തുറക്കുക. തന്നെ വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമണം കുടുതലായിരിക്കും. നെന്തജിൽ വളങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കരുത്. ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ മാത്രം 'കൊറാജേസ്' 3 മില്ലി പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നതോതിൽ കലർത്തി തജിക്കുക.</p>	
നെല്ല്	വിവിധ എട്ട്	 കുഴൽ പുഴു	<p>കരി ഓലയോ മരുന്നൊയോ മുകിയ രൈ കയർ നെല്ലോലകളും മുകളിലും വലിച്ച് പുഴുക്കളെ വെള്ളത്തിലേക്ക് തജിയിട്ടു വെള്ളം വാർത്തു കളയുക. പാടത്തു വെള്ളം വാർത്തത്തിന് ശേഷം മരുന്നൊ 1 L / അരക്കെ പൊടി/ 25 kg മണൽ ഒരേക്കിലേക്ക് വിതരുക</p>	

തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	ചെന്നു ചെല്ലി 	നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ:- നേർപ്പിച്ച ഇമിസാക്കളാർപ്പീസ് (1മീലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) ലായനി ചെല്ലി തുരന്ന ദ്വാരാങ്ങളിൽ നിന്നെയെ ഒഴിക്കുക. തോട്ടങ്ങളിൽ സമൃദ്ധം ശുചിത്വം അവലോബിക്കുക.
കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	ചീചൂൽ രോഗം 	രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രോഗാമിൽ രണ്ടു ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണ് കുതിർക്കുക. ഇലകളിൽ ചീചൂൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	ഇലപ്പുള്ളി രോഗം 	രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. ടിൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാഫ് ഇവയിലേതെങ്കിലും 2 മീലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക
വെള്ളരി വർദ്ധ വിള	വളർച്ചാ ഘട്ടം	മുട്ടുരോമ പുഷ്ടൻ രോഗം 	വെള്ളരി വർദ്ധ വിളകളിൽ മുട്ടുരോമ പുഷ്ടൻ രോഗം പടരാൻ സാധ്യത. മുൻ കരുതലായി മാങ്കോസൈബിൾ 2 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കി ഇലകളുടെ ഇരു വശത്തും തളിക്കുക. രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ അങ്കോമിൽ 3 മീലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ 15 റിവസ ഇടവേളകളിൽ മുന്നു തവണ തളിക്കുക. രോഗബാധിത ഇലകൾ പറിച്ചെടുത്ത് തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക
തക്കാളി	വളർച്ചാ ഘട്ടം	വാട്ടം 	രോഗാമിൽ രണ്ടു ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്കോമിൽ 2 മീലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക

ഇണ്ണി,	വിവിധ ഘട്ടം	പ്രധാനോറിയം വാട്ടം	നീർവാർച്ച സഞ്ചരം ഏർപ്പെടുത്തുക. കോപൾ ഓൺ ക്ലാറ്റോറേഡ് രൈലിറ്റർ വെള്ളത്തില് രണ്ടുഗാം വിതം കലർത്തി തടത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക
മത്തശ്ശ്	മത്തശ്ശ് ഇരജുന സമയം	ഇല/മത്തശ്ശ് ചീപ്പൽ	കാർബൺഡാസിം രൈലിറ്റർ വെള്ളത്തില് രണ്ടുഗാം വിതം കലർത്തി തളിക്കുക
ക്രൂമാവ്	കായ്ക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള ഘട്ടം	തേയില കൊതുക്	രൈ ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോർഡേം വിശ്രിതത്തിൽ രൈ പിറ്റിൽ 2 മിലി വിതം കീനാൽഫോസ് ചേർത്ത് തളിക്കുക
റൈ	വിവിധ ഘട്ടം	കട ചീയൽ (Collar rot)	രോഗം ബാധിച്ച മരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക. ചുറുമുള്ള മരങ്ങളുടെ തടത്തിൽ 0.3% വീരുമുള്ള കോപൾ ഓൺ ക്ലാറ്റോറേഡ് ലായൻ കുതിർക്കുക. കുടാതെ രൈ കിലോ വിതം ഡോളിമേറ്റ് കൂടി തടത്തിൽ വിതരുക.

**മഴ അപായ വർഷാ സുചന (ആരന്ത നിവാരണത്തിനായ്)

താക്കീത് (ഇടൻ നടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)		മുഖ (കാതോർക്കുക)	നിസ്വാരം (നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല)
----------------------------------	------------------------	--	---------------------	----------------------------------

ഒപ്പ്/-
നോഡൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി