



## കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 17.12.2022 മുതൽ 21.12.2022 വരെ)



### കാസറഗോഡ് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം  
പിലിക്കോട്-ഇം ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട് / ക.എസ്.ഡി.100/2022

തീയതി: 16/12/2022

എ. പിനിക്സ് നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
15.4	29.0 – 31.5	18.5 – 23.0	68.0 – 96.0	0.9 – 2.8

ബി. വരുന്ന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	17-12-2022	18-12-2022	19-12-2022	20-12-2022	21-12-2022
മഴ, മി.മീ	0	0	0	0	0
കുടിയ താപനില, °C	33	33	33	33	33
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	21	21	21	21	21
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	89	89	89	89	89
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	80	80	80	80	80
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	4	4	4	4	4
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	270	290	290	270	270
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	2	2	3	6	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫട്ടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
<b>മഴയില്ല **</b>			
<u>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</u> <p>മഴയില്ല. പകൽസമയങ്ങളിൽ കുടിയ ഉള്ളാവും (<math>34^{\circ}\text{C}</math>) രാത്രികളിൽ കുറഞ്ഞതാപനിലയും (<math>23^{\circ}\text{C}</math>) അനുഭവപ്പെടും.</p> <p>ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഭതയും അനുഭവപ്പെടും (65% നും 95% നും ഇടയിൽ).</p>			
<u>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</u> <p>അന്തരീക്ഷ ആർഭ അധികരിക്കുന്നതിനാൽ വിളകളിൽ ചീഛൾ, വാട്ട് എന്നിവയ്ക്ക് ഹേതുവായ പുഷ്ട രോഗങ്ങൾ അധികരിക്കും. സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് മഴമുലം മുടുക്കം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ തുരപ്പൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന കീട ബാധകൾ അധികാരിച്ചേക്കാം. വൈളിവരൾ പച്ചകർികളിൽ അസാധാരണമായ പുക്കാഴ്ചൾ, പെൺപുകളുടെ എള്ളം കുറവ് എന്നിവ ഉണ്ടായേക്കും.</p> <p>വരും ദിവസങ്ങളിലും ഓന്ന് രണ്ട് ശക്തികുറഞ്ഞ മഴ ലഭിച്ചേക്കും. നെല്ല്, കൊച്ചു, റബ്ബർ പോലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ വെയിപ്പത്തിട്ടു ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക.</p>			

	വാഴ പോലുള്ള മൃദുകാണ്ഡവും എളുപ്പത്തിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതുമായ വിളകൾക്ക് താങ്ങുകൾ നൽകി സംരക്ഷിക്കുക		
	വീഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തെങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പുർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുൻപുമാറ്റി തിയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം.		
നെല്ല്	വിവിധ ഘട്ടം	കരച്ചിൽ/ചീച്ചൽ രോഗം	ബീച്ചിൽ പാഠർ (എക്കരിന് 2 കിലോ) സുഷിരങ്ങളുള്ള കിഴീകളിലാകി വെള്ളം കണ്ണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കുന്നു ചീയൽ 	കുന്നുചീയൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിമാറ്റി നശിപ്പിക്കുകയും മുൻവിൽ ബോഡേ കുഴനു പുരുക്കയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാസു വരുന്നത് വരെ കുന്നിനെ ഒരു പ്ലാറ്റിക് കലാസുപയോഗിച്ചു പൊതിഞ്ഞു മഴ വെള്ളം ഇരഞ്ഞാൽ സംരക്ഷിക്കുക. സമീപത്തുള്ള തെങ്ങുകളുടെ കുരുതെതാലുകൂം ചുറ്റുമുള്ള ലൈക്കിളിലും ഒരു ശത്രമാനം വീരുമുള്ള ബോഡേ മിശ്രിതം തളിക്കുക. ദുർബല മേഖലകളിൽ, തെങ്ങുകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്താൻ സുക്ഷ്മ മുലകങ്ങൾ ഉശ്രഹപട്ടനം സമഗ്ര പോഷക മുലക പരിപാലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	ചെമ്പൻ ചെല്ലി 	നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ:- നേർപ്പിച്ച ഇമിഡാക്ലോർഫില്സ് (1മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) ലായനി ചെല്ലി തുരന്ന ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നെയെ തളിക്കുക. തോട്ടങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വം അവലംബിക്കുക.
കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	ചീച്ചൽ രോഗം 	രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രോഗാർഥി രണ്ടു ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മൾ്ല് കുതിർക്കുക. ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	ഇലപ്പുള്ളി രോഗം 	തടത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിന്മക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. മുൻകരുതലായി സുരൂഡാമോൺസ് ലായനി (20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയത്) രണ്ടാഴ്യിടവേളകളിൽ തളിക്കുക രോഗം ബാധിച്ചാൽ:- രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റി തിയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. കാർബൻഡാസിം അമൈക്രിൽ മാങ്കാസബ് ഇവ രണ്ടാഴ്യിടവേളകളിൽ മാറി മാറി 2 മില്ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിച്ച കൊടുക്കുക
വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകൾ	പുഷ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം	അസാധാരണമായ പുരക്കാഴ്ചയ്ക്ക്	'സാല്പുവോൾ' 2 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നാ തോതിൽ കലർത്തി തളിച്ച കൊടുക്കുക.

വെള്ളരി വർഗ്ഗ പീജ	വളർച്ചാ ഘട്ടം	മുദ്രുരോമ പുഷ്ടൽ രോഗം 	വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകളിൽ മുദ്രുരോമ പുഷ്ടൽ രോഗം പടരാൻ സാധ്യത. മുൻ കരുതലായി 'മാങ്കോസെബ്' 2 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കി ഇലകളുടെ ഇരു വശത്തും തളിക്കുക. രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ അങ്കോമിൻ 3 മില്ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ 15 ദിവസ ഇടവേളകളിൽ മുന്നു തവണ തളിക്കുക. രോഗബാധിത ഇലകൾ പറിച്ചെടുത്ത് തീയിച്ച് നശിപ്പിക്കുക
കശുമാവ്	തളിരിടുക്കും പുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം	തേയിലകോതുക്കും അനുബന്ധ പുഷ്ടൽ രോഗങ്ങളും 	കോപർ ഓല്ലി ഷ്ടോറേഡ് 3 ശ്രാം വീതവും എക്കാലപ്പള്ള് 2 മില്ലി വീതവും ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായൻ തളിക്കുക
കശുമാവ്	വിവിധ ഘട്ടം	തടിതുരപ്പൻ 	താഴ്ക്കിളിലും പുരം കാണുന്ന വേരുകളിലും ഷോർഡപെറിഫോസ് 2 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായൻ പുരുട്ടുകയും ചെയ്യുക. 5 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പ്രായമായ മരങ്ങളാണെങ്കിൽ ചെളി : ടാർ - മഞ്ഞാളി മിശ്രിതം (1:2അനുപാതത്തിൽ) മുൻകരുതലായി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്
കവുങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	വേരിൽ നിമാവിരകൾ 	മൺതളിപ്പ് കാണുന്ന കവുങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ (നിമവിരകൾക്ക്) - കാർബോസൽഫോസ് 25 EC 4 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ (ഒരു ചെടിയിൽ കുറെത്ത് 3 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തയ്യാറാക്കി തളിക്കുക
കവുങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	ഇല കരിച്ചിൽ 	രോഗബാധയുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ പ്രോപിക്കോസെസാൾ 1 മില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കാകോസെസാൾ 1 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തളിച്ച് 14 ദിവസത്തിനു ശേഷം കോപർ ഓല്ലിഷ്ടോറേഡ് 2-3 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ( തളിച്ചു കൊടുക്കണം. വിള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക: ദൈനക്കോഡി സന്പുഷ്പികരിച്ച ജൈവവളം മണ്ണിൽ ചേർക്കുക. അരക്കിലോ വിതം കുമ്മായംഡോളാമെറ്റ്, കാൽക്കിലോ രാജ്ഞഫോസ്, കാൽക്കിലോ പൊട്ടാഷ്, 150 ശ്രാം മഗ്നീഷ്യം സർഫോറ്റ്, 50 ശ്രാം ബോറാക്സ് എന്നിവ ഇട്ടു കൊടുക്കുകുമായിട്ട്. 5 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞു വേണം മറ്റു വളങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ .

			അമിത ജലസേചനം രോഗബാധ കുടുമ്പനാൽ ജലസേചനം നിയന്ത്രിക്കണം.
കരവ പശുക്കൾ	വിവിധ ഘട്ടം	കുളിവു രോഗം 	അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്നും വാക്സിൻ നൽകുക. തൊഴുത്തും പരിസരവും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക.
കരവ പശുക്കൾ	വിവിധ ഘട്ടം	ചർമ്മ മുഴ രോഗം 	അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്നും വാക്സിൻ നൽകുക. തൊഴുത്തും പരിസരവും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക.
ആട്	വിവിധ ഘട്ടം	വസന്ത രോഗം 	അടുത്തുള്ള മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്നും വാക്സിൻ നൽകുക. തൊഴുത്തും പരിസരവും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക.

\*\*മത അപായ വർണ്ണ സൂചന (ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്)

താക്കിൽ (ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	(ശൈല (കാത്രോർക്കുക)	നിസ്താരം (നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല)
---------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------

ഒപ്പ്/-  
നോയൽ ഓഫീസർ  
ഗ്രാമീണ കൂഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി