



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: 2020 സെപ്റ്റംബർ 19 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 23 വരെ)



കാസറഗോഡ് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാഭേദിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിലിക്കോട്-ഉം
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയൂക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

വകുപ്പിൽ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/ കെ.എസ്.ഡി.75/2020

തീയതി: 18/09/2020

എ. പിന്നിട്ട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	കാറ്റിരെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
85.9	29.5 – 30.0	23.5 – 24.0	92– 96	01-02

ബി. വരുന അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	19.09.2020	20.09.2020	21.09.2020	22.09.2020	23.09.2020
മഴ, മി.മീ	30	31	24	27	19
കുടിയ താപനില, °C	30	30	30	30	30
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	23	23	23	23	23
കുടിയ ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	98	98	98	98	98
കുറഞ്ഞ ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	88	88	88	88	88
കാറ്റിരെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	16	20	16	16	8
കാറ്റിരെ ദിശ, ഡിഗ്രി	290	290	250	250	250
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫട്ടം	പ്രാണങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ		വരും ദിനവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് (മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ശരാഖിക്കുക).	

തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>കൊന്ദൻ ചെല്ലി</p>  <p>ഉയരം കുറഞ്ഞ തെങ്ങിനങ്ങൾ പൊതുവെ കുടുതൽ ആക്രമണ വിധേയരാണ്</p>	<p>തെങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുനിന്നും ചെല്ലിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ണുകളെ കുത്തിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ബോർഡോ കുഴന്മാർ വണ്ണുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിറക്കുന്നത് മുറിവിൽ കൂടി ഉണ്ടായെങ്കാവുന്ന പുഷ്ട ബാധയെ തടയാൻ സഹായിക്കും.</p> <p>2. തെങ്ങിന്റെ മണ വ്യത്തിയാക്കിയ ശേഷം 6 ഗ്രാം ഫെർട്ടറ (Ferterra) 250 ഗ്രാം മണമും കൂട്ടിക്കല്ലർത്തിയ മിസ്രിതം നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ പരിചരണം 3 പ്രാവശ്യം -ജനുവരി, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യണമെന്ന്.</p> <p>തോട്ടങ്ങളിൽ സന്ധുർണ്ണ ശുചിത്വം അവലൂഭിക്കുക.</p>
വാഴ	വിവിധഘട്ടം	<p>ഇലപുള്ളി രോഗം</p> 	<p>രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റി തിയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. രോഴ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ശതമാനം ബോർഡോമിസ്രിതം ലിറ്ററിന് ഒരു മില്ലി പശ കൂടി ചേർത്ത് തളിക്കുക. കുമിൾനാശിനിയായ കാർബൺടാസിം (0.1 %) അല്ലെങ്കിൽ മാക്കാസിം (0.2 %) രണ്ടാഴ്ച ഇടവേളയിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക.</p> <p>ടടബുക്കോണാസൊൾ/ഡൈഫെനോകോണാസൊൾ/അഡോസാക്സിഡ്രോബിൻ എന്നിവ 0.1% വീര്യത്തിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക.</p>
കശുമാവ്	പുഷ്ടിക്കുന്ന ഘട്ടം	<p>തേയിലക്കാതുക്</p> 	<p>കിനാൽഫോസ് 2 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക.</p>
കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>ഭുത വാട്ടം</p> 	<p>റീഡോമിൽ (2 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ) അല്ലെങ്കിൽ കോപർ ഓൾഡി ക്ലോറൈഡ് (3 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ) തളിക്കുക. ഇതേ റീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായൻ അത്യും ലിറ്റർ വിത്തം ഓരോ വള്ളിയുടെയും ചുവട്ടിലെ മണ്ണിൽ കുതിർക്കുകയും ചെയ്യുക</p>
വെണ്ണ	വിവിധ ഘട്ടം	<p>തണ്ണുതുരപ്പൻ</p> 	<p>വേപ്പണ്ണ മിസ്രിതം 5 ശതമാനം 15 ഓ 20 റിവസം ഇടവേളകളിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കിനാൽഫോസ് 2 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക</p>

ഒപ്പ്/-

നോയൽ ഓഫീസർ

ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി