

आजादी
का
अमृत महोत्सव



കാലാവന്ധാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

കാസറഗോഡ് ജില്ല

(പ്രാബല്യം: 23.07.2022 മുതൽ 27.07.2022 വരെ)



കാലാവന്ധി മുന്നിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: 23.07.2022 മുതൽ 27.07.2022 വരെ)



കാസറഗോഡ് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവന്ധി വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/ക.എസ്.ഡി.58/2022

തീയതി: 22/07/2022

എ. പിന്നിക്ക് നാല് ദിവസത്തെ കാലാവന്ധി

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറെ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
30.0	29.0 – 30.0	24.0 – 24.1	83 - 93	01 - 02

ബി. വരുന്ന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവന്ധി മുന്നിയിപ്പ്

സൂചിക	23-07-2022	24-07-2022	25-07-2022	26-07-2022	27-07-2022
മഴ, മി.മീ	4	2	8	10	8
കുടിയ താപനില, °C	31	31	31	31	31
കുറെ താപനില, °C	26	26	26	26	26
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	97	97	97	97	97
കുറെ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	88	88	88	88	88
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	5	5	6	8	6
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	340	340	320	290	340
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	7	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ			മഴ**

മഴ (ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറിൽ 15.5 മിലി വരെ) ലഭിക്കും
വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനമനുസരിച്ച് അടുത്തയാഴ്യും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഭതയും സാധാരണമായ അന്തരീക്ഷ ഉള്ളാവും അനുഭവപ്പെടും.
ആകാശം മേലാവുതമായിരിക്കും.

<p style="text-align: center;">പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</p>	<p>കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഉയർന്ന താപനിലയും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയും ചീച്ചൽ, വാട്ട് എന്നീ രോഗങ്ങൾ പടരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത വിളകൾക്ക് താഴെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലോക്കുക.</p> <p>വീണ്ടുകിടക്കുന്ന തേങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പുർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം. തോടങ്ങളിൽ നല്ല നീർ വാർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുക.</p> <p>വിളകൾക്ക് വളപ്പെയ്യാഗം ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയാണ്. വിളകളുടെ വളർച്ചാഫട്ടം അനുസരിച്ച് വളം നൽകുക. വൃക്ഷ വിളകൾക്ക് ഇതുവരെ ഏനാം ഗഡ്യ വളപ്പെയ്യാഗം നടത്തിയിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ഉടനെ പുർത്തീകരിക്കുക.</p>		
<p>നെല്ല്</p>	<p>പിന്ന പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഫട്ടം</p>	<p>പാരതത്ത് വെള്ളം താഴ്ത്തിയതിനു ശേഷം വരവുകൾ അടച്ച് വളപ്പെയ്യാഗം ചെയ്യുക. ഹസ്കാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് ഏകരിന് 20 കിലോ യൂറിയയും 12 കിലോ പൊട്ടാഷ്യും ചേർക്കുക. മധ്യകാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾ ആശാങ്കിൽ ഏകരിന് 40 കിലോ യൂറിയയും 15 കിലോ പൊട്ടാഷ്യും ചേർക്കുക. രോഗ കീട ബാധകൾ കൂടുതലായുള്ള പ്രോശങ്ങളിൽ യൂറിയയുടെ അളവ് മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗമായി ചുരുക്കുക.</p>	
<p>നെല്ല്</p>	<p>വിവിധ ഫട്ടം</p>	<p>കരിച്ചൽ/ചീച്ചൽ രോഗം</p>	<p>മുൻകരുതലായി ഷൈച്ചിങ് പാഡർ (എകരിന് 2 കിലോ) സുഷിരങ്ങളുള്ള കിഴികളിലാക്കി വെള്ളം കണ്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക</p> <p>രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നാട്ടിവോടു കൂടിശിൽ നാശിനി 4 ഗ്രാം 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക തളിക്കുക</p>
<p>കുരുമുളക്</p>	<p>വിവിധ ഫട്ടം</p>	<p>പൊള്ളു വണ്ട് </p>	<p>രൂപിറ്റർ ബോർഡോ മിശ്രി എന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക</p>
<p>കുരുമുളക്</p>	<p>വിവിധ ഫട്ടം</p>	<p>വാട് രോഗം </p>	<p>വാട് രോഗത്തിനെതിരെ മുൻകരുതലായി ഒടക്കോഡായർമ്മ സമ്പൂഷ്മാക്കിയ വേഫിൻ പിണ്ണാക്ക്-ചാണക മിശ്രിയിൽ 150 ഗ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p>
<p>കുരുമുളക്</p>	<p>വിവിധ ഫട്ടം</p>	<p>ചീച്ചൽ രോഗം </p>	<p>മുൻകരുതലായി ഒടക്കോഡായർമ്മ സമ്പൂഷ്മാക്കിയ വേഫിൻ പിണ്ണാക്ക്-ചാണക മിശ്രിയിൽ 150 ഗ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രോഗാവിൽ രണ്ടു ഗ്രാം രൂപിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മൺകുതിർക്കുക.</p> <p>ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതെ മിശ്രിയിൽ ഇലകളിലും തളിക്കുക.</p>

തെങ്ങ്	വള പ്രയോഗം	ഇരു സീസണിൽ ഇതുവരെ വളപ്രയോഗം ചെയ്തിരുന്നുകിൽ നന്നാം ശധു ഉടനെ നൽകുക. തെങ്ങാനിന് 25 കിലോ പച്ചിലവളം / ചാണകവളം / കംബോറ്റ് എന്നിവ നൽകുക. അതോടൊപ്പം രാസവളങ്ങളും (യും: 330 ഗ്രാം + രാജ്ഞോമാസ് 530 ഗ്രാം + പൊട്ടാഷ് 560 ഗ്രാം + മെഗ്നീഷ്യൂം സർഫേറ്റ് 250 ഗ്രാം + ബോറാക്സ് 100 ഗ്രാം) നൽകുക. ഒരു വർഷം പ്രായമായ തെങ്ങുകൾക്ക് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ നന്നാം രണ്ടു വർഷം പ്രായമായവക്ക് മുന്നിൽ രണ്ടുഭാഗവും വളങ്ങാൻ ചേർക്കുക. മുന്നു വർഷത്തിനു മേലുള്ള പൂർണ്ണതോതിൽ തന്നെ വളപ്രയോഗം നടത്തുക.	
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കുന്നപ്പീയൽ	മാങ്കാസേബ് നിരച്ച, സുഷ്പിരങ്ങൾ ഈട് ചെരു പോളിത്തിൻ പാക്കറ്റുകൾ (2 ഗ്രാം) തയ്യാറാക്കുക. തെങ്ങിന്റെ മണ്ണ വ്യത്തിയാക്കിയ ശേഷം, മുൻകരുതലായി, ഇങ്ങനെന്നയുള്ള മുന്നു പാക്കറ്റ് വീതം ഓരോ തെങ്ങിന്റെയും കുന്നപ്പീയ ചുറ്റും കവിളിൽ വയ്ക്കുക. മഴ പെയ്യുന്നോൾ മരുന്ന് കുറേശയായി ലഭിച്ചിരഞ്ഞുന്നത് വഴി ഈ രോഗം ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ.
കവുങ്ങ്	കായ്ക്കുന്ന ഘട്ടം	മഹാജി	ഒരു ശതമാനം വീരമുള്ള ബോർഡേയാ മിശ്രിതം കുലകളിലും ഇലകളിലും തളിച്ച് കൊടുക്കുക.
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം (നേന്തേൻ വാഴ)	കട ചീയൽ	മുൻകരുതലായി സ്കെടപ്പോരസസ്ഥിൻ ലായനി (@2ഗ്രാം പത്തു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) അല്ലെങ്കിൽ കോപർ ഹൈഡ്രോക്സേസിൾ (@20ഗ്രാം പത്തു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) വാഴത്തടത്തിൽ കുതിർക്കുക
ഹംഖി	വിവിധ ഘട്ടം	വാട്ടം	ഒരു സെൻസ്റ്റിന് മുന്നുകിലോ വീതം കുമായം മണ്ണിൽ ചേർത്തിളക്കുക. കെടക്കോഡൈർ, സുഖദേശമോണസ് എന്നീ ജീവാണുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. രോഗം വന്ന ചെടികൾ പിഴുതുമാറി ഒരുശതമാനം വീരമുള്ള ബോർഡേയാമിശ്രിതം കൊണ്ട് തടം കുതിർക്കുക.

പനി	വിവിധ ഘട്ടം	ആഫീക്കൻ പനി	പനിക്കുട്ടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യൻ പരമായി സുക്ഷിക്കുക. സമ്പൂർണ്ണ ശുചത്യം പാലിക്കുക. തിയിലും കൂടിനു ചുറ്റും ആഞ്ചു നശീകരണത്തിനായി കുമായം വിതരുക. സൈപെർമെത്രിൻ ഒരു മീറ്റി ഒരു പിറ്റെ വൈള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ കലക്കി തയ്യാറാക്കിയ ലായൻ സേപ്പയറിൽ എടുത്തു പനിക്കുടിൻരെ തിയിലും ചുമരുകളിലും തളിക്കുക. കാടുപനികൾ വരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ജാഗ്രത പുലർത്തുക. പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ പനിക്കുട് സന്ദർശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. വളർത്തു പനിയോ പുറത്തു എവിടെയെങ്കിലും കാടു പനിയോ അപ്പതീക്ഷിതമായി ചത്തു കിടക്കുന്നതായി കാണുകയാണെങ്കിൽ വിവരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള മുഗാശുപത്രിയിൽ അറിയിക്കുക.
-----	-------------	-------------	--

**മഴ അപായ വർഷ സുചന (ബുരുത നിവാരണത്തിനായ്)

താക്കിൽ (ഇടം നടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	ശ്രദ്ധ (കാതോർക്കുക)	നിസ്വാരം (നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല)
---------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------

രൂപ്/-
നോഡൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ കൂഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി