



**കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും**  
(പ്രാബല്യം: 2020 ഡിസംബർ 02 മുതൽ ഡിസംബർ 06 വരെ)



## കോഴിക്കോട് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിലിക്കോട്-ഉം  
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുന്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൽ നന്ദി: പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. 95/2020

തീയതി: 27/11/2020

### എ. പിന്നിട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർദ്ദത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
1.2	30.6 – 34.4	23.8 – 24.9	63– 96	00-12

### ബി. വരുന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	05.12.2020	06.12.2020	07.12.2020	08.12.2020	09.12.2020
മഴ, മി.മീ	10	10	10	10	12
കുടിയ താപനില, °C	30	30	30	30	30
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	24	24	24	24	24
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർദ്ദത, %	88	88	88	88	88
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർദ്ദത, %	63	63	63	63	63
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	4	6	2	10	6
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	290	250	340	290	250
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	8	8

### സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അട്ടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ		<b>ശക്തിയായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്</b> വാഴ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവക്ക് ശക്തിയുള്ള താങ്ങുകൾ നൽകുക രബ്ബർ, കൈപ്പ, അടക്ക എന്നിവ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മഴനന്താത്തിടങ്കേക്കു മാറ്റി വെക്കുക	
തെങ്ങ്	വിവിധ അട്ടം	കടചീയൽ 	ഹൈക്സാകോൺസോൾ 25 മില്ലി/25 ലിറ്റർ വൈളളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരാഴ്വയ്ക്ക് ശേഷം കുമ്മായം 2 കിലോ രൈ തെങ്ങിന് എന്ന തോതിൽ നൽകുക. വീണ്ടും മുന്നാഴ്വയ്ക്ക് ശേഷം, പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പൊട്ടാം 1 കിലോ രൈ തെങ്ങിന് എന്ന തോതിൽ അധികമായി നൽകുക.

കാവേജ്	വിവിധ ഘട്ടം	ബുംഗ് റോട്ട് 	സർട്ടപ്പറ്റോ സെസ്റ്റിൻ(300ppm) ചെടികളിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക. കായ്ച്ചു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം എല്ലാ ആളുകളിലും 2% വീരമുള്ള സുഡോമോണാസ് ലായനി തളിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് രോഗ ബാധയെ ചെറുക്കേണ്ട സഹായിക്കും.
പച്ചമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	ബാക്കറ്റിന്റെ വിൽപ്പ് 	കൃഷിയിടം വ്യത്തിയായി സുകൾക്കുക. സർട്ടപ്പറ്റോസെസ്റ്റിൻ ശുഭ്രിക രൈറ്റ്സ് 2ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് തളിച്ച് കൊടുക്കുക.
പയർ	വളർച്ചാ ഘട്ടം	ഇലവാട്ടം 	കോൺടാഫ് (2മില്ലി രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ) തളിക്കുക.
വെള്ളരിവർഗ്ഗ വിളകൾ	വിവിധ ഘട്ടം	മുദ്രുരോമ പുഷ്ട രോഗം 	മാക്കോസെബ് 3 ശാം രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ആളു തോറും തളിച്ച് കൊടുക്കുക.രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ അക്കോമിൻ 3 മില്ലി രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ 15 ദിവസ ഇടവേളകളിൽ മുന്നു തവണ തളിക്കുക.രോഗബാധിത ഇലകൾ പരിചെടുത്തു തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പെറോഫ്റ്റാസ്ട്രോബിൻ 5 മില്ലി രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നതോതിൽ തളിക്കുക.
മത്തൻ	കായ്ക വളർച്ചാ ഘട്ടം	മത്തൻ വണ്ട് 	മാലതിയോൻ 50 ECകീടനാശിനി മുന്നു മില്ലി രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിലേം അല്ലെങ്കിൽ മാലതിയോൻ 50 EC രണ്ടു മില്ലി നാല് മില്ലി വേപ്പണ്ണയോടാഷം രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിലേം തയ്യാറാക്കിയ കീടനാശിനി തളിക്കുക. മാലതിയോൻ 50 ECകീടനാശിനി മുന്നു മില്ലി രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തയ്യാറാക്കിയ ലായനി മഴുത്തിൽ കുതിർക്കുകയും ചെയ്യുക. കീടനാശിനി മഴുത്തിൽ കുതിർക്കുന്നതിനു മുൻപേ വിളകൾക്ക് ജലസേചനം നൽകുക. തളിച്ചതിനു ശേഷം രണ്ടു ദിവസതേക്ക് ജലസേചനം ചെയ്യാക്കുക.

എ/

നോയൽ ഓഫീസർ

ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി