

आजादी  
का  
अमृत महोत्सव



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

കോഴിക്കോട് ജില്ല

(പ്രാബല്യം: 06.07.2022 മുതൽ 10.07.2022 വരെ)



**കാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും**  
**(പ്രാബല്യം: : 06.07.2022 മുതൽ 10.07.2022 വരെ)**



**കോഴിക്കോട് ജില്ല**

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം  
 പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്യം വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിന് നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. 53/2022

തീയതി: 05/06/2022

**എ. പിനിട് അഞ്ച് ഭിവസത്തെ കാലാവസ്യം**

മഴ, മി.മീ	കൂടിയ താപനില, °C	കുറവെന്ന താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
225.8	27.0 – 30.6	22.1 – 24.4	90 - 100	00 - 06

**ബി. വരുന അഞ്ച് ഭിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പ്**

സൂചിക	06-07-2022	07-07-2022	08-07-2022	09-07-2022	10-07-2022
മഴ, മി.മീ	30	28	28	12	10
കൂടിയ താപനില, °C	28	30	30	30	30
കുറവെന്ന താപനില, °C	24	24	24	25	25
കൂടിയ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	95	95	95	95	95
കുറവെന്ന ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	90	90	90	90	90
കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	4	4	4	4	4
കാറിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	270	270	270	270	270
മേല വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	8	8

**സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ**

വിള	അടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
<b>രൂപൊഴിവിന്റെ കനത്തമഴ**</b>			
<p>കനത്തമഴ (ഇരുപത്തിനാലു മൺകുറിൽ 115.5 മീറ്റർ വരെ) പ്രവചനമനുസരിച്ച് അടുത്തയാഴ്യും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്          ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഭത അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം പുർണ്ണമായും          മേഘാവൃതമായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ഉഷ്ണാവ് സ്ഥാധാരണയിൽ കുറവായിരിക്കും</p>			

<p><b>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</b></p>	<p>കഴിഞ്ഞ അനുവു ദിവസങ്ങളിൽ ജീലൂയിൽ അതി ശക്തമായ മഴ അനുഭവപ്പെട്ടു. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നീർവാർച്ച ഉറപ്പാക്കുക. വളം ചേർക്കുന്നത് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക. ജലനിർഗമനചാലുകൾ തുറന്നിട്ടുക.</p> <p>മല്ലിട്ടിപ്പലിന് സാധ്യതയുള്ള കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗത പുലർത്തുക. ദുരന്ത നീവാരണ സംഘങ്ങളുടെ നീർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് സമയാസ്ഥാനം കാതോർക്കുകയും കൃത്യമായ് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക .</p> <p>കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഉയർന്ന താപനിലയും ഉയർന്ന അന്തർക്കാലിക ചീപ്പൽ, വാട്ടം എന്നീ രോഗങ്ങൾ പടരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത വിളകൾക്ക് താഴെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബിക്കുക.</p> <p>വിണകുടക്കുന്ന തേങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പുർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം. തോട്ടങ്ങളിൽ നല്ല നീർ വാർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുക.</p> <p>മുട്ടു കാണ്യ വിളകളായ വാഴ, പച്ചകരികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> <p>വളം, വിത്ത്, കാലിത്തിറകൾ എന്നിവ ഇന്റപം തട്ടാത്തതും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുറികളിൽ ഉയർത്തിക്കൊട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുക്ഷിക്കുക.</p>		
<p><b>നെല്ല്</b></p>	<p>വിവിധ ഘട്ടം</p>	<p>കരച്ചിൽ/ചീച്ചിൽ രോഗം</p>	<p>മുൻകരുതലായി ശൈലിക്സ് പാഡർ (എക്രീന് 2 കിലോ) സുപ്പീരണങ്ങളുള്ള കിഴികളിലാക്കി വെള്ളം കണ്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക</p>
<p><b>നെല്ല്</b></p>	<p>പരിച്ചു നടയിടങ്ങൾ</p>	<p>തണ്ടുതുരപ്പൻ</p> 	<p>ടൈക്കോഗ്രാഫ് മുട്ട കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എക്രീന് രണ്ട് രേഖ. കാർഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്</p> <p>ആക്കമണം ഉണ്ടക്കിൽ ഷോറാൻട്ടാനിലിപ്പോൾ 18.5% W/W SC 3മിലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിത്തെളിക്കുക.</p>
<p><b>നെല്ല്</b></p>	<p>പരിച്ചു നടയിടങ്ങൾ</p>	<p>ഓല ചുരുട്ടി പുഴു</p> 	<p>ഓല ചുരുട്ടി പുഴു ആക്കമണം ഉണ്ടക്കിൽ മുള്ളുള്ള കമ്പു വലിച്ചു ഓപചുരുളുകൾ തുറക്കുക.</p> <p>ആക്കമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഐലുബാൻ ശൈ അരമെഡ്യ് 1 മിലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിച്ച് കൊടുക്കുക.</p>

തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കുമ്പു ചീയൽ	<p>കുമ്പുചീയൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിമാറി നശിപ്പിക്കുകയും മുൻവിൽ ബോധേയാ കുഴനു പുരട്ടുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമു വരുന്നത് വരെ കുമ്പിനെ രൂപാന്ത്രിക് കടലാസുപയോഗിച്ചു പൊതിഞ്ഞു മഴ വെള്ളം ഇരഞ്ഞാതെ സംരക്ഷിക്കുക.</p> <p><b>സമീപത്തുള്ള</b> തെങ്ങുകളുടെ കുരുത്തേതാലക്കും ചുറ്റുമുള്ള ലൈക്കെല്ലുകളിലും രൂപ ശത്രമാനം വീര്യമുള്ള ബോധേയാ മിശ്രിതം തളിക്കുക.</p> <p>ഒരുംബല മേഖലകളിൽ, തെങ്ങുകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്താൻ സുക്ഷ്മ മുലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര പ്രോഷ്ടക മുലക പരിപാലനം ഉണ്ടായിരിക്കും.</p>
കുരുമുളക്	നടീൽ സമയം	വാട രോഗം	<p>മുൻകരുതല്പായി ദൈനക്കോഡർമ സന്ധുഷ്ടമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വീതം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണമായി ചേർത്തിളക്കു..</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രിഡോമിൽ രണ്ടു ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി ഇലകളിലും തളിക്കുക</p>
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	ഇലപ്പുള്ളി രോഗം	<p>തടത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. മുൻകരുതല്പായി സൃഷ്ടേയാമോൺസ് ലായനി (20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയത്) രണ്ടാഴ്ചയിടവേളകളിൽ തളിക്കുക</p> <p>രോഗം ബാധിച്ചാൽ:- രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. കാർബൻഡാസിം അല്ലെങ്കിൽ മാങ്കാസബ് ഇവ രണ്ടാഴ്ച ഇടവേളയിൽ മാറി മാറി 2 മില്ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക</p>
ഇഞ്ചി	വിവിധ ഘട്ടം	ബാക്കുരീയൽ വാടം	<p>രോഗബാധയില്ലാത്തിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിത്തിഞ്ചി മാത്രം നടാൻ ഉപയോഗിക്കുക. നടുന്നതിനു മുൻപ് വിത്തിഞ്ചി സ്റ്റെപ്പ്‌റ്റോസെസ്റ്റിൻ 200 മില്ലി ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലകി തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയിൽ മുക്കുതു സെക്കന്റ് നേരം മുക്കുക.</p> <p>കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഒരു സെന്റീന് മുന്നുകിലേം വീതം കുമ്മാധി മണ്ണിൽ ചേർത്തിളക്കുക. ദൈനക്കോഡർമ, സൃഷ്ടേയാമോൺസ് എന്നീ ജീവാന്വകൾ ഉപയോഗിക്കുക.</p> <p>രോഗം ബാധിച്ച ചെടികൾ മുൻചു വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ മുൻവിൽ നിന്നും നേർത്ത വെള്ളത്ത് ബാക്കുരീയൽ ലായനി നൂലുപോലെ പുറത്തു വരുന്നത് കാണാം. അവ പിയൂത്തമാറ്റി ഒരുശത്രമാനം വീര്യമുള്ള ബോധേയാമിശ്രിതം കൊണ്ട് തടം കുതിർക്കുക.</p>

കശുമാവ്	വിവിധ ഘട്ടം	പുപ്പൽ രോഗങ്ങൾ	മുൻകരുതലായി രു ശതമാനം വീരയുള്ള ബോർഡേയാ മിശ്രിതത്തിൽ പശ ചേർത്ത് ചേർത്ത് തളിക്കുക.  രോഗ പക്ഷണം കാണുകയാണെങ്കിൽ രോഗം ബാധിച്ച കമ്പുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി മുറിച്ച ഭാഗത്തുനിന്ന് 15 സെ, മീ വരെ നീളത്തിൽ പശ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ബോർഡേയാ കുഴന് പുരട്ടുക.
കവുങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	തല ചീയൽ/ മഹാജ്ഞി 	1% ബോർഡേയാ മിശ്രിതമോ 0.03% കോഷർ ഓസ്റ്റി ഫ്ലാറേറിഡേയാ തളിക്കുക. കുടാതെ 0.5% ബോറോക്സൂം തളിക്കുക  ഓരോ കവുങ്ങിൽ തടത്തിലും 1 കിഗ്രാം വീതം കുമ്മായം ചേർക്കുക.  രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കവുങ്ങങ്ങാനിന് തടത്തിൽ 100ഗ്രാം ബോറാസ്, 250ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സുർഖോദ്ധർ, എന്നിവ ചേർത്ത് മണ്ണുമായി യോജിപ്പിക്കുക.

\*\*മഴ അപായ വർഷ സൃഷ്ടി (ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്)

താക്കിത് (ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	ശ്രദ്ധ (കാതോർക്കുക)	നിസ്താരം (നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല)
----------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------------------

ഒപ്പ്/-  
സോഡിയം ഓഫീസർ  
ഗ്രാമിന കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി