



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: : 08.10.2022 മുതൽ 12.10.2022 വരെ)



കോഴിക്കോട് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുറത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. 80/2022

തീയതി: 07/10/2022

എ. പിനിട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർദ്ദത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
2.7	29.7 – 32.4	24.1 – 25.0	83 - 95	00 - 00

ബി. വരുന്ന അഞ്ചേ ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	08-10-2022	09-10-2022	10-10-2022	11-10-2022	12-10-2022
മഴ, മി.മീ	2	4	15	1	0.5
കുടിയ താപനില, °C	30	33	33	33	33
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	24	25	25	25	25
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർദ്ദത, %	95	95	95	95	95
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർദ്ദത, %	85	85	85	85	85
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	4	3	4	4	3
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	270	270	340	290	210
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	5	8	8	6	3

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അട്ടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നേരിയ മഴ **			
<p>നേരിയ മഴ ലഭിക്കും.</p> <p>ആകാശം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കും. പകൽസമയങ്ങളിൽ കുടിയ ഉള്ളാവും രാത്രീകളിൽ കുറഞ്ഞ താപ നിലിയും അനുഭവപ്പെടും. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദതയും അനുഭവപ്പെടും</p> <p>വിസ്തൃത മഴ പ്രവചനം: അടുത്തയാഴയിൽ ശരാശരിമഴയുണ്ടാകും.</p>			

<u>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</u>	<p>തെങ്ങ്, ഇഞ്ചി, വാഴ എന്നീ വിളകൾക്ക് പീച്ചൽ, വാട്ടം എന്നീ രോഗങ്ങൾ പടരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത വിളകൾക്ക് താഴെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലോം നികുതിക്കുക.</p> <p>വീണുകിടക്കുന്ന തേങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പുർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുൻചുമാറി തീയിക്കു നശിപ്പിക്കണം.</p> <p>ഇടിയും മിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്</p> <p>വാഴ പോലുള്ള മുട്ടുകാണ്ഡവും എളുപ്പത്തിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതുമായ വിളകൾക്ക് താങ്ങുകൾ നൽകി സംരക്ഷിക്കും</p> <p>വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണ്ണി, മഞ്ഞൾ, കൊപ്പ, വള്ളം എന്നിവ സുരക്ഷിതമാക്കി സുക്ഷിക്കുക</p>		
രണ്ടാം വിള (മുണ്ടക്കൻ)പാ ം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയം	<p>മണ്ണിൽ ഇരുന്നിരിപ്പു അംശം കുടുതലായതുകൊണ്ട് മണ്ണിലെ പുളിരസം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും നെല്ലിരിപ്പു വളർച്ച മുട്ടുകൾക്കും കാരണമാകുന്നു. മണ്ണ് പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ആവശ്യമായ അളവിൽ കുമ്മായം/ഡോംമേയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മണ്ണ് പരിശോധന സാധ്യമായില്ല എങ്കിൽ പരിച്ചു നടുന്നതിനു രണ്ടാം മുൻപേ പാടത്തു രണ്ടു തവണ എക്കിലും വെള്ളം കയറി നന്നായി വാർത്തു കയയുക. അതിനു ശേഷം കുമ്മായം/ഡോംമേയർ സെസ്റ്റിന് 2കിലോ ശ്രാം എന്ന തോതിൽ മുള്ളുമായി നന്നായി ചേർത്തിളക്കണം. പരിച്ചു നടത്തിന് ശേഷം 30-40 ദിവസം കഴിയുന്നോൾ വീണും മേൽപ്പറഞ്ഞ അളവിൽ പാടത്തു വിതറി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പൊട്ടാഷ് വള്ളപ്രയോഗം കുമ്മായം ചേർത്ത് രണ്ടാം കഴിത്തത്തിനു ശേഷമേ പാടുള്ളൂ. നിലമൊരുക്കുന്ന സമയത്തു ചാണകം /കണ്ണാറ്റു, പച്ചില വള്ളം എന്നിവ സെസ്റ്റിന് 20കിലോ ശ്രാം എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് ഉള്ളതു മറിക്കണം.</p>		
ശീത കാല പച്ചകരികൾ	<p>നിലം നന്നായി ഉള്ളതെന്നുകൂടു. മണ്ണ് പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ആവശ്യമായ അളവിൽ കുമ്മായം/ഡോംമേയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ മണ്ണിലെ അള്ളത്രും ലഘുകരിക്കുന്നതിനു പുറത്തെ മണ്ണ് ജന്ന രോഗങ്ങളെയും കീടങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകും.</p>		
തെങ്ങ്	വിവിധ എഡ്സ്	കുമ്പു ചീയൽ	<p>ഉണ്ടായാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിമാറി നശിപ്പിക്കുകയും മുറിവിൽ വോഡോ കുഴന്നു പുരട്ടുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമ്പു വരുന്നത് വരെ കുമ്പിനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാസുപയോഗിച്ചു പൊതിഞ്ഞു മഴ വെള്ളം ഇരഞ്ഞാതെ സംരക്ഷിക്കുക.</p> <p>സമീപത്തുള്ള തെങ്ങുകളുടെ കുരുതെതാപക്കും ചുറ്റുമുള്ള ലൈക്കിളിലും ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള വോഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുക.</p> <p>ദുർബല മേഖലകളിൽ, തെങ്ങുകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്താൻ സുക്ഷ്മ മുലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര പോഷക മുലക പരിപാലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.</p>

തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	ഇല, തേങ്ങ പീയൽ 	ഉണങ്ങിയ കുപകൾ നീക്കം ചെയ്യുക. ഇവയും ഇതോടൊപ്പം പീച്ചൽ ബാധിച്ചു വിഴുന്ന നാളികേരവും പുർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുക. പാകമായ തേങ്ങകൾ പറിച്ചടക്കുക. ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോധോ മിശ്രിതം തളിക്കുക. അഛ്ലൈകിൽ കോപൾ ഓല്ലിക്കോരേഡ് 3 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നാ തോതിൽ കലർത്തി തയ്യാറാക്കി ഇലകളിലും കുപകളിലും തളിക്കുക തളിക്കുക. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ബോറാക്ക് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 3 ഗ്രാം എന്നാ തോതിൽ കലർത്തി ഇലകളിലും കുപകളിലും തളിക്കുക
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	ചെന്നിരോഹിപ്പ് 	രോഗം വന്ന ഭാഗം ചെത്തി വ്യതിയാക്കി ബോർഡോ കുഴന്പ് പുരുട്ടി കൊടുക്കുക. 1 % വീരുമുള്ള ബോർഡോ ബോർഡോ മിശ്രിതം (40 ലിറ്റർ വീതം) 2 ലിറ്റർ ചുറ്റുളവിൽ തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അഛ്ലൈകിൽ ഹൈക്കോണാസോൾ/കോൺടാപ്പ് 25 മിലി 25 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി 4 മാസ ഇടവേളകളിൽ മണിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം 5 കി ഗ്രാം റൈറ്റേറേയർ സസ്യാഷ്മാകൾ വേപ്പിൻ പിള്ളാകൾ 500 ഗ്രാം വീതം സുക്കൾ മുലക മിശ്രിതം, എന്നിവ തടത്തിൽ വിതരി മണ്ണുമായി ഇളക്കി ചേർക്കുക.
മാവ്	നഷ്ടസ്ഥി	തണ്ടുതുരപ്പൻ 	രോഗർ (ദൈമെത്രേതായെറ്റ്) ഒരു ലിറ്ററിന് 3 മിലി എന്ന തോതിലും മാങ്കാസബ് ലിറ്ററിന് 2 ഗ്രാം എന്ന തോതിലും ഒരുമിച്ച് തളിക്കുക
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	തടതുരപ്പൻ വണ്ട് 	കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കുക. അസുഖം ബാധിച്ചു ചെടികൾ തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. വണ്ടിന്റെ ആക്കമണ്ണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഭാരങ്ങളിൽ ഫിപ്രോനിൽ 0.015% (ഒരു ലിറ്ററിന് 3 മിലി എന്ന തോതിൽ) ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ബ്യൂവേറിയ ബസിയാന എന്ന മിത്ര കുമിൾ 5 , 6 , 7 മാസങ്ങളിൽ ഒരു ലിറ്ററിന് 20 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക

വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	പനാമ വാട്ടം	<p>ചുവൻ വാഴകളെയാണ് കുടുതലായി ബാധിക്കുക. രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ:</p> <p>നടുന്നതിനു മുൻപേ വാഴക്കനുകൾ കാർബേബണഡാസിം (2 ശ്രാം രൈഡിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) ലായനിയിൽ ഇരുപതു മിനിറ്റു നേരം മുകിവെക്കുക.</p> <p>വാഴതടത്തിൽ പ്രസ്തുതാമോണാസ് (20 ശ്രാം രൈ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ) ലായനി കുതിർക്കുക</p> <p>രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ:</p> <p>രോഗം ബാധിച്ച വാഴകൾ പിഴുതു കളഞ്ഞു കുഴികളിൽ രൈ കിലോഗ്രാം വീതം കുമ്മായം വിതരുക. പിഴുത വാഴകൾ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇടരുത്.</p> <p>ചുറ്റുമുള്ള വാഴകളുടെ തടത്തിൽ കാർബേബണഡാസിം (2 ശ്രാം രൈഡിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ) ലായനി കുതിർക്കുക. പ്രൊപിക്കൺഓസോൾ (രൈ മില്ലി രൈ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ) ഇലകളിൽ തളിക്കുക</p>
ഹണ്ണി,	വിവിധ ഘട്ടം	ഹല വാട്ടം	കാർബേബണഡാസിം (2 ശ്രാം രൈഡിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിക്കുക.
കശുമാവ്	പുഷ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം	തേയിലക്കാതുക്	കിനാൽഫോസ് 2 മില്ലി രൈ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തളിക്കുക.

**മഴ അപായ വർഷാ സുചന (രുരുന്ത നിവാരണത്തിനായ്)

താക്കിത് (ഇടൻ നടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗര (തയ്യാറാവുക)	ശ്രദ്ധ (കാതോർക്കുക)	നിസ്താരം (നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല)
----------------------------------	----------------------	------------------------	----------------------------------

ഒപ്പ്/-
നോയൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി