



കാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: : 09.10.2024 മുതൽ 13.10.2024 വരെ)



കോഴിക്കോട്‌ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക റവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്യം വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിന്റെ പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. - 81/2024

തീയതി: 08/10/2024

എ.പിനിട അഞ്ച് ഭിവസതെത കാലാവസ്യം

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഡത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
101.3	32.4–34.5	24.0–26.2	69–92	00–06

ബി.വരുനാഞ്ചിവസങ്ങളിലേക്കുള്ളകാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പ്


സൂചിക	09-10-2024	10-10-2024	11-10-2024	12-10-2024	13-10-2024
മഴ, മി.മീ	8	5	3	3	10
കുടിയതാപനില, °C	32	32	32	32	32
കുറഞ്ഞതാപനില, °C	24	24	24	24	24
കുടിയആപേക്ഷികആർഡത, %	90	90	90	90	90
കുറഞ്ഞആപേക്ഷികആർഡത, %	78	78	78	78	78
കാറിന്റെവേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	7	7	6	6	5
കാറിന്റെഡിഗ്രി, ഡിഗ്രി	180	180	230	230	230
മേഘവിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	5	4	6	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫട്ടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷികനിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ			റൂപേട്ട ശക്തിയായ മഴ **
ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഡത അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം പുർണ്ണമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കും. പകൽസമയങ്ങളിൽ കുടിയ ഉള്ളാവും രാത്രികളിൽ കുറഞ്ഞ താപ നിലിയും അനുഭവപ്പെടും.			കെടോബർ 08,09,11,12ന് റൂപേട്ട ശക്തിയായ മഴ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമുതൽ 115.5 മില്ലി വരെ). കെടോബർ 10ന് ശക്തികുറഞ്ഞ മഴ (ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 15.6 മില്ലിമുതൽ 64.4 മില്ലി വരെ).

<p><u>പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ</u></p>	<p>കഴിയെന്ന റിവസണാളിൽ ഉണ്ടായ രൈതമായ മഴയിൽ അമീതമായി വെള്ളരക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങാളിൽ നീർ വാർച്ച അനുവദിക്കുക</p> <p>വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മത്തൻ, കോപ്പ ഉല്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെയില്ലത്തിട്ടുണ്ടുക.</p> <p>മുട്ടു കാണ്യ വിളകളായ വാഴ, പച്ചക്കറികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> <p>വളം, വിത്ത്, കാലിത്തിറകൾ എന്നിവ ഇന്റപ്പം തട്ടാത്തതും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുൻകളിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുക്ഷിക്കുക.</p> <p>വിണുകിടക്കുന്ന തേങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുറിച്ചുമാറ്റി തിയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം.</p> <p>അവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മഴയില്ലാത്ത ഇടവേളകൾ ലഭിക്കുന്നോൾ മാത്രം പശ ചേർത്തു കീടനാശിനി തളിക്കുക.</p>	
<p>നെല്ല്</p>	<p>രണ്ടാം വിള പരിച്ചു നടുന്ന ഏട്ട്</p>	<p>തൊറ് പരിച്ചു നടുന്നതിനു തൊട്ടു മുന്നേ വേര് പ്രസ്തുതോമോണാസ് ലായനി(20ഗ്രാം പ്രസ്തുതോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ(താര മൺക്കുർ മുക്കി വെക്കുക. ഇത് നെല്ല് കരുതേതാടെ വളരുന്നതിന് സഹായകമാകും).</p> <p>മഴയില്ലാത്ത നേരത്തു വെള്ളം താഴ്ത്തി, പാടവരമിലെ ജല നിർഗമന നാളികൾ അടച്ചതിനു ശേഷം, വളം ചെയ്യുക.</p> <p>പരിച്ചുനടുന്ന സമയത്ത് മധ്യകാല മുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് സെസ്റ്റിന് 400 ഗ്രാം യൂറിയ, 900 ഗ്രാം മസുറിഫോണ്, 150 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്-ഉം ഹസുകാലമുപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് സെസ്റ്റിന് 400 ഗ്രാം യൂറിയ, 700 ഗ്രാം മസുറിഫോണ്, 120 ഗ്രാം പൊട്ടാഷ്-ഉം ചേർത്തു കൊടുക്കണം.</p>
<p>നെല്ല്</p>		<p>നെല്ലോല മണ്ണാരി</p>  <p>അന്തരീക്ഷ ഉള്ളശ്ശാവ് 25c ന് അടുത്തുമുള്ള ആപേക്ഷിത ആർട്ടത് 80% തുണ്ടു മേലെ ഉയർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വേളകളിലാണ് ആക്കമണം രൂക്ഷമാവുന്നത്. ആക്കമണം കുലവാട്ടം പോലെയുള്ള കുമിൾ രോഗങ്ങൾക്കും ഹോതുവായി തീർന്നേക്കാം.</p> <p>നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ:</p> <ol style="list-style-type: none"> അസാധികാർന്ന് (5 മിലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിക്കുക. <p style="text-align: right;">അരല്പക്കിൽ</p> <ol style="list-style-type: none"> വെറ്റബിൾ സർപ്പൾ (4 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിക്കുക.
<p>ശീത കാല പച്ചക്കറികൾ</p>		<p>നിലം നന്നായി ഉഴുതെടുക്കുക. മണ്ണ് പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ആവശ്യമായ അളവിൽ കുമ്മായം/ഡോംഗാളമേയ്ക്ക് ചേർത്തു കൊടുക്കണം. ഇത് മണ്ണിലെ അളവും ലാമ്പുകരിക്കുന്നതിനു പുറത്ത് മണ്ണ് ജന്ന രോഗങ്ങളെയും കീടങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകും.</p>

തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കുമ്പു ചിയൽ	<p>കുമ്പുചീയൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചെതിക്കാറീ നശിപ്പിക്കുകയും മുൻവിൽ ബോഡോ കുഴുവും പുരുട്ടുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമ്പും വരുന്നത് വരെ കുമ്പിനെ ഒരു ഷാസ്ത്രിക് കാലാസുപദയോഗിച്ചു പൊതിഞ്ഞു മഴ വെള്ളം ഇരഞ്ഞാതെ സംരക്ഷിക്കുക.</p> <p>സമീപത്തുള്ള തെങ്ങുകളുടെ കുരുതെതാലുക്കും ചുറ്റുമുള്ള ലൈക്കവിളുകളിലും ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുക.</p> <p>ദുർബല മേഖലകളിൽ, തെങ്ങുകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്താൻ സുക്ഷ്മ മുലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര പോഷക മുലക പരിപാലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.</p>
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	മണ്ണതളിപ്പ്	<p>ഓരോ തെങ്ങിൽ തടത്തിലും 2കിഗ്രാം വീതം കുമ്മായം ചേർക്കുക.</p> <p>രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു തെങ്ങെങ്ങാനിന് തടത്തിൽ 200ഗ്രാം ബോറാക്ക്, 500ഗ്രാം മഗീഷ്യോ സർഫോർ, 100ഗ്രാം സിക്ക് സർഫോർ എന്നിവ ചേർത്ത് മണ്ണമായി യോജിപ്പിക്കുക. കുടാതെ തെങ്ങെങ്ങാനിന് രണ്ടു കിലോ വീതം പൊട്ടാഷും ചേർക്കുക.</p>
കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	പീച്ചൽ രോഗം	<p>മുൻകരുതപായി ദൈക്കോഡെൽ സമ്പൂഷ്മാക്കിയ വേപ്പിൻ പിള്ളാക്കച്ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വീതം തടത്തിൽ വിതരി മണ്ണമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രംഭേ ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണ് കുതിർക്കുക.</p> <p>ഇലകളിൽ പീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതെ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.</p>
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം (നേന്ത്രൻ വാഴ)	പിട്ടിങ്ങ് രോഗം	<p>പ്രായപുർത്തിയാകാത്ത കുലകളിൽ മാത്രം മാങ്കാസെബ് (@2 ശ്രാം/ലിറ്റർ) തളിക്കുക. .</p> <p>കുലകളിൽ ചെറിയ സുഷിരങ്ങളുള്ള പോളി എമിലിൻ പ്രീറ്റുകൾ കൊണ്ട് മുടുക. പക്ഷികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് കുലകളെ സംരക്ഷിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.</p>
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം (നേന്ത്രൻ വാഴ)	ഇലത്തിനി പുഴു	<p>രജേവ കീടനാശിനികളായ ശ്രേയ, നമ തുടങ്ങിയവ 10 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇലകളുടെ രണ്ടുവശത്തുമായി തളിക്കണം.</p> <p>ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽമാത്രം:</p> <p>കിറാൽഫോസ് 20 ഇസി (2-4 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിക്കുക.</p> <p>അലൈക്രിസ്റ്റൽ ഐഡുവൈൻഡിയമെല്ല് 39.35 SC (2 മില്ലി, 10 ലിറ്റർ വെള്ളം) തളിക്കുക.</p>

ക്രൂമാവ്	കാള്യുന്നതിനു മുൻപുള്ള ഘട്ടം	തേയിലപോതുക്ക് 	രു ശത്രുവാനം വീര്യമുള്ള ബോർഡേയാ വിഗ്രീതത്തിൽ രു ലിറ്ററിൽ 2 മില്ലി വിത്തം കിനാൽഫോസ് ചേർത്ത് തളിക്കുക.
ഹണി,	വിവിധ ഘട്ടം	ഹലവാട്ടം	കാർബെണ്ടോസിം (2 ഗ്രാം രൈപ്പിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിക്കുക.
കോഴി	വിവിധ ഘട്ടം	നൃകാസിൽ രോഗം 	നൃകാസിൽ രോഗം അല്ലങ്കിൽ റാസിവേത് രോഗം രു പാരാ-മൈക്രോബിഉല്ഫാ വൈറസ് മുലമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷികളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. ഈ അണ്ണുബാധയയുടെ ഫലമായി ശ്വാസംമട്ടലും ചുമയും, ചിരകുകൾ തുണിക്കിടക്കുന്നതും, കാലുകൾ വലിച്ചുനടക്കുന്നതും, തലയും കഴുതും വളരുന്നതും, വട്ടത്തിൽ നടക്കുക, വിശ്രഷ്ടില്ലായ്ക്കുക, പുർണ്ണമായ തളർവാതം. പ്രതിരോധം: പക്ഷികൾക്കും കോഴിക്കുടുകൾക്കും പുർണ്ണമായ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുക. ഇൻടാനാസലിയോ ഇൻടാക്യൂലർ ആയോ കുടിവെള്ളത്തിൽ നൽകുന്ന ലൈവ് ബി1, ലാ സോട്ട് എന്നിവയുടെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ നൽകുക.

പ്രസ്താവന	വിവരിക്കുന്നത്	പ്രസ്താവന, വായ് രോഗം	<p>അഫ്റ്റേറേവെറ്റൻ അണുബാധ മുലമുണ്ടാകുന്ന വളരെയെരെ പകരുന്ന രോഗമാണ് കാൽ, വായ് രോഗം.</p> <p>അണുബാധയുടെ ഫലമായി വായിലും ചുറ്റുപാടും കാലുകളിലും വെസിക്കുലാർ നിവേദം ഉണ്ടാകുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ഒരു മുഗം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ നീങ്ങാനോ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു.</p> <p>പ്രതിരോധം: വ്യക്തിഗത മുഗങ്ങൾക്കും അവയുടെ പാർപ്പിടത്തിനും ചുറ്റുപാടുകൾക്കും ശുചിത്വ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക. ഹൈത്തൽ ദോണിക്കുകൾ അടങ്ങിയ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുകളും അടങ്ങിയ തീറ്റകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കനുകാലികളുടെ പ്രതിരോധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. രോഗം വന്നാൽ ഉടൻ വെറ്റിനറി ഡ്യോക്രോടുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മരുന്ന് നൽകുക.</p>
-----------	----------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ഒപ്പ്/-
 നോയൽ ഓഫീസർ
 ഗ്രാമിണകൃഷികാലാവന്ധനേവപദ്ധതി

**മഴ അപായ വർഷ സൃഷ്ടി (ദുരന്തനിവാരണത്തിനായ്)

താഴീവ് (ഉടൻനടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	മേഖല (കാതോർക്കുക)	നിസ്താരം (നടപടികൾആവശ്യമില്ല)
-------------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------------

