



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: : 08.11.2022 മുതൽ 12.11.2022 വരെ)



കോഴിക്കോട് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുറത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. 89/2022

തീയതി: 08/11/2022

എ. പിനിട അഞ്ച് ഭിവസതൈ കാലാവസ്ഥാ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർബത, %	കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
24.2	33.6 – 34.7	24.2 – 25.7	79.8 – 92.1	0.0 – 00.0

ബി. വരുന്ന നാല് ഭിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	08-11-2022	09-11-2022	10-11-2022	11-11-2022	12-11-2022
മഴ, മി.മീ	10	1	9	8	1
കുടിയ താപനില, °C	34	34	34	35	35
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	25	25	25	25	25
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർബത, %	93	93	93	93	93
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർബത, %	80	80	80	80	80
കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	2	2	2	2	2
കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	250	270	270	270	210
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	6	8	8	4

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അട്ടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
ശക്തികുറഞ്ഞ മഴ ലഭിക്കും **			
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറിൽ 15.5മീലി വരെ മാത്രം തീവ്രതയുള്ള രൂപേണ്ട ശക്തികുറഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടിയ്ക്കും വിനാലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത രണ്ടാഴ്കളിലും ശരാശരി (ആഴ്യിൽ 73 മീലി മീറ്റർ) മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതി ദിന കുടിയ ഉഷ്ണാവ്, കുറഞ്ഞ ഉഷ്ണാവ് എന്നിവ ശരാശരിയിൽ താഴെ ആയിരിക്കും. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർബത അനുഭവപ്പെടും. മഴയില്ലാത്ത ഇടവേളകളിൽ അധികരിച്ച ഉഷ്ണവും മഴ സമയത് ശരാശരിയിൽ താഴ്ന്ന ഉഷ്ണാവും അനുഭവപ്പെടും		

<p>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</p>	<p>പുതുതായി നട തെക്കെലെ വാഴയില, തെങ്ങോല എന്നിവ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു തെക്കൻ വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക.</p> <p>നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ ശൈത്യകാല പച്ചകൾി. കാലാതീത പച്ചകൾി എന്നിവയുടെ ക്ഷേമിക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.</p> <p>വീണുകിടക്കുന്ന തെങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പുർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിച്ച മരങ്ങൾ പുർണ്ണമായും മുറിച്ചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം.</p> <p>വാഴ പോലുള്ള മുട്ടകാണ്ഡവും എളുപ്പത്തിൽ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതുമായ വിളകൾക്ക് താങ്ങുകൾ നൽകി സംരക്ഷിക്കും</p> <p>വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മത്തൻ, കൊപ്പ, വള്ളം എന്നിവ സുരക്ഷിതമാക്കി സുരക്ഷിക്കുക</p>		
<p>പച്ചകൾകൾ</p>	<p>തെക്കൾ</p>	<p>കാബേജ്, കോളിപ്പിവർ ആദിയായ ശീതകാല പച്ചകൾകൾ നടാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്.</p> <p>നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം നല്ല നീർവാർച്ച നല്ലാൻ കഴിയണം. വിത്തുകള് / തെക്കൾ ഉയർത്തിയ വരവുകളിലോ കുനകളിലോ നടുക്.</p> <p>മണ്ണിൽ, സെന്റ് നെന്നിന് നാല് കിലോ വിത്തം കുമ്മായം വിതരുക. കുടാതെ ടെട്ടേക്കാഡെർമ സന്പുഷ്ടമാക്കിയ ചാണകമോ കനേബാസ്സോ ഉപയോഗിക്കുക. ഈവ വാട്ട് രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.</p> <p>പരിച്ച നടുന്നതിനു താഴു മുന്നേ വേൾ പ്രസ്തുതാമോണാസ് ലായൻി (20മിലി. പ്രസ്തുതാമോണാസ് രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ)-ൽ അര മൺിക്കുർ മുക്കി വെക്കുക. നേരിട്ട് വിത്ത് നടത്താണെങ്കിൽ തെക്കൾക്ക് ലായൻി ഇലകളിൽ തളിക്കുക. ഈത് തെക്കൾ കരുതേതാടെ വളരുന്നതിന് സഹായകമാകും.</p>	
<p>നല്ല്</p>	<p>ഞാറ്റ്/ തെക്കൾ</p>	<p>ഓല ചുരുട്ടിപ്പുഴു</p> 	<p>മുള്ളുള്ള കവപു നെല്ലോലകൾക്കിടയിലൂടെ വലിച്ച ചുരുളുകൾ തുറക്കുക. തന്നെ വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്കമണം കുടുതലായിരിക്കും. നെന്നടിജൾ വളങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കരുത്.</p> <p>ആക്കമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ മാത്രം 'കൊറാജേജ്' 3 മിലി പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നതോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക.</p>
<p>നല്ല്</p>	<p>വിവിധ എട്ടം</p>	<p>കുഴൽ പുഴു</p> 	<p>കരി ഓയിലോ മരണ്ണാണ്യോ മുകിയ രൂപ കയർ നെല്ലോലകൾക്കിലൂടെ മുകളിലൂടെ വലിച്ച പുഴുക്കളെ വെള്ളത്തിലേക്ക് തളിയിട്ടു വെള്ളം വാർത്തു കളയുക. പാടത്തു വെള്ളം വാർത്തതിന് ശേഷം മരണ്ണാണ് 1 L / അരക്ക പൊടി/ 25 kg മണൽ രേഖകൾക്ക് വിതരുക</p>

തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>ചെന്നു ചെല്ലി</p> 	<p>നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ:-</p> <p>നേർപ്പിച്ച ഇമിസാക്കളാർപ്പിയ് (1മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) ലായൻ ചെല്ലി തുരന്ന ദ്വാരാങ്ങളിൽ നിന്നെയ ഒഴികുക.</p> <p>തോട്ടങ്ങളിൽ സവുർണ്ണ ശുചിത്വം അവലംബിക്കുക.</p>
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>ഇല/പുക്കുല കരിച്ചൽ</p> 	<p>1% ബോദ്യോ മിശ്രിതമോ 0.03% കോപർ ഓക്സീ ക്ഷോരോദ്യോ തജികുക. കുടാതെ മഞ്ഞളിപ്പ് രോഗത്തിന് പരഞ്ഞ പ്രതിവിധികൾ നിർബന്ധമായും അവലംബിക്കുക.</p>
കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>പീച്ചൽ രോഗം</p> 	<p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രോഗാമിൽ രണ്ടു ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണ് കുതിർക്കുക.</p> <p>ഇലകളിൽ പീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതെ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തജികുക.</p>
വെള്ളരി വർഗ്ഗ പിള	വളർച്ചാ ഘട്ടം	<p>മുദ്രുരോമ പുഷ്ടൽ രോഗം</p> 	<p>വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകളിൽ മുദ്രുരോമ പുഷ്ടൽ രോഗം പടരാൻ സാധ്യത. മുൻ കരുതലായി മാക്കോസൈബിൾ 2 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കി ഇലകളുടെ ഇരു പശ്ചത്തും തജികുക. രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ അക്കോമിൾ 3 മില്ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ 15 ദിവസ ഇടവേളകളിൽ മുന്നു തവണ തജികുക. രോഗബാധിത ഇലകൾ പറിച്ചെടുത്ത് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുക</p>
തക്കാളി	വളർച്ചാ ഘട്ടം	<p>വാട്ടം</p> 	<p>രോഗാമിൽ രണ്ടു ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തജികുക</p> <p>അക്കോമിൾ 2 മില്ലി. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തജികുക</p>

പാവയ്ക്ക്	വളർച്ചാ ഫട്ടം	ബാക്സീരിയൽ വിൽഡ് 	കൃഷിയിടം വ്യത്തിയായി സുക്ഷിക്കുക. നിലനിലയിൽ ഗുളിക രേഖയിൽ 2പിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് തളിച്ച് കൊടുക്കുക.
വഴുതന	കായ പിടിക്കുന്ന ഫട്ടം	തണ്ണുതുരപ്പൻ 	കീടം ആക്രമിച്ച ഭാഗങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക. കോറാൻട്രെനിലിപ്പോൾ (കൊറാജൈസ്) 3 മിലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക. തളിക്കുന്നേബാൾ പാടത്തിന്റെ പുരിതകു നിന്നും ഉള്ളിപ്പേക്ക് എന്ന രീതിയിൽ തളിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

**മുച്ച് അപായ വർഷയ്ക്ക് സുചന (ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായ്)

താക്കിത് (ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗര (തയ്യാറാവുക)	മുഖ (കാതോർക്കുക)	നിസ്താരം (നടപടികൾ ആവശ്യമില്ല)
----------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------------------

ഒപ്പ്/-
നോഡൽ ഓഫീസർ
ഗാമിണ കൃഷി കാലാവന്യം സേവ പദ്ധതി