



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: 2020 കെട്ടോബർ 10 മുതൽ കെട്ടോബർ 14 വരെ)



കോഴിക്കോട് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാഭേദിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിലിക്കോട്-ഉം
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയൂക്തമായി പുനര്ത്തിക്കുന്നത്

ബഹുജീവിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. 81/2020

തീയതി: 09/10/2020

എ. പിന്നിട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	കാറിഞ്ഞ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
48.6	32.2 – 32.6	24.0 – 25.7	74– 98	00 -12

ബി. വരുന അഞ്ചു ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	10.10.2020	11.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	14.10.2020
മഴ, മി.മീ	22	15	15	15	15
കുടിയ താപനില, °C	32	32	33	33	33
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	24	24	25	25	25
കുടിയ ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	98	98	98	98	98
കുറഞ്ഞ ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	74	74	74	74	74
കാറിഞ്ഞ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	14	10	8	14	14
കാറിഞ്ഞ ദിശ, ഡിഗ്രി	270	290	320	230	270
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	7	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫട്ടം	പ്രാണങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. മുപ്പെട്ടിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ താമസംവിനാ വിളവെടുക്കുക. കൊപ്പ, അടയ, സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ, റിപുർ എന്നിവ വൈയിലത്തിട്ടുണ്ടുന്നത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വേണം.		
രണ്ടാം വിള (മുണ്ടകൾ)	പാടം തയ്യാറാക്കുന്ന സമയം	പാടങ്ങളും വരവുകളും കളമുക്തമാക്കുക. വരവുകളിലെ തെണ്ടിൻ ഭാരങ്ങളെല്ലാം നന്നായി അടക്കുക. മണ്ണിൽ ഇരുന്നിൻ്റെ അംശം കുടുതലായതുകൊണ്ട് മണ്ണിലെ പുളിരസം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും നെല്ലിൻ്റെ വളർച്ച മുടക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. മണ്ണ് പരിശോധിച്ചതിനു ശ്രദ്ധം ആവശ്യമായ അളവിൽ കുമ്മായം/ഡോളമേയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മണ്ണ് പരിശോധന സാധ്യമായില്ല എങ്കിൽ പരിച്ചു നടക്കിനിനു രണ്ടാം മുൻപേ പാടത്തു രണ്ടു തവണ എക്കിലും രണ്ടാം കയറി നന്നായി വാർത്തു കളയുക. അതിനു ശ്രദ്ധം കുമ്മായം/ഡോളമേയർ സെൻസീന് 2കിലോ ശ്രാം എന്ന തോതിൽ മണ്ണുമായി നന്നായി ചേർത്തിളക്കണം. പരിച്ചു നടക്കിന് ശ്രദ്ധം 30-40 ദിവസം കഴിയുന്നോൾ വീണ്ടും മേൽപ്പറിഞ്ഞ അളവിൽ പാടത്തു വിതറി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പൊട്ടാഷ് വളപ്പെയോഗം കുമ്മായം ചേർത്ത് രണ്ടാം കഴിഞ്ഞതിനു ശ്രദ്ധമേ പാടുള്ളു. നിലമൊരുക്കുന്ന സമയത്തു ചാണകം /കുമ്മായം, പച്ചില വളം എന്നിവ സെൻസീന് 20കിലോ ശ്രാം എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് ഉള്ളതു മറിക്കണം.	

നെല്ല്	ശാർ നടുന്ന സമയം	ശാർ പരിച്ചു നടുന്നതിനു തൊട്ടു മുമ്പേ വേർ പ്രസ്തുതോമോണാസ് ലായൻ(20ഗ്രാം പ്രസ്തുതോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ)ൽ അര മൺകുർ മുക്കി വെക്കുക. ഇത് നെല്ല് കരുതേതാട വളരുന്നതിന് സഹായകമാകും.	
പച്ചക്രീകൾ	തെക്കൾ	മഴ്ന്നിൽ, സെന്റ് ദാനിന് നാല് കിലോ വീതം കുമായം വിതരുക. കൂടാതെ ട്രെക്കോഡെൽമ സമൃദ്ധമാക്കിയ ചാണകമോ കമ്പോഡ്യാ ഉപയോഗിക്കുക. ഇവ വാട രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. പരിച്ചു നടുന്നതിനു തൊട്ടു മുമ്പേ വേർ പ്രസ്തുതോമോണാസ് ലായൻ (20മിലി. പ്രസ്തുതോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ)-ൽ അര മൺകുർ മുക്കി വെക്കുക. നേരിട്ട് വിത്ത് നടത്താണെങ്കിൽ തെക്കൾക്ക് ലായൻ ഇലകളിൽ തളിക്കുക. ഇത് തെക്കൾ കരുതേതാട വളരുന്നതിന് സഹായകമാകും.	
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കുമ്പു ചീയൽ 	ഈ വർഷം കുമായം ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഓരോ തെങ്ങിൽ തടത്തിലും 2 മുതൽ 3 കിഗ്രാം വരെ കുമായം ചേർക്കുക. കുമ്പു ചീയൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിമാറി നശിപ്പിക്കുകയും മുറിവിൽ ഭോഡേ കുഴനു പുരുക്കുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമ്പു വരുന്നത് വരെ കുമ്പിനെ ഒരു ഫാസ്റ്റിക് കടലാസുപയോഗിച്ചു പൊതിഞ്ഞു മും വെള്ളം ഇരഞ്ഞാതെ സംരക്ഷിക്കുക. സമീപത്തുള്ള തെങ്ങുകളുടെ കുരുതേതാലുകൂം ചുറ്റുമുള്ള ലെക്കവീളുകളിലും ഒരു ശതമാനം വീരമുള്ള ഭോഡേ മിശ്രിതം തളിക്കുക. ദുർബല മേഖലകളിൽ, തെങ്ങുകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്താൻ സുക്ഷ്മ മുലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും സമഗ്ര പോഷക മുലക പരിപാലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	ചീചുൽ രോഗം 	മുൻകരുതലായി ട്രെക്കോഡെൽമ സമൃദ്ധമാക്കിയ വേഫിൽ പിരുന്നാകൾ-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വീതം തടത്തിൽ വീതിൽ മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക. രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രിഡോം രണ്ടു ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണ് കുതിർക്കുക. ഇലകളിൽ ചീചുൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.
കശുമാവ്	പുതുതായി നട തെക്കൾ	തേയില കൊതുക്കും അനുബന്ധ പുഷ്ടം രോഗങ്ങളും 	മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീരമുള്ള ഭോഡേ മിശ്രിതത്തിൽ 2 മിലി കിഗ്രാം ഫോം ചേർത്ത് തളിക്കുക. തളിരിന്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ ചീഞ്ഞു കാണുന്നുവെങ്കിൽ ഹൈള്റ് കൊണ്ടോൾ ഒരു മിലി.-ഒം മാലത്തിയോൻ രണ്ടു മിലി.-ഒം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായൻ തളിക്കുക

ഒപ്പ്/-

നോഡൽ ഓഫീസർ

ഗ്രാമീണ കൂഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി