



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: 2020 ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 21 വരെ)



കോഴിക്കോട് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിലിക്കോട്-ഉം
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുന്നിക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. 14/2021

തീയതി: 16/02/2021

എ. പിന്നിട അഞ്ച് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥാ


മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
0.0	33.4 – 34.4	23.0 – 24.9	57 – 82	00-06

ബി. വരുന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	17.02.2021	18.02.2021	19.02.2021	20.02.2021	21.02.2021
മഴ, മി.മീ	0	0	0.2	0.1	0
കുടിയ താപനില, °C	33	33	33	33	33
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	25	25	25	25	25
കുടിയ ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	85	85	85	85	85
കുറഞ്ഞ ആപോക്ഷിക ആർദ്ദത, %	57	57	57	57	57
കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	10	12	4	10	6
കാറിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	270	270	230	290	270
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	4	5	5	5	4

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫട്ടം	പ്രോജെക്ട്	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	മഴള്ള് സാധ്യതയില്ല.	പൊതുവെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥാ അനുഭവപ്പെടും. മഴ്ന്തിനിന്നും വിളകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായെങ്കാവുന്ന ഇളർപ്പ നഷ്ടം കുറക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക	
പച്ചക്കറികൾ	വിവിധ ഫട്ടങ്ങൾ	നീരുറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ	നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി വേഷധിഷ്ടിത കീടനാശിനി 4 മില്ലി റൈ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കി, പുഷ്പപിക്കുന്നതിന് രൊഴു മുന്നു വരെ 7 ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിൽ ഇലയുടെ ഇരുവശത്തും തളിക്കുക. ആക്കമണം രൂക്ഷമാവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഏന്ന കീടനാശിനി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 3 ഗ്രാം ഏന്നതോതിൽ നേർപ്പിച്ച് തളിക്കുക.

കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ	ചീച്ചൽ രോഗ 	മുൻകരുതലായി ടെട്ടേക്കോയർമ സമൃദ്ധമാക്കിയ വേപിൻ പിള്ളാക്ക്-ചാനക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക. രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണു തുടങ്ങിയാൽ രോഗാമിൽ രണ്ടു ഗ്രാം രൈ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണ് കുതിർക്കുക. ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	മഞ്ഞളിപ്പ് 	1) താഴെത്തെ നിരയിലെ രണ്ടു പച്ചാലകൾ വെട്ടി മാറ്റുക 2) തടത്തിൽ ചകിരി ചോറ് കനോഡയ്ക്ക് വിതരുക 3) ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ കൊണ്ട് പുതയിടുക 4) കണികകാ ജലസേചനം സ്വീകരിക്കുക 5) തെങ്ങങ്ങാനിന് തടത്തിൽ 200ഗ്രാം ബോറാക്ക്, 500ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സർഫോറ്റ്, 100ഗ്രാം സിക്ക് സർഫോറ്റ് എന്നിവ ചേർത്ത് മണ്ണുമായി യോജിപ്പിക്കുക. തെന്നെങ്ങുകളെ തണ്ടൽ നൽകി സംരക്ഷിക്കുക
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കൊന്ദാൻ ചെല്ലി  ഉയരം കുറഞ്ഞ തെങ്ങിനങ്ങൾ പൊതുവെ കുടുതൽ അകമണം വിയേയരാണ്	തെങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുനിന്നും ചെല്ലിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ണുകളെ കുത്തിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ബോർഡോ കുഴന്ന് കൊണ്ട് വണ്ണുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിരക്കുന്നത് മുറിവിൽ കുട്ടി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പുഷ്ട് ബാധയെ തടയാൻ സഹായിക്കും. 2. തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡ വ്യതിയാക്കിയ ശേഷം 6 ഗ്രാം ഫെർട്ടറ (Ferterra) 250ഗ്രാം മണ്ണിലും കുട്ടിക്കലെർത്തിയ മിശ്രിതം നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ പരിചരണം 3 പ്രാവശ്യം -ജനുവരി, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യണമെന്ന്. തോട്ടങ്ങളിൽ സമൃദ്ധി ശുചിത്വം അവലംബിക്കുക.
മാവ്	കായ പിടിക്കുന്ന ഘട്ടം	കായിച്ച് 	നിലത്തു വീണ്ടു കിടക്കുന്ന കായിച്ചകളെ എടുത്തു 60 സിഎം ആഴത്തിൽ കുഴി ഉണ്ടാക്കി നശിപ്പിക്കുക. തോട്ടങ്ങളിൽ പീരമോൺ കെസികൾ (@ 1 trap/15സെന്റീമീറ്റർ) സ്ഥാപിക്കുക.
കറവ് പശുകൾ	കുള്ളുമ്പ് രോഗം, സാംക്രമിക ചർമ്മ മുഴ രോഗം എന്നീ രൈവിന്സ് രോഗങ്ങൾ		അടുത്തുള്ള മുഗാശുപത്രിയിൽ നിന്നും വാക്സിൻ നൽകുക. തൊഴുത്തും പരിസരവും ശുചിയായി സുക്ഷിക്കുക.

ഒപ്പ്/-
നോസൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ ക്യാഷ് കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി