



കാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: : 25.06.2025 മുതൽ 29.06.2025 വരെ)



കോഴിക്കോട്‌ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്യം വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിന്നപഠി: പിലിക്കോട് / കെ.കെ.ഡി. - 50/2025

തീയതി: 24/06/2025

എ.പിനിട അഞ്ച് ദിവസത്തെ കാലാവസ്യം

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
84.7	30.2 – 33.8	23.5 – 27.0	74 – 97	00 – 00

ബി.വരുന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ളകാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	25-06-2025	26-06-2025	27-06-2025	28-06-2025	29-06-2025
മഴ, മി.മീ	15	25	28	18	15
കുടിയതാപനില, °C	30	30	30	30	30
കുറഞ്ഞതാപനില, °C	24	24	24	24	24
കുടിയആപേക്ഷികആർഭത, %	95	95	95	95	95
കുറഞ്ഞആപേക്ഷികആർഭത, %	80	80	80	80	80
കാറിന്റെവേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	12	8	10	10	3
കാറിന്റെഡിംഗ്, ഡിഗ്രി	270	290	290	270	200
മേഘവിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫട്ടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷികനിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ			ഒറ്റപ്പട്ട ശക്തിയായ മഴ **
			ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഭത അനുഭവപ്പെടും. അകാശം പുർണ്ണമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ഉഖ്താവ് സ്വാധാരണയിൽ കുറവായിരിക്കും. ജൂൺ 25മുതൽ 28 വരെ ഒറ്റപ്പട്ട ശക്തിയായ മഴ.
അപായ സൂചന			ജൂൺ 24,25 ന് ഒറ്റപ്പട്ട ശക്തിയായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
ആഖാതം			തുറസ്സായ സമലങ്ങളിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. നേർത്ത തണ്ണേള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഓണ്ടു വീഴ്ചയുള്ള സാധ്യത. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത.
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ			ഇരുന്നാണെങ്കിൽ കാർഷികോപ്പനങ്ങൾ (വിത്ത്, റൈം, കശുവണ്ടി, മണ്ണതൾ, കൊപ്പ മുതലായവ) വെയിലത്തിട്ടുന്നകുന്നതിന് തുറിയരുത്. വളം, വിത്ത്, കാലിത്തീറകൾ എന്നിവ ഇരുപ്പം തട്ടാത്തതും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുൻകളിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുക്ഷിക്കുക. കനുകാലികളെ ബലക്ഷയമുള്ള തൊഴുത്തുകളിൽ പാർപ്പിക്കരുത് വ്യക്ഷ വിളകൾ നടാം. വിളകൾ നടുന്നോൾ, ചെടികൾ തക്കിൽ ശാന്തരീയമായ അകലം ഉറപ്പാക്കണം. മേൽ മണ്ണിന്റെ കുട ജൈവ വളങ്ങൾ മിശ്രിതം ചെയ്യു വേണം കുഴികൾ മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം നിറക്കാൻ.

		<p>ശാഫ്ട് / ക്രീച്ച് ബല്ല് തെക്കൾ നടുന്നോൾ ദ്രോം ഭാഗം താരൻിരപ്പിനു രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു സെ. മീ. മുകളിൽ ആയി വരത്തകവെള്ളം നടുക. ഓട്ടിനു താഴെ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇലകൾ, ശിവരങ്ങൾ എന്നിവ അറുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. തെക്കുളികളിലേക്ക് മഴ വെള്ളം ലഭിച്ചിരഞ്ഞാതിരിക്കാൻ പറമ്പിൽ കുഴിക്കു ചുറ്റും വരന്പുകൾ തീർക്കുക.</p> <p>വ്യക്ഷ വിളകൾക്ക് നനാം ഗദു വളം ചേർക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. സംയോജിത വളപ്പയോഗം തീരി അവലംബിക്കുക.</p> <p>മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് / മഴയില്ലാത്ത ഇടവേളകളിൽ മാത്രം കീടനാശിനി തജ്ജനകുക. കീടനാശിനി മഴവേളളത്തിൽ ലഭിച്ചു പോവാതിരിക്കാൻ പശ കുട്ടിച്ചേർത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.</p> <p>പുതുതായി നട തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ വാർത്തയു കളഞ്ഞു തടത്തിലെ മേൽമുള്ള് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒപ്പ് ചീച്ചൽ, മഞ്ഞളിപ്പ് മുതലായവ കാണുന്നുവെങ്കിൽ കുമിൾനാശിനി പ്രയോഗിക്കുക.</p> <p>നന്ദി മഞ്ഞളിപ്പ് കണ്ടാൽ 19:19:19 വളം സ്പേഷ്യൽ പെയ്ഩ്റുകൊടുക്കാം.</p> <p>ശൈത്യമായ കാറ്റിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാവയ്ക്കു പത്രം നൽകുക.</p>	
തെങ്ങ്	നടീൽ	<p>നടാൻ വേണ്ടി നിലമൊരുക്കാം. വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തെങ്ങിന് അനുയോജ്യമല്ല</p> <p>നടാനുള്ള കുഴികൾക്ക് 1 മീറ്റർ വീതം നീളവും വീതിയും ആഴവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചെക്കൽ പ്രവേശമാണെങ്കിൽ കുഴികൾക്ക് 1.2 മീറ്റർ വീതം നീളവും വീതിയും ആഴവും വേണം.</p> <p>മേൽമുള്ളും ചാണകപ്പാടിയും ചാരവും കുട്ടിക്കലെർത്തിയ മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് കുഴിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഭാഗം നിറക്കുക.</p> <p>ഇതിന്റെ നടുകൾ ഒരു തേങ്ങാ മുടാൻ വിധം പിള്ളക്കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ തെര വെച്ച് മണ്ണിട്ട് ഉറപ്പിക്കുക. താങ്ങുകാൽ നാട്ടി അതിനോട് മുകൾഭാഗം ചേർത്ത് കെട്ടുക. തീവ്രതയേറിയ വെയിലിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ മടങ്ങു ഓഫൈ വാഴക്കോ കുഴിക്കരയിൽ കുത്തി വെക്കുക.</p> <p>തെക്കുളിയിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴക്കാലത്ത് കുഴിയിലേക്ക് വെള്ളം ലഭിച്ചിരഞ്ഞാതിരിക്കാൻ ചുറ്റും വരന്പ് തീർക്കുക</p>	
നന്ദി	വിവിധ ഘട്ടം	<p>ഇലകൾച്ചിൽ</p> 	<p>20 ശ്രാം പച്ച ചാണകം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തെളിയെടുത്തു തജ്ജനണം. ലീച്ചിൽസ് പാശർ കിഫികളിലാക്കി ഏകരിന് 2 കിലോ ഇട്ടുകൊടുക്കണം. സർട്ടപ്രോബ്സൈസ്കീസ് ഏകരിന് 30 ശ്രാം 200 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി തജ്ജനകുക.</p>
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	<p>കുന്നപ്പചീയൽ</p> 	<p>മൺ വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം മുൻകരുതലായി ഓരോ തെങ്ങിന്റെയും കുന്നപ്പിനു ചുറ്റും കവിളിൽ ദൈക്കോഡേർക്കു കെയ്യു നിക്ഷേപിക്കുക.</p> <p>അരൈക്കിൽ</p> <p>മാങ്കാസേബ് നിച്ച്, സുഷിരങ്ങൾ ഇട്ടു ചെറു പോളിത്തീൻ പാക്കറ്റുകൾ (2 ശ്രാം) തയ്യാറാക്കുക. തെങ്ങിന്റെ മൺ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മുൻകരുതലായി, ഇങ്ങനെയുള്ള മുന്നു പാകറ്റു വിതും ഓരോ തെങ്ങിന്റെയും കുന്നപ്പിനു ചുറ്റും കവിളിൽ വയ്ക്കുക.</p> <p>അരൈക്കിൽ</p> <p>തെങ്ങിന്റെ മണ്ഡലിലും, കുന്നപ്പിലും, മുൻകരുതലായി, 1% വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തജ്ജനകുക.</p>

കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	പീച്ചൽ രോഗം 	മുൻകരുതലായി ടെട്ടക്കോഡായർമ സന്ദൃഷ്ടമാക്കിയ വേദ്ധിൻ പിള്ളാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വീതം തടങ്കിൽ വിതറി മഴുമായി ചേർത്തിളക്കുക. രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രോഗാഭിൽ രണ്ടു ഗ്രാം ഒരു പിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടങ്കിലെ മര്ണുകുതിർക്കുക. ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.
കവുങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	മഹാജ്ഞി 	1% ബോഗ്യോ മിശ്രിതമോ 0.03% കോഷർ ഓസ്റ്റീ ക്ഷോരോഗ്യോ തളിക്കുക. കുടാതെ 0.5% ബോറക്സും തളിക്കുക ഓരോ കവുങ്ങിൽ തടങ്കിലും 1 കിഗ്രാം വീതം കുമ്മായം പേർക്കുക. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കവുങ്ങങ്ങാനിന് തടങ്കിൽ 100ഗ്രാം ബോറാസ്റ്റ്, 250ഗ്രാം മഗ്നീഷ്യം സർഫോറ്റ്, എന്നിവ ചേർത്തു മഴുമായി യോജിപ്പിക്കുക.
കശുമാവ്	വിവിധ ഘട്ടം	പുപ്പൽ രോഗങ്ങൾ	മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതത്തിൽ പശ ചേർത്തു ചേർത്തു തളിക്കുക. രോഗ ലക്ഷണം കാണുകയാണെങ്കിൽ രോഗം ബാധിച്ച കമ്പുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി മുറിച്ച ഭാഗത്തുനിന്ന് 15 സെ, മീ വരെ നീളത്തിൽ പശ ചേർത്തു തയ്യാറാക്കിയ ബോഗ്യോ കുഴന്ന് പുരട്ടുക.

**മഴ അപായ വർഷാ സുചന (ദുരന്തനിവാരണത്തിനായ്)

താക്കോത് (ഇടനാടപടിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	ശൈല (കാതോർക്കുക)	നീറ്റിംഗ് (ടപ്പടികൾആവശ്യമില്ല)
---------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------------------

ഒപ്പ്/-
നോയൽ ഓഫീസർ
ശ്രാമീണകൃഷികാലാവസ്ഥാസേവപദ്ധതി