



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: 2020 നവംബർ 28 മുതൽ ഡിസംബർ 02 വരെ)



കോഴിക്കോട് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിലിക്കോട്-ഉം
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുന്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൽ നന്ദി: പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. 95/2020

തീയതി: 27/11/2020

എ. പിന്നിട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
0.0	33.3 – 34.2	23.4 – 26.2	62 – 86	0-06

ബി. വരുന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	28.11.2020	29.11.2020	30.11.2020	01.12.2020	02.12.2020
മഴ, മി.മീ	0	0	0	0	2
കുടിയ താപനില, °C	33	33	33	33	33
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	25	25	25	25	25
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	85	85	85	85	85
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	62	62	62	62	62
കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	10	6	8	4	10
കാറിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	200	230	270	230	230
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	4	7	8	3	7

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അലട്ടം	പ്രഭ്രജാൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	ശൈത്യ കുറഞ്ഞ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴ ലഭിച്ചേക്കും.	നെല്ല്, റെബർ, കൊപ്പ എന്നിവ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് ഉണക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മഴനന്തരാത്തിന്തന്തെക്കു മാറ്റി വെക്കുക	
മല്ലിലെ ഇരുൾപ്പ നംഖം		വിളകളുടെ തടത്തിൽ പുതയിടുക.	

നെല്ല്	വിവിധ ഘട്ടം	ഇലകൾച്ചിൽ 	20 ശ്രാം പച്ച ചാണകം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തെളിയെടുത്തു തളിക്കണം. ബീച്ചിൽപ്പ് പാഡർ കിഴിക്കളിലാക്കി (എക്കറിന് 2 കിലോ എന്ന തോതിൽഎന്ന തോതിൽ പാടത്തെക്കു വെള്ളം കയറുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. രോഗാധിക്യം ഉണ്ടാക്കിൽ സ്വഭാവപ്രോത്സാഹനിൻ (എക്കറിന് 30 ശ്രാം 200 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി) തളിക്കുക.
നെല്ല്	വിവിധ ഘട്ടം	ഓല ചുരുട്ടിപ്പുഴു 	മുള്ളുള്ള കമ്പു നെല്ലോലകൾക്കിടയിലുടെ വലിച്ച് ചുരുളുകൾ തുറക്കുക. തണ്ടൽ വീഴുന്ന സമലഞ്ചളിൽ ആക്രമണം കുടുതലായിരിക്കും. നെന്തജാൻ വളങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുത്. ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ മാത്രം 'കകാറാജേൻ' 3 മില്ലി പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്നതോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക.
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കരിക്ക് പൊഴിച്ചിൽ 	കരിക്ക് പൊഴിച്ചിൽ കാണുകയും പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന മച്ചിങ്ങയുടെ മൊത്തിനു ചുറ്റും കൂത്രമായ അതിരുകളുള്ള അൽപ്പം കുഴിഞ്ഞ പാടുകൾ കാണുകയും ആണെങ്കിൽ ഒക്കാലിക്കിൻ1 ഒ മില്ലി.1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ചേർത്തിളക്കിയ ലായനിയിൽ ഒഅംഗ്രേഖാവെറ്റ് പശ ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ വീതം കലർത്തി കുലകളിൽ തളിക്കണം .
പച്ചക്കറികൾ	വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകൾ:- കായ പിടിക്കുന്ന ഘട്ടം	കായീച്ച 	തോട്ടങ്ങളിൽ ഫീറമോൺ കെസ്റ്റികൾ സ്ഥാപിക്കുക. ഫീറമോൺ കെസ്റ്റികൾ നീലോശ്വരം കാർഷിക കോളേജിൽ ലഭ്യമാണ്. (ഫോൺ: 04672 280 616) 2 മില്ലി മാലത്തിയോൺ കീടനാശിനി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലഭ്യപ്പെട്ട ഇംച്ചകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി 10 ശ്രാം ശർക്കര കൂടി ചേർത്തിളക്കി ഇലകളുടെ അടിവശങ്ങളിൽ തളിക്കുക.
വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിള	വിവിധ ഘട്ടം	മൃദുരോമ പുഷ്ട രോഗം 	വെള്ളരി വർഗ്ഗ വിളകളിൽ മൃദുരോമ പുഷ്ട രോഗം പടരാൻ സാധ്യത. മുൻ കരുതലായി ഒരു മാസക്കാണം. 2 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യറാക്കി ഇലകളുടെ ഇരു വശത്തും തളിക്കുക. രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മില്ലി.3 ലിറ്റർ. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ 15 ദിവസ ഇടവേളകളിൽ മുന്നു തവണ തളിക്കുക. രോഗബാധിത ഇലകൾ പരിശീടുത്ത് തീയിട്ട് സർപ്പിക്കുക.
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	തടതുരപ്പൻ വണ്ണ് 	കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കുക. ബ്യൂവേറിയ ബെസിയാന എന്ന മിത്ര കുമിൾ 5 , 6 , 7 മാസങ്ങളിൽ ഒരു ലിറ്റർിന് 20 ശ്രാം എന്ന തോതിൽ കലക്കി തടയിൽ തളിക്കുക. കീട ബാധ ഉണ്ടായാൽ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ദ്വാരങ്ങളിൽ ഫീറോനിൽ 0.015% (ഫീറോനിൽ 5 SC, 3 മില്ലി/ ലിറ്റർ) ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.

മാവ്	കായ പിടിക്കുന്ന ഫലം	കായിച്ച് 	<p>രണ്ട് ആഴത്തിൽ കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിലത്തു വീണ്ടും കിടക്കുന്ന മാങ്ങകൾ ഇട്ടു മുട്ടുക.</p> <p>തോട്ടങ്ങളിൽ ഫീറമോൺ കെസികൾ (@ 1 trap/15സെർവ്സ്) സ്ഥാപിക്കുക.</p>
------	---------------------------	---	---

ഒപ്പ്/-

നോഡൽ ഓഫീസർ

ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി