

आजादी
का
अमृत महोत्सव



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

കോഴിക്കോട് ജില്ല

(പ്രാബല്യം: 29.06.2022 മുതൽ 03.07.2022 വരെ)



കാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: : 29.06.2022 മുതൽ 03.07.2022 വരെ)



കോഴിക്കോട് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
 പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്യം വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിന് നമ്പർ: പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. 51/2022

തീയതി: 28/06/2022

എ. പിനിട അഞ്ച് ഭിവസത്ത കാലാവസ്യം

മഴ, മി.മീ	കൂടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
90.1	28.8 – 33.4	24.0 – 26.0	78 - 98	00 - 06

ബി. വരുന അഞ്ച് ഭിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	29-06-2022	30-06-2022	01-07-2022	02-07-2022	03-07-2022
മഴ, മി.മീ	10	14	12	9	6
കൂടിയ താപനില, °C	32	32	32	32	32
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	25	25	25	25	25
കൂടിയ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	92	92	92	92	92
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർഭത, %	82	82	82	82	82
കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	4	4	4	4	4
കാറിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	250	250	250	250	250
മേല വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	8	8	8

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
രൂപൊഴിവിടങ്ങളിൽ കനത്തമഴ			
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	കനത്തമഴ (ഇരുപത്തിനാലു മൺകുറിൽ 115.5 മില്ലി വരെ) പ്രവചനമനുസരിച്ച് അടുത്തയാഴ്യും മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഭത അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം പുർണ്ണമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കും. അന്തരീക്ഷ ഉഷ്ണാവ് സ്ഥാബാരണയിൽ കുറവായിരിക്കും		

<p><u>പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ</u></p>	<p>കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഉയർന്ന താപനിലയും ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രതയും ചീപ്പൽ, വാടം എന്നീ രോഗങ്ങൾ പട്ടണത്തിനുള്ള സാഹചര്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത വിളകൾക്ക് താഴെ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കുക.</p> <p>വീണുകിടക്കുന്ന തേങ്ങാ, അടക്ക എന്നിവ പുർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുക. രോഗം വന്നു നശിപ്പ് മരഞ്ഞൾ പുർണ്ണമായും മുൻചുമാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കണം. തോട്ടങ്ങളിൽ നല്ല നീർ വാർഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക.</p> <p>മുട്ടു കാണ്യ വിളകളായ വാഴ, പച്ചക്കരികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> <p>വളം, വിത്ത്, കാലിത്തീരകൾ എന്നിവ ഇഞ്ചലം തടാത്തത്തും കീഴ്ഞ്ഞൾ ഇല്ലാത്തത്തുമായ മുൻകളിൽ ഉയർത്തിക്കൊട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുക്ഷിക്കുക.</p> <p>വൃക്ഷ വിളകൾ നടുവേം, ചെടികൾ തക്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായ അകലം ഉറപ്പാക്കണം. മേൽ മല്ലിൻ്റെ കൂടെ ജൈവ വളങ്ങൾ മിശ്രിതം ചെയ്യു വേണം കുഴികൾ മുന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം നിറക്കാൻ. വർഷ കാലം തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി തെക്കൾ നടാം.</p> <p>ഗ്രാഫ്റ്റ് / ചീപ്പ് ബഡ് തെക്കൾ നടുവേം ചീപ്പ് ഭാഗം താരനിരപ്പിനു രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു സെ. മീ. മുകളിൽ ആയി വരുത്തകവല്ലാം നടുക. ഓട്ടിനു താഴെ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഇലകൾ, ശ്രീവരങ്ങൾ എന്നിവ അറുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.</p>		
<p>നല്ല്</p>	<p>പരിച്ചു നടയിടങ്ങൾ</p>	<p>തണ്ടുതുരപൻ</p> 	<p>രൈറക്കോഗ്രാമ മുട്ട കാർബൂകൾ ഉപയോഗിക്കാം കാവുന്നതാണ് ഒരു ഏക്കരിന് രണ്ട് . കാർബൂകളാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്</p> <p>ആക്കമണം ഉണ്ടക്കിൽ തേരാറാൻടാനിലിപ്പോൽ 18.5% W/W SC 3മില്ലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിത്തെളിക്കുക.</p>
<p>നല്ല്</p>	<p>പരിച്ചു നടയിടങ്ങൾ</p>	<p>ഓല ചുരുട്ടി പുഴു</p> 	<p>ഓല ചുരുട്ടി പുഴു ആക്കമണം ഉണ്ടക്കിൽ മുള്ളുള്ള കമ്പു വലിച്ചു ഓലപുരുളുകൾ തുറക്കുക.</p> <p>ആക്കമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഐസുബാൻ ദൈ അരമെമ്പയ് 1 മില്ലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിച്ച് കൊടുക്കുക.</p>

തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	ചെന്നിരോലിപ്പ് 	<p>രോഗം വന ഭാഗം ചെത്തി വൃത്തിയാകി ബോർഡോ കുഴന്പ് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. 1 % വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം (40 ലിറ്റർ വീതം) 2 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കാണാസോൾ/കോൺടാപ്പ് 25 മിലി 25 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി 4 മാസ ഇടവേളകളിൽ മണ്ണിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.</p> <p>രു മാസത്തിനു ശേഷം 5 കി ഗ്രാം ദൈക്കോയർമ സമുദ്ധമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിള്ളാക്ക്, 500 ഗ്രാം വീതം സുക്കജ്ജ മുലക മിശ്രിതം (അയർ), എന്നിവ തടത്തിൽ വിതരി മണ്ണുമായി ഇളക്കി ചേർക്കുക.</p> <p>രോഗം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണൊക്കിൽ മുൻകരുതലായി എല്ലാ തെങ്ങിനും 5 കി ഗ്രാം ദൈക്കോയർമ സമുദ്ധമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിള്ളാക്ക്, 500 ഗ്രാം വീതം സുക്കജ്ജ മുലക മിശ്രിതം (അയർ), എന്നിവ തടത്തിൽ വിതരി മണ്ണുമായി ഇളക്കി ചേർക്കുക.</p>
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കുമ്പു ചീയൽ 	<p>കുമ്പുചീയൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിമാറ്റി സർപ്പിക്കുകയും മുൻവിൽ ബോർഡോ കുഴന്പ് പുരട്ടുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമ്പു വരുന്നത് വരെ കുമ്പിനെ രു പ്ലാറ്റിക് കടലാസുപ്പയോഗിച്ചു പൊതിഞ്ഞു മറ വെള്ളം ഇറങ്ങാതെ സംരക്ഷിക്കുക.</p> <p>സ്ഥീപത്രുള്ള തെങ്ങുകളുടെ കുരുതേതാലപ്പെടും ചുറ്റുമുള്ള ലൈക്കോളുകളിലും രു ശത്രമാനം വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുക.</p> <p>ഒൻഡു മേഖലകളിൽ, തെങ്ങുകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്താൻ സുക്കജ്ജ മുലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര പോഷക മുലക പരിപാലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.</p>
കുരുമുളക്	നടീൽ സമയം	വാട രോഗം 	<p>മുൻകരുതലായി ദൈക്കോയർമ സമുദ്ധമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിള്ളാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വീതം തടത്തിൽ വിതരി മണ്ണുമായി ചേർത്തിളക്കുക..</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണു തുടങ്ങിയാൽ രണ്ടു ഗ്രാം രു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക</p>
വാഴ	വിവിധ ഘട്ടം	ഇലപ്പുള്ളി രോഗം 	<p>തടത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. മുൻകരുതലായി സുപ്പയോമാനസ് ലായൻി (20 ഗ്രാം രു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയത്) രണ്ടാഴ്ചയിടവേളകളിൽ തളിക്കുക</p> <p>രോഗം ബാധിച്ചാൽ:- രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. കാർബന്റുസാസിം അല്ലെങ്കിൽ മാങ്കാസബ് ഇല രണ്ടാഴ്ച ഇടവേളയിൽ മാറി മാറി 2 മിലി. രു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തളിക്കുക</p>

വെള്ളരിവർഗ്ഗ വിളകൾ	വിവിധ ഘട്ടം	മുട്ടുരോമ പുഷ്ട രോഗം 	മുട്ടുരോമ പുഷ്ട രോഗം : മാങ്കാസേബ് 3 ശ്രാം രേഖ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ആഴ്ച തോറും തജിച്ച് കൊടുക്കുക.രോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ അക്കോമിൻ 3 മില്ലി രേഖ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന അനുപാതത്തിൽ 15 ദിവസ ഇടവേളകളിൽ മുന്നു തവണ തജിക്കുക. രോഗബാധിത ഇലകൾ പരിച്ഛടുത്തു തീയിട്ടു സർപ്പിക്കുക.
ഇന്തി	വിവിധ ഘട്ടം	ബാക്ക്‌റീയൽ വാട്ടം  	രോഗബാധയില്ലാത്തിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിത്തിഞ്ചി മാത്രം നടാൻ ഉപയോഗിക്കുക. നടുന്നതിനു മുൻപ് വിത്തിഞ്ചി സ്റ്റൈപ്പറ്റോസൈസ്റ്റിൽ 200 മില്ലി ശ്രാം രേഖ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലകി തയ്യാറാക്കിയ ലായനിയിൽ മുഷ്ടു സെക്കൻഡ് നേരം മുക്കുക. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ രേഖ സെക്കൻഡ് മുന്നുകിലേം വീതം കുമ്മായം മണ്ണിൽ ചേർത്തിളക്കുക. ഒട്ടകേബാധികൾ, സ്പൈഡേരാമോൺസ് എന്നീ ജീവാണുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. രോഗം ബാധിച്ച ചെടികൾ മുൻചു വെള്ളത്തിൽ മുകിയാൽ മുൻവിൽ നിന്നും നേർത്ത വെളുത്ത ബാക്ക്‌റീയൽ ലായനി നൂലുപോലെ പുറത്തു വരുന്നത് കാണാം. അവ പിഞ്ചുമാറ്റി രുക്കുതമാനം വീരമുള്ള ബോധേയാമിശ്രിതം കൊണ്ട് തടം കുതിർക്കുക.
കശുമാവ്	വിവിധ ഘട്ടം	പുഷ്ട രോഗങ്ങൾ	മുൻകരുതലായി രേഖ ശതമാനം വീരമുള്ള ബോധേയാ മിശ്രിതത്തിൽ പശ ചേർത്ത് ചേർത്ത് തജിക്കുക. രോഗ ലക്ഷണം കാണുകയൾ മുൻചു മാറ്റി മുൻചു ഭാഗത്തുനിന്ന് 15 സെ. മീ വരെ നീളത്തിൽ പശ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ബോധേയാ കുഴന്ന് പുരട്ടുക.
കവുങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	തല ചീയൽ/ മഹാജ്ഞി 	1% ബോധേയാ മിശ്രിതമോ 0.03% കോഷർ ഓലീ കോറോഡേയാ തജിക്കുക. കുടാതെ 0.5% ബോറക്സും തജിക്കുക. ഓരോ കവുങ്ങിൽ തടത്തിലും 1 കിഗ്രാം വീതം കുമ്മായം ചേർക്കുക. രണ്ടായ്ക്കു കഴിത്തു കവുങ്ങങ്ങാനിന് തടത്തിൽ 100ഗ്രാം ബോറായ്ക്ക് 250ഗ്രാം മഗ്നൈഷ്യം സർഫേറ്റ്, എന്നിവ ചേർത്ത് മണ്ണമായി യോജിപ്പിക്കുക.
കോഴി	വിവിധ ഘട്ടം	അണ്ണുബാധ	കുടുക്കുട തരിയിൽ ഇളർപ്പം നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇളർപ്പം നിലനിന്നാൽ തരിയിൽ വീഴുന്ന കാഞ്ചത്തിൽ നിന്നും അമോൺ വാതകം പുരത്തെക്കു വർക്കു.. അത് കോഴിക്കുട ആരോഗ്യത്തിനെ പ്രതികുലമായി ബാധിക്കും

ഓഫ്/-
സോഫ്റ്റ് ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി