



കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും
(പ്രാബല്യം: 2020 സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ ഒക്ടോബർ 04 വരെ)



കോഴിക്കോട് ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാരാലു പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പിലിക്കോട്-ഉം
ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുന്നത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൽ നന്ദി: പിലിക്കോട്/കെ.കെ.ഡി. 78/2020

തീയതി: 29/09/2020

എ. പിന്നിട അഞ്ച് റിവസതെത്ത കാലാവസ്ഥ

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
5.2	31.0 – 32.6	25.0 – 25.7	73– 95	00 -10

ബി. വരുന അഞ്ച് റിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	30.09.2020	01.10.2020	02.10.2020	03.10.2020	04.10.2020
മഴ, മി.മീ	15	2	0.5	0	0
കുടിയ താപനില, °C	32	33	33	33	32
കുറഞ്ഞ താപനില, °C	26	26	26	26	26
കുടിയ ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	95	95	95	95	95
കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർദ്ധത, %	71	71	71	71	71
കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	10	10	12	12	10
കാറിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	290	270	270	270	270
മേഘ വിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	7	7	6	5	4

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വീഴ	അപ്രഭ	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ			<p>സെപ്റ്റംബർ 30ന് ദ്രോപ്പട്ട കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടായെങ്കാം. കാലാവർഷം പിന്നീട് വാങ്ങി തുടങ്ങി. ഒക്ടോബർ രണ്ടാം വാരം ആകുന്നോഫേക്കും കാലാവർഷം പൂർണ്ണമായും പിന്നീട് വാങ്ങും.</p> <p>രണ്ടാം വീഴ നെൽകൃഷി: വിളയുടെ മധ്യ കാലം മുതൽ ഇല ദാർശനം നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഹസ്യകാല ദിർഘമുഴുള്ള വിത്തിനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.</p>
തെങ്ങ്	വിവിധ അപ്രഭ	<p>കൊന്പൻ ചെല്ലി</p>  <p>ഉയരം കുറഞ്ഞ തെങ്ങിനങ്ങൾ പൊതുവെ കുടുതൽ ആക്രമണ വിധേയരാണ്</p>	<p>തെങ്ങിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുനിന്നും ചെല്ലിക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് വണ്ണുകളെ കുത്തിയെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുക. ബോർഡോ കുഴന്പ് കൊണ്ട് വണ്ണുകൾ തുരന്ന ദ്വാരം നിറക്കുന്നത് മുറിവിൽ കുടി ഉണ്ടായെങ്കാവുന്ന പുഷ്ടം ബാധയെ തടയാൻ സഹായിക്കും.</p> <p>2. തെങ്ങിന്റെ മുട വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം 6 ഗ്രാം ഫെർട്ടർ (Ferterra) 250(ഗ്രാം മണ്ണപും കുട്ടിക്കലർത്തിയ മിശ്രിതം നിക്ഷേപിക്കുക. ഈ പരിചരണം 3 പ്രാവർഷം -ഇന്നുവരി, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യണം.</p> <p>തോട്ടങ്ങളിൽ സമൃദ്ധി ശുചിപ്പിക്കുക.</p>

തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം		<p>രു തെങ്ങിന് 50 കിഗ്രാം ചാനകവും 5കിഗ്രാം വേപ്പിൻ പിള്ളാക്കും വിതം ഇടു കൊടുക്കുക . 3 മാസ ഇടവേളയിൽ 1% വിരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം)40 ലിറ്റർ വിതം (2 മീ വരെ ചുറ്റുവിൽ . ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തടത്തിൽ തെങ്ങിൻ</p>
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം		<p>തുടർച്ചയായ മഴ മുലം കുന്ന് ചീയൽ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തെങ്ങിലെ കുന്ന് ചീയൽ രോഗത്തിന് മുൻകരുതലായി മാങ്കാസൈബ് നിംച്ച, സുഷിരങ്ങൾ ഇട ചെറു പോളിത്തീൻ പാക്രൂകൾ (5 ഗ്രാം) മുന്നു പാകരെ വീതം ഓരോ തെങ്ങിന്റെ കുന്നിനു ചുറ്റും കവിളിൽ വയ്ക്കുക. മഴ പെയ്യുന്നോൾ മരുന്ന് കുറേശയായി ലെച്ചിരിങ്ങുന്നത് വഴി ഈ രോഗം രു പശിയി വരെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും.</p> <p>രോഗം ബാധിച്ച തെങ്ങിലും അടുത്തുള്ള തെങ്ങുകളിലും 1% വിരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുകുക.</p>
വാഴ	വിവിധഘട്ടം		<p>രോഗം ബാധിച്ച ഇലകൾ വെട്ടി മാറ്റി തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുക. രോളുക്കുള്ളിൽ തന്നെ രു ശതമാനം ബോർഡോമിശ്രിതം ലിറ്ററിന് ഒരു മീറ്റി പശ കുട്ടി ചേർത്ത് തളിക്കുക. കുമ്പിർന്നാൾനിയായ കാർബൺഡാസിം (0.1 %) അല്ലെങ്കിൽ മാങ്കാസൈബ് (0.2 %) രണ്ടാഴ്ച ഇടവേളയിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക.</p> <p>ടടബുക്കോണാസൈബ്/ഡൈഫെനോകോണാ സൈബ്/അസോക്കിസ്ട്രോബിൻ എന്നിവ 0.1% വിരുത്തിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക.</p>
മുളക്	ഞാറ്റി/ തെക്കൾ		<p>രോഗം ബാധിച്ച ചെടികൾ വേരോടെ പിഴുതെടുത്തു കത്തിച്ചു കളയുക.</p> <p>കോഷർ ഓക്സി ഷ്ടോറേഡ് 4 ഗ്രാം രു ലിറ്റർ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക.</p>
പപ്പായ	വിവിധ ഘട്ടം		<p>രോഗം ബാധിച്ച ചെടികൾ വേരോടെ പിഴുതെടുത്തു കത്തിച്ചു കളയുക.</p>

ഒപ്പ്/-

നോസൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ കൃഷി കാലാവസ്ഥ സേവ പദ്ധതി