




Agromet Advisory Service bulletin 35/17 Tuesday dt 29.08.2017

(Issued jointly by IAAS Vellanikkara)

Dept. of Agriculture Meteorology, College of Horticulture, Vellanikkara

E mail: kauagmet@yahoo.co.in, cohagmet@kau.



PALAKKAD

CURRENT SYNOPTIC SITUATION: A well marked Low pressure area over south Madhya Pradesh and neighbourhood with the associated upper air cyclonic circulation upto 7.6 km above sea level tilting South wards with height .An offshore trough at mean sea level runs from South Maharashtra coast to Kerala coast.

Heavy rainfall warning: Heavy rainfall is likely to occur at one or two places in Kerala till the morning of 31st August 2017.

NWP MODELS BASED DISTRICT LEVEL WEATHER FORECAST

ISSUED ON: 29.08.2017

VALID TILL 08:30 HRS IST OF THE NEXT 5 DAYS

DISTRICT: PALAKKAD

ENSEMBLE FCST

PARAMETERS	30.08.2017	31.08.2017	01.09.2017	02.09.2017	03.09.2017
Rainfall (mm)	24	22	8	10	3
Max Temperature (deg	30	31	31	31	31
Min Temperature (deg C)	24	24	24	24	24
Total cloud cover (octa)	7	7	7	7	7
Max Relative Humidity (%)	90	90	90	90	90
Min Relative Humidity (%)	80	75	70	70	70
Wind speed (kmph)	8	8	8	8	8
Wind direction (deg)	270	270	270	290	290

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാഘട്ടം /രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല് (ജ്യോതി, കാഞ്ചന)	പാലുറയ്ക്കുന്ന പരുവം/ചാഴി	വേപ്പെണ്ണ അടങ്ങിയ കീടനാശിനികൾ 3 മി.ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. (ചാഴിക്കെതിരെ കീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് രാവിലെ 8 മണിക്ക് മുമ്പോ, വൈകീട്ട് 3 മണിക്കു ശേഷമോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളി പരാഗണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.)
വാഴ	എർവിനിയ റോട്ട്	നീർവാർച്ച സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക. വാഴത്തടത്തിൽ കുമ്മായം ഇടുന്നതും, നീർച്ചാലുകളിൽ സ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടുന്നതും നല്ലതാണ്. 20 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് ഫ്ളൂറസൻസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായനി മണ്ണ് കുതിരത്തക്ക വണ്ണം, വാഴയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒഴിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും. രോഗം ബാധിച്ചാൽ 5 ഗ്രാം സ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ 3 ഗ്രാം ഓക്സിക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രാം കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ലായനി മണ്ണ് കുതിരത്തക്ക വണ്ണം, വാഴയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒഴിക്കണം. രോഗം രൂക്ഷമായ വാഴകൾ വെട്ടിമാറ്റി നശിപ്പിക്കുകയും, ആ കുഴിയിൽ കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടുകയും ചെയ്യുക.
മൃഗസംരക്ഷണം	-	കൊതുകു നിവാരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. കുള്ളമ്പ് ചീയൽ, കുള്ളമ്പിനുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതം എന്നിവ ഒഴിവാക്കാനായി വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കാൻ വിടാതിരിക്കുക. തൊഴുത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പനിയുടെയും ശ്വാസത്തടസത്തിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുക. Centre for Animal Adaptation to Environment and Climate Change Studies, KVASU, Mannuthy.

