



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനികര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



പാലക്കാർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്വാട തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 09/2019(18), വൈള്ളിയാഴ്ച

തീയതി 01.03.2019

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഐടക്കങ്ങൾ	02.03.2019	03.03.2019	04.03.2019	05.03.2019	06.03.2019
മഴ (മൈലി.മീറ്റർ)	0	0	0	0	0
ഉയർന്ന താപനില (°C)	37	37	37	37	37
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	24	24	24	24	24
മേഘവ്യാപ്തി (കേട്ട)	6	6	7	5	4
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർഡത (%)	85	85	85	85	85
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർഡത (%)	40	40	40	40	40
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	6	6	6	6	6
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	250	250	250	250	250

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ വരും 5 ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാലട്ടം	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
തെങ്ങ്	പരിചരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ	-	ഇന്ത്യപും നിലനിർത്തുന്നതിനായി പച്ചയോ, ഉണങ്ങിയതോ ആയ ചകിരി തടങ്ങളിൽ ഇട്ട് മുടുന്നത് നല്കാണ്. തെങ്ങിന്റെ ചുവടിൽ നിന്ന് മുന്ന് മീറ്റർ അകലത്തിൽ പരികൾക്കിടയിൽ ചാലുകൊണ്ടോ, ഓരോ തെങ്ങിന്റെ കടയ്ക്ക് ചുറ്റും തടയിൽ നിന്നും 2 മീറ്റർ അകലത്തിൽ വടത്തിൽ ചാലുകളെടുത്തോ, അതിൽ ചകിരി നിരത്തിയ ശേഷം മണ്ണിട്ടു മുടാം. ചകിരിയുടെ കുഴിഞ്ഞ ഉൾഭാഗം മുകളിലേയ്ക്ക് പരത്തുക്കു പിയത്തിലാണ് ചകിരി ചാലുകളിൽ അടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനു മുകളിൽ മണ്ണിട്ടു മുടാം. ചകിരി അടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ശുശ്രാം 5-7 പർഷ്യക്കാലം നിലപിൽക്കും. ചകിരിക്കുപകരം ചകിരിചോറ്റ് തെങ്ങാനിന് 25 കി.ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ഓരോ പർഷ്യപും തടത്തിൽ ഇട്ട് മുടുന്നതും ഇന്ത്യപും സംരക്ഷിക്കാൻ ഉതകും.
വാഴ	-	ഇലത്തീനിപ്പിച്ചു	കാറ്റിന്റെ വേഗത കുടുന്നതിനാൽ വാഴകൾക്ക് താങ്ങുക്കാലുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. വാഴയിൽ ഇലത്തീനിപ്പിച്ചുവിന്റെ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം ബാധിച്ച വാഴയുടെ ഇലകൾ പുഴുവിനോട് കൂടി തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയുക. ആക്രമണം അധികമായാൽ 2 മല്ലി പ്രഭുവെഞ്ചാമേഡ് (ഫെയിം) 10 ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.
പച്ചക്കുറികൾ (പയർ)	കായ്ക്കുന്ന പരുവം	കുരുട്ടിപ്പ്	അന്തരീക്ഷ ഉഷ്ണമാവ് കൂടി വരുന്നതിനാൽ പച്ചക്കുറികളിൽ മണ്ണാർത്ഥി, ഇലപ്പേൻ, വൈള്ളിച്ച മുതലായ നീരുറി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾ മുലമുള്ള കുരുട്ടിപ്പുരോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 10 മാറ്റം വെർട്ടിസീലിയം ഒരു മീറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ലായിപ്പിച്ച് തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പുന്നയാനുന്ന കീടനാശിനികൾ പത്രം ദിവസം ഇടവിട്ട് തളിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
മുഗ്ഗസംരക്ഷണം	കനുകാലികൾക്ക് അപകടകാർകളായ സുരൂവിക്കിരണങ്ങൾ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ കാലത്ത് 9 മണിക്ക് മുൻപോൾ വൈകീട്ട് നാല് മണിക്ക് ശേഷമോ മാത്രം മേയാൻ അനുവദിക്കാവു. അതിൽ തന്നെ വൈകീട്ട് മേയാൻ വിടുന്നത് ആണ് കുടുതൽ നല്കുന്നത്. (സി.എ.എ.ഡി.ഐ.സി.എസ്., കെ.വി.എ.എസ്.യു., മണ്ണുത്തി)		