



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനികര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



പാലക്കാർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്വാട തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 39/2019(77), ചൊവ്വാഴ്ച

തീയതി 24.09.2019

അടുത്ത 5 വിവസന്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	25.09.2019	26.09.2019	27.09.2019	28.09.2019	29.09.2019
മഴ (മില്ലി.മൈറ്റർ)	3	40	30	1	5
ഉയർന്ന താപനില (°C)	34	34	34	34	34
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	24	24	24	24	24
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	93	93	93	93	93
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	63	63	63	63	63
കാറ്റിന്ത്യേവഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	8	6	10	6	4
കാറ്റിന്ത്യേ ശി (ഡിഗ്രി)	270	270	270	290	250
മോഖവ്യാപ്തി (കെട്ട)	4	8	8	4	6

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്ന രണ്ടുവിവസന്തേക്ക് മഴയുടെ തീവ്രത കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ: വിളകളിലെ രോഗകീടങ്ങൾ പടരാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മുൻകരുതല്പകൾ എടുക്കുക.		
നെല്ല് (വിരിപ്പ്)	ബാക്കീരിയൽ ഇല കരിച്ചൽ	മഴക്കാലത്ത്, നെല്ലിൽ ബാക്കീരിയ മുലമുള്ള ഇലകർണ്ണിൽ പടരാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ 20 ശ്രാം പച്ചപാണകം രൈലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തെളിഡെടുത്തതും, 20ശ്രാം സ്വീഡോണാസ് രൈലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കിയതും ചേര്ത്ത് തളിക്കാവുന്നതാണ്.
വംശ	പിണ്ടിപ്പുഴി	മഴക്കാലമായതിനാൽ, വാഴയിൽ പിണ്ടിപ്പുഴിവിന്റെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാൻ 2.5 മി.ലി ക്രോൾഡെപെറിഫോസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മി.ലി കൂഗാൽഫോസ് രൈലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ഏനു തോതിൽ ഇലക്കവിളുകളിലും, വാരങ്ങളിലും നല്ലവിധം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാത്തകവിധം പൂർണ്ണ ചേര്ത്ത് തളിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
ജാതി	കായ് അഴുകൽ, ഇല പൊഴിച്ചിൽ	മഴക്കാലത്ത്, ജാതിയിൽ കായ് അഴുകൽ, ഇലപൊഴിച്ചിൽ എന്നീ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻകരുതലായി രണ്ടു കിലോ ടെട്ടേക്കോഡർ, 90 കിലോ ചാണകപ്പോടിയും, 10 കിലോ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കുമായി കൂട്ടികലർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഇലപ്പും നിലനിൽക്കുത്തകവെള്ളം രണ്ടാഴ്ചുവെച്ച മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ വീതം ഓരോ ചെടിക്ക് ചുവട്ടിലും ഇടുക്കാടുകുക. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം സ്വീഡോണാസ് 20 ശ്രാം രൈലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 1% വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം കലക്കി തളിക്കുക. മണ്ണിലെ അമ്ലതാ കുറയ്ക്കാനായി കുമ്മായം ഇടുക്കാടുകൊഡുന്നതാണ്.
പച്ചക്കറികൾ (പയർ)	മുണ്ട	പയറിൽ മുണ്ടയുടെ ആക്രമണം കണ്ടാൽ 2% വീരുമുള്ള വേപ്പുണ്ണ എമർഷിഷൻ തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിസിലിയം ലെക്കാനി എന്ന മിത്രകുമിൾ 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ 10 ദിവസം ഇടവിട്ട് കൊടുക്കുക. രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ 3 മി.ലി ഇമിഡാഫ്ലോപിഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ശ്രാം തയാമെതോക്കാം 10 ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തളിക്കുക.
മുഗസംരക്ഷണം		<ul style="list-style-type: none"> കനുകാലികൾക്ക് നിത്യവും പച്ചപ്പുള്ളിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക. വിറ്റാമിൻ ധാതു ലവണ മിശ്രിതം നിർദിഷ്ട അളവിൽ നിന്തേന നൽകുക. <p>(CAADECCS, KVASU മണ്ണുത്തി)</p>