




കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല



കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വെള്ളാനിക്കര

കാർഷിക നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ

തൃശ്ശൂർ

Email: kauagmet@yahoo.co.in, cohagmet@kau.in

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 07/18(13), ചൊവ്വാഴച്ച്

തീയതി 12.02.2018

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വെള്ളാനിക്കരയിൽ മഴ 5.2 മി.മീ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 34.4 മുതൽ 36.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാപനില 21.6 മുതൽ 23.9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, രാവിലെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത 66 മുതൽ 95 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത 28 മുതൽ 55 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറ്റിന്റെ വേഗത മൺിക്കുറിൽ 2.7 മുതൽ 6.9 കിലോമീറ്ററും, സൂര്യ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 5.0 മുതൽ 10.2 മൺിക്കുറും, ബാഷ്പവീകരണം ദിനം പ്രതി 3.5 മുതൽ 5.3 മില്ലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തെക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	13.02.2018	14.02.2018	15.02.2018	16.02.2018	17.02.2018
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	0	0	0	0	3
ഉയർന്ന താപനില (°C)	36	36	36	36	36
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	24	24	24	24	24
മേഘവ്യാപ്തി (കെട്ട)	3	3	4	4	4
കൃടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	80	80	80	80	80
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	60	60	60	60	60
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മൺിക്കുറ)	6	6	6	6	6
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	270	270	270	270	270

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാഖട്ടം/ രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല്		പുണ്യകൃഷി തൊടു പരുവത്തിലാണ്.
തെങ്ങ്	പരിചരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ	തെങ്ങിൻതടങ്ങളിൽ ഉള്ളപ്പും നില നിർത്തുന്നതിന് പച്ചയേറ, ഉണങ്ങിയതോ ആയ ചകിൽ, ഇലകൾ, തെങ്ങോലകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തടങ്ങളിൽ പുതയിടുക. തെങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും താഴെത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓലകൾ ബെട്ടിമാറുക. തടിയിൽ ചുടേൽക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ 2 മീറ്റർ ഉയരംവരെ ചുണ്ണാമ്പ് പൂശുക. മണ്ണിന്റെ താപനില ക്രമീകരിക്കാൻ ജൈവാംഗ്രഹം നിലനിർത്തുക. കണ്ണിക ജലസേചന രീതി വഴി നന്നയ്ക്കുക.
കുരുമുളക്	-	കുരുമുളക് തണ്ടുകൾ മുറിച്ചു വേരു പിടിപ്പിക്കുന്നതിനായി തവാരണകളിൽ പാകേണ്ട സമയമാണിൽ. കൊടിത്തലവകൾ മുറിച്ച് 2-3 മുട്ടുള്ള കഷണങ്ങളാകി പോളിത്തീൻ ഉറകളിൽ നട്ട മുള്ളിക്കാം. പോട്ടിങ്ക് മിശ്രിതത്തിൽ വാം കർച്ചർ ചേർക്കുന്നത് ചെടികൾക്ക് കരുത്തും രോഗ പ്രതിരോധ ശക്തിയും കുടും.
പച്ചക്കരികൾ (പാവൽ)	കായ്ച്ച	കേടു വന്ന കായ്കൾ നശിപ്പിക്കുക. പച്ചക്കരികളിലെ കായ്ച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായ പിന്മോണി കെണ്ണിയായ കുലുർ 6 എണ്ണം ഒരു ഏകരിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുളസി/പശക്കെണ്ണികൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ടും കുറവില്ലക്കിൽ 2 മില്ലി മാലത്തിയോൺ ലിറ്റർ നന്നിൽ 10 ശ്രാം ശർക്കര ചേർത്ത് പൂക്കുന്ന സമയത്തും കായ്ച്ച പിടിക്കുന്ന സമയത്തും തളിച്ചു കൊടുക്കണം.
മുഖസംരക്ഷണം	ഇംച്ച, കൊതുക്, ചെള്ള് മുതലായ ബാഹ്യപരാദങ്ങളെ അകറുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. (ഇഞ്ഞാലുള്ളംട, ഗധാടം, എമീഉവേ)	