




**കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല**  
**കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം, ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്,**  
**വൈളിയാഴ്ച**



**കാർഷിക നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ**

**തൃശ്ശൂർ**

**E mail: kauagmet@yahoo.co.in, cohagmet@kau.in**

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 12/18(24), വൈളിയാഴ്ച

തീയതി 23.03.2018

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കു കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	24.03.2018	25.03.2018	26.03.2018	27.03.2018	28.03.2018
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	2	1	2	0	0
ഉയർന്ന താപനില ( $^{\circ}\text{C}$ )	35	35	35	35	35
കുറഞ്ഞ താപനില ( $^{\circ}\text{C}$ )	25	25	25	25	25
മോഖ്യപ്പെടൽ (ഒക്ട)	5	5	5	3	3
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർഡത (%)	85	85	85	85	85
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർഡത (%)	65	65	65	65	65
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ )	010	010	010	010	010
കാറ്റിന്റെ ഓഷ്ണി ( ഡിഗ്രി) ( ഡിഗ്രി)	250	250	250	250	250

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാഖട്ടം/ രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല്	ചിനപ്പു പൊട്ടുന്ന പരുവം/ഓലചുരുട്ടി ഫൂളു	ഒരു ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിന് 2 സിസി ടെടക്കോശാമ കാർഡ് ചെറു കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വയലിന്റെ പലഭാഗത്ത് ഓലയുടെ അടിഭാഗത്തായി കൂത്തി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 2 മി.ലി കിന്നാൽപോസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈളളത്തിൽ ലായിപ്പിച്ചു തളിക്കുക.
തെങ്ങ്	കൊന്ധവൻ ചെല്ലി	തെങ്ങിൽ കൊന്ധവൻ ചെല്ലിയുടെ ആക്രമണം കാണുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 250 ശ്രാം വേപ്പിന്റെ പൊടിച്ചത് തുല്യ അളവ് മണലുമായി അല്ലെങ്കിൽ നാല് നാല്പത്താലിൽ ശുളികകൾ മണലുമായി ചേർത്ത് നാനോബാലയ്ക്കു ചുറുരുമുള്ള മുന്നോ നാലോ ഓലപ്പുടയ്ക്കുള്ളിൽ നിറയ്ക്കുക. സൂഷിരങ്ങൾ ഒരു ഫെൽട്ട് (ക്രാം) സാഷ് മുന്നുപായ്ക്കരു വീതം ഒരോ തെങ്ങിന്റെ കുന്നിനു ചുറ്റും വയ്ക്കുക.
കുരുമുളക്	ബ്രൂതവാട്ടം	കുമീർ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ മുൻകരുതലായി ജാതി, കുരുമുളക് എന്നിവയിൽ 1% ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുക. അന്തരീക്ഷ ആർഡത കുടുന്നതുമുലം കുരുമുളകിൽ ബ്രൂതവാടരോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്രൂതവാടരോഗം വരാതിരിക്കാൻ ടെടക്കോബെർമ അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂഫോമാണാസ് എന്നീ കർച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 1% വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിച്ചുകൊടുക്കുക.
പച്ചക്കറികൾ (പടവലം, പാവൽ)	കായ്യീച്ച	കേടു വന്ന കായ്കൾ നശിപ്പിക്കുക. പച്ചക്കറികളിലെ കായ്യീച്ചകളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകമായ ഫിറമോൺ കെന്നിയായ കൃലുഡ് 6 എണ്ണം ഒരു ഏക്കറിന് അല്ലെങ്കിൽ തുളസി/പച്ചക്കണ്ണികൾ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ടും കുറവില്ലകിൽ 2 മി.ലി മാലത്തിയോൺ ലിറ്റർ ഒന്നിന് 10 ശ്രാം ശർക്കര ചേർത്ത് പുക്കുന്ന സമയത്തും കായ് പിടിക്കുന്ന സമയത്തും തളിച്ചു കൊടുക്കണം.
മുസന്നുകൾ	ഇരുച്ച്, കൊതുക്, ചെള്ള് മുതലായ ബാഹ്യപരാബങ്ങളെ അകറുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. (CAADECCS, KVASU, Mannuthy)	