



കാർഷിക നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ

തൃശ്ശൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 26/2018(51), ചൊവ്വാഴ്ച

തീയതി 26.06.2018

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈള്ളാനിക്കരയിൽ 165.7 മി.മീ മഴ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 27.6 മുതൽ 31.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറവുണ്ടാപനില 22.2 മുതൽ 23.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, രാവിലെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടെറ 95 മുതൽ 99 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടെറ 70 മുതൽ 98 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറിന്റെ വേഗത മൺിക്കൂറിൽ 0.6 മുതൽ 2.8 കിലോമീറ്ററും, സുരൂ പ്രകാശത്തിന്റെ ആളപ് ദിനം പ്രതി 0.0 മുതൽ 5.1 മൺിക്കൂറും, ബാഹ്യപീകരണം ദിനം പ്രതി 1.4 മുതൽ 3.1 മില്ലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	27.06.2018	28.06.2018	29.06.2018	30.06.2018	01.07.2018
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	12	12	20	10	18
ഉയർന്ന താപനില (°C)	31	30	30	30	30
കുറവും താപനില (°C)	22	22	22	22	22
മേഘവ്യാപ്തി (കെട്ട)	7	7	8	7	8
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടെറ (%)	90	90	90	90	90
കുറവും അന്തരീക്ഷ ആർട്ടെറ (%)	80	80	80	80	80
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മൺിക്കൂറ്)	015	015	015	015	015
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	250	250	250	250	250
അടുത്ത ആഴ്ച കേരളത്തിൽ ശരാശരിയിൽ കുറവ് മഴ ലഭിക്കും.					
അടുത്ത ആഴ്ച തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.					

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാഖട്ടം	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല്	ചിനപ്പു പൊട്ടുന്ന പരുവം	ഓലചുരുളിപ്പുഴു	ഒരു ഏക്കർ പാടങ്ങേബത്തിന് 2 സിസി ടെടക്കോഗ്രെമു കാർബ് ചെറു കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വയലിന്റെ പലഭാഗത്ത് ഓലയുടെ അടിഭാഗത്തായി കുത്തി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 2 മില്ലി കിറനാൽഫോസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു തളിക്കുക.
തെങ്ങ്	-	ചെമ്പൻ ചെല്ലി	തെങ്ങുകളിൽ ചെമ്പൻ ചെല്ലിയുടെ ആക്രമണം കണ്ടു വരുന്നു. പ്രതിരോധ നടപടിയായി ഇമിഡാ ഫ്ലോപിഡ് 1 മില്ലി 10 ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി കുന്നിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.
വാഴ	കുലയ്ക്കുന്ന പരുവം	എർവിനിയ രോട്ട്	നീർവാർച്ച സാകരും മെച്ചപ്പെടുത്തുക. വാഴത്തെ കുമ്മായം ഇടുന്നതും, നീർച്ചാലുകളിൽ സ്റ്റീച്ചിങ്സ് പൊരും ഇടുന്നതും നല്കാം. 20 ശ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് എംബ്രൂസിന്റെ ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായൻ മൺ്റ് കുതിരിത്തക്കു വള്ളു, വാഴയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒഴിക്കുന്നത് രോഗപ്രതിരോധങ്ങൾ വരിച്ചിട്ടും. രോഗം ബാധിച്ചാൽ 5 ശ്രാം സ്റ്റീച്ചിങ്സ് പൊരും അല്ലെങ്കിൽ 3 ശ്രാം കോപ്പർ ഓക്സിക്കോഡോഡൈ അല്ലെങ്കിൽ 2 ശ്രാം കോപ്പർ പൈറോഡ്യാക്കോസി ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ലായൻ മൺ്റ് കുതിരിത്തക്കു വള്ളും, വാഴയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒഴിക്കുന്നു. രോഗം രൂക്ഷമായ വാഴകൾ വെട്ടിമാറ്റി നശിപ്പിക്കുകയും, ആ കുഴിയിൽ കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീച്ചിങ്സ് പൊരും ചേർക്കേണ്ടതുമാണ്.
പച്ചകർണകൾ (പയർ)	-	പ്രധാനമുള്ള വാട്ട് രോഗം	തുറർച്ചയായ മഴയും, വൈള്ളക്കെട്ടും മൂലം പയറിൽ പ്രധാനമുള്ള മൂലമുള്ള വാട്ട് രോഗം കാണാനിന്നുണ്ട്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 2 ശ്രാം ബാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ 2 മി.ലി. കോൺട്രാവർ ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ മൺ്റു കുതിരിത്തക്കു വിശദം 15 ദിവസം ഇടവിട്ട് മാറി മാറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പുർണ്ണമായും രോഗം ബാധിച്ചു ചെടികൾ പറിച്ചു മാറ്റി നശിപ്പിക്കുകയും, തടക്കിൽ ഒരു നൂളിൽ സ്റ്റീച്ചിങ്സ് പൊരും ചേർക്കേണ്ടതുമാണ്.
മുഗസംരക്ഷണം	വൈള്ളക്കെട്ടും സ്ഥലങ്ങളിൽ കനുകാലികളെ മേയാൻ വിടുന്ന കർഷകൾ എലിപ്പുനിക്കേതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു. കുളവുരോഗത്തിനും കുരലപ്പുനുമുള്ള പ്രതിരോധ കുതിരിവെയ്പുകൾക്കായി അടുത്ത മുഗാദുപര്യാപ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. (സി.എ.എ.ഡി.ഇ.സി.എസ്., കെ.വി.എ.എസ്.യു., മൺ്റത്തി)		