



കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ, തൃശ്ശൂർജില്ല
പ്രവചന കാലയളവ് 17.8.2022 മുതൽ 21.8.2022 വരെ
വെള്ളാനിക്കര കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലെ
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗവും
ഭാരതീയ കലാവസ്ഥാവകുപ്പും സംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത്



എ.എ.എസ് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 33/2022,(65) ചൊവ്വാഴ്ച

തീയതി 16/8/2022

1. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി:

മഴ (മി.മി)	ഉയർന്ന താപനില (°C)	കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് (മണിക്കൂർ)	ബാഷ്പീകരണം (മി.മി)
(40.2)	(29.4-31.9)	(22.7-24.4)	(92-98)	(57-78)	(1.8-4.6)	(1.3-9.2)	(2.0-3.7)

2. അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	17.08.2022	18.08.2022	19.08.2022	20.08.2022	21.08.2022
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	0.1	1	0.5	1	0.4
ഉയർന്ന താപനില (°C)	32	31	31	30	30
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	24	23	24	24	24
കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	92	92	92	92	92
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	60	60	60	60	60
കാറ്റിന്റെവേഗത(കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	6	8	6	10	8
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	270	270	270	270	290
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	5	6	6	6	6

കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്പ്: ജില്ലയിൽ വളരെ നേരിയ തോതിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കേരളത്തിൽ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറവ് മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.

അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴയുടെ പ്രവചനം

2022 ആഗസ്റ്റ് 17	2022 ആഗസ്റ്റ് 18	2022 ആഗസ്റ്റ് 19	2022 ആഗസ്റ്റ് 20	2022 ആഗസ്റ്റ് 21
വളരെ നേരിയ മഴ	വളരെ നേരിയ മഴ	വളരെ നേരിയ മഴ	വളരെ നേരിയ മഴ	വളരെ നേരിയ മഴ

3. വിള പരിപാലനത്തിനുള്ള പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങളും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ: മഴ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിളകൾക്ക് വളപ്രയോഗം, കീടനാശിനിപ്രയോഗം മുതലായ വിളസംരക്ഷണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. കൊപ്ര, അടയ്ക്ക മുതലായവ വെയിലുകാണുമ്പോൾ ഉണക്കാവുന്നതാണ്..

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക/ മൃഗസംരക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല് -വിരിപ്പ് - ചിനപ്പ് പൊട്ടുന്ന പരുവം	പരിചരണം	നെല്ലിലെ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മഗ്നീഷ്യം,സൾഫർ , ബോറോൺ, സിങ്ക്, കോപ്പർ, അയൺ, മാംഗനീസ്, മോളിബ്ഡിനം എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിൽ ലഭ്യമായ നെല്ലിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ 10 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിച്ചുകൊടുക്കുക. ഹൃസ്വാകാല മൂപ്പുള്ള ഇങ്ങൾക്കും, മധ്യകാല മൂപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക്കും മേൽ വളമായി ഒരേക്കുറിന് 20 കിലോ യൂറിയയും 10 മുതൽ 12 കിലോ പൊട്ടാഷും നൽകാവുന്നതാണ് .
വാഴ	മാണുഷ്യകൾ	തുടർച്ചയായി മഴ ലഭിച്ചതിന്റെ ഫലമായി വാഴയിൽ മാണുഷ്യകൾ രോഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിന് പ്രതിരോധനപടിയിായി 20 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി മൂന്ന് ലിറ്റർ വീതം ഓരോ വാഴയുടെ ചുവട്ടിലും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.
കുമ്പളക	ദൂതവാട്ടം	തുടർച്ചയായി മഴ ലഭിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത കൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ കുമ്പളകിലെ ദൂതവാട്ട രോഗത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിരോധിക്കാനായി 1% വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിച്ച് കൊടുക്കുകയും രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് ഗ്രാം കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി ചെടിയുടെ തടത്തിൽ മൂന്നു മുതൽ അഞ്ച് തവണയായി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.
ഇഞ്ചി	തണ്ടു തുരപ്പൻ	ഇഞ്ചിയിൽ തണ്ടുതുരപ്പന്റെ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനു പ്രതിവിധിയായി ബ്യൂവേറിയ 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക

മൃഗസംരക്ഷണം - കന്നുകാലികൾക്ക് ചാനക പരിശോധന നടത്തി വീര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷം വീര മരുന്ന് നൽകുക. കന്നുകുട്ടികൾക്ക് ആദ്യധോസ് വീര മരുന്ന് പ്രസവിച്ചു രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നൽകണം.(CAADECCS, KVASU, Mannuthy).