



തൃശ്ശൂർ ജില്ല

**കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ
കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.**

എ.എ.എസ് 40/2018(79), ചൊമ്പാഴച്ച

തീയതി 01.10.2018

പ്രളയ ബാധിത മേഖലകളിൽ ഇതു ബുള്ളറ്റിനിലെ കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രായോഗികമാണ്.

കഴിഞ്ഞ അതുചെയ്തിലെ അന്തരീക്ഷപഠനി: കഴിഞ്ഞ അതുചെയ്തിലെ 26.1 മി.മീ മഴ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 25.6 മുതൽ 33.3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാപനില 21.7 മുതൽ 23.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, രാവിലെന്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേറ്റ് 81 മുതൽ 95 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെന്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേറ്റ് 56 മുതൽ 75 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറ്റിന്റെ പേരു മണിക്കൂറിൽ 1.0 മുതൽ 1.9 കിലോമീറ്ററും, സുരൂ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 1.9 മുതൽ 8.3 മണിക്കൂറും, ബാഷ്പവീകരണം ദിനം പ്രതി 2.1 മുതൽ 3.4 മില്ലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	02.10.2018	03.10.2018	04.10.2018	05.10.2018	06.10.2018
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	12	16	18	16	26
ഉയർന്ന താപനില (°C)	33.1	33.3	33.4	33.6	33.6
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	22.6	22.4	22	22.8	22.8
മോബാധ്യനി (കെട്ട)	6	6	6	6	6
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേറ്റ (%)	90	90	90	90	90
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടേറ്റ(%)	70	70	70	70	70
കാറ്റിന്റെ പേരു (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂറ്)	6	6	6	6	6
കാറ്റിന്റെ ദിന (ഡിഗ്രി)	230	230	230	230	230

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാവലക്ടം	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
തെങ്ങ്	-	വൈള്ളീച്ച	തെങ്ങിലെ വൈള്ളീച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കാനായി 2% വീരുമുള്ള വേപ്പേണ്ണ് എമർഷൻ തയ്യാറാക്കിയിലേക്ക് 20ഗ്രാം ലൈക്രാനിസീലിയം എന്ന മിത്രകുമിൾ ചേർത്ത് നന്നായി കലക്കി ഇലകളുടെ അടിവശത്ത് പതിയത്തക്കവിയം തളിച്ച് കൊടുക്കുക.
നെല്ല്	കൊയ്തത്തു പരുവം	ജാലചുരുട്ടിപ്പുഴു, തണ്ടുതുരപ്പൻ	നെല്ലിലെ ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെയും തണ്ടുതുരപ്പുനെയും പ്രതിരോധിക്കാനായി ഒരു എക്കർ പാടശേഖരത്തിൽ 2 സിസി ചെടക്കോഗമ്മ കാർഡ് വീതം, ചെറു കഷ്ണങ്ങളെളായി മുറിച്ചു വയലിന്റെ പലാഗത്ത് ഫാസ്റ്ററികൾ ക്രൂക്കളിൽ കുത്തി വെക്കുക. ആക്കമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ 3 മിലി കോറാൻട്ടെനിലിപ്പോൾ 10 ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു തളിക്കുക. മുണ്ടകൾ കൃഷി ഇരക്കുന്ന പാടങ്ങളിൽ നിലം ഒരുക്കൽ ആരംഭിക്കാം.
പച്ചമരികൾ	കൊയ്ക്കുന്ന പരുവം	കൊയ്യും തണ്ടും തുരക്കുന്ന കീടം	പയറിൽ കായും തണ്ടും തുരക്കുന്ന കീടത്തിന്റെ, ഉപദ്രവമെറ്റു ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുക. കായ്തുരപ്പുള്ളി ആക്കമണം നിയന്ത്രിക്കാനായി വേപ്പിൻ കുറുസത്ത് 5% വീരുത്തിൽ തയ്യാരാക്കി തളിക്കുക. ആക്കമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ 2 മി.ലി മെള്ളേബെന്റോമെഡ് 10 ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോറാൻട്ടെനിലിപ്പോൾ 3 മി.ലി. 10 ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിലോ തളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
മുഗസംരക്ഷണം	<ul style="list-style-type: none"> • കനുകാലികളെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മേയാൻ വിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. • പുപ്പൽ വിഷബാധ തടയുന്നതിനായി കാലിത്തീറ്റ ഇടയ്ക്കിടെ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുക. • വിത്തമരുന്നുകളും പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളും ധമാസമയം നൽകുക. <p>(സി.എ.എ.ഡി.ഇ.സി.സി.എസ്., കെ.വി.എ.എസ്.യു., മൺസുത്തി)</p>		