



തൃശ്ശൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷിവകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോട് തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 42/2018(83), ചൊമ്പാഴ്ച

തീയതി 16.10.2018

പ്രളയ ബാധിത മേഖലകളിൽ ഇതു ബുള്ളറ്റിനിലെ കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രായോഗികമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചപരിയിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈളളാനിക്കരയിൽ 67.0 മി.മീ മഴ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 32.0 മുതൽ 35.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാപനില 22.6 മുതൽ 25.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, രാവിലെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടറ്റ് 93 മുതൽ 97 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടറ്റ് 64 മുതൽ 81 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറ്റിന്റെ പേരഗത മൺിക്കൂറിൽ 0.5 മുതൽ 1.8 കിലോമീറ്ററും, സുരൂ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 0.4 മുതൽ 8.9 മൺിക്കൂറും, ബാഷ്പപീകരണം ദിനം പ്രതി 1.8 മുതൽ 3.1 മില്ലി.മീറ്ററ് വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	17.10.2018	18.10.2018	19.10.2018	20.10.2018	21.10.2018
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	20	18	10	10	16
ഉയർന്ന താപനില (°C)	33.2	33.8	33.0	32.8	32.8
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	24.2	24.6	24.4	23.8	23.6
മോബൈൽ ഫോൺ (കെട്ട)	5	5	5	5	5
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടറ്റ (%)	90	90	90	90	90
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടറ്റ(%)	75	75	75	75	75
കാറ്റിന്റെ പേരഗത (കിലോമീറ്റർ/മൺിക്കൂറ്)	006	006	006	006	006
കാറ്റിന്റെ വീബ് (ഡിഗ്രി)	290	290	290	290	290
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദേശീയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.					

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	വളർച്ചാവല്ക്കം	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
തെങ്ങ്	-	കൊന്ധവൻ ചെല്ലി	തെങ്ങിൽ കൊന്ധവൻ ചെല്ലിയുടെ ആക്രമണം കാണുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തെങ്ങിന്റെ മണം നന്നായി വ്യാതിയാക്കിയ ശേഷം കാട്ടുപ്പു മെഹ്രോബോഡി 4G-20ഗ്രാം, 200 ഗ്രാം മണലുമായി ചേർത്തതോ ഫിഡോനിൽ 0.3G-20 ഗ്രാം മണലുമായി ചേർത്ത മിശ്രിതമോ കുമ്പോലയുടെ ചുറ്റുമുള്ള രണ്ടോ മുന്നോ ഇലക്കവിളുകളിൽ നന്നായി നിയർക്കുക. വർഷത്തിൽ മുന്നു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആവർത്തനിക്കേണ്ടതാണ്. (ജനുവരി, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ/കുട്ടാബർ)
വാഴ	-	ഇലത്തീനിപ്പുഴു	വാഴയിൽ ഇലത്തീനിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കാണുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം ബാധിച്ച വാഴയുടെ ഇലകൾ പുഴുവിനോട് കൂടി തന്നെ നശിപ്പിച്ച കിളയുക. ആക്രമണം അധികമായാൽ 2 മില്ലി കിഗ്രാംഫോം 1 ലിറ്റർ വൈളളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 മില്ലി ക്ലോറാൻട്രാനിലിഫോശ് 10 ലിറ്റർ വൈളളിൽ കലക്കി തളിക്കുക.
പച്ചക്കരികൾ	-	-	കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ എന്നിവയുടെ വിത്തുകൾ തവാരണകളിൽ പാകി മുളപ്പിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്. കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ മുതലായ പച്ചക്കരികൾ നടുവോൾ മണ്ണിൽ സൃഷ്ടിയാമോണാന് കൾച്ചർ ചേർക്കുന്നതുവഴി കുമിൾരോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ തടയാവുന്നതാണ്.
മുഗസംരക്ഷണം			<ul style="list-style-type: none"> • കനുകാലികളെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മേയാൻ വിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. • പുപ്പൽ വിഷബാധ തടയുന്നതിനായി കാലിത്തീറ്റ ഇടയ്ക്കിടെ വൈയിലത്തിൽ ഉണക്കുക. • വിത്തരുന്നുകളും പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകളും ധമാസമയം നൽകുക. (സി.എ.എ.ഡി.ഐ.എ.സി.സി.എസ്., കെ.വി.എ.എസ്.യു., മണ്ണുത്തി)