



**കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ, തൃശൂർ ജില്ല**  
**പ്രവചന കാലയളവ് 25.10.2023 മുതൽ 29.10.2023 വരെ**



വെള്ളാനിക്കർ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലെ  
 കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗവും  
 ഭാരതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി തയ്യാറാക്കുന്നത്

**എ എ എസ് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 43/2023, (85) ചൊവ്വാഴ്ച** **തീയതി 24/10/2023**

കഴിഞ്ഞആഴ്ചയിൽ അനുഭവിച്ച കാലാവസ്ഥ (2023 ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ ഒക്ടോബർ 24 വരെ)							കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ		കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം (ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ ഒക്ടോബർ 29 വരെ)				
18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	23/10	24/10	തീയതി		25/10	26/10	27/10	28/10	29/10
0.0	0.0	2.8	0.0	0.4	15.2	0.0	മഴ (മില്ലിമീറ്റർ)		10	5	2	9	5
32.8	34.5	33.6	33.4	33.6	32.5	32.0	ഉയർന്ന താപനില (°C)		32	32	32	32	32
24.6	24.0	23.9	24.6	25.2	23.3	23.4	കുറഞ്ഞ താപനില (°C)		23	23	23	23	23
Cloudy	Overcast	Cloudy	Cloudy	Cloudy	Overcast	Overcast	AM	മേഘ വ്യാപ്തി (ഒക്ടാ)	Overcast	Overcast	Cloudy	Overcast	Overcast
Overcast	Overcast	Cloudy	Cloudy	Overcast	Overcast	PM							
88	95	96	95	93	96	95	കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)		97	97	97	97	97
51	55	66	63	70	75		കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)		75	75	75	75	75
1.1	1.4	0.7	1.3	1.0	1.2	1.6	കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)		4	5	5	4	6
ENE	C	C	C	C	C	C	AM	കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW
C	NNE	SW	C	NNE	SE	PM							
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ മഴ (മില്ലിമീറ്റർ)				01/01/2023 മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള മഴ (മില്ലിമീറ്റർ)				01/06/23 മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള മഴ (മില്ലിമീറ്റർ)					
18.4				1766.2				1632.8					

**കാലാവസ്ഥാ അറിയിപ്പ്:** IMD യുടെ പ്രവചനപ്രകാരം ജില്ലയിൽ നേരിയ തോതിൽ മഴയ്ക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട മഴയ്ക്കും സാധ്യത. കേരളത്തിൽ ശരാശരി മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.

**3. വിള പരിപാലനത്തിനുള്ള പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങളും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും (Thrissur District)**

പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: കാർഷികവിളകളിൽ രോഗകീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം സംരക്ഷിക്കാൻ ശരിയായ പുതയിടൽ രീതി അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്.

വിളകൾ	രോഗ-കീടങ്ങൾ	കാർഷിക / മൃഗസംരക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല് മുണ്ടകൻ (ഞാറുപരുവം)	-	നെല്ലിൽ കാണുന്ന പോളരോഗം, പോള അഴുകൽ, ഇലപ്പുള്ളി എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് മുൻകരുതലായി 20 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കുക.
തെങ്ങ്	-	തെങ്ങുകൾക്ക് രണ്ടാം ഘട്ട വളപ്രയോഗം നടത്താവുന്നതാണ്. തെങ്ങൊന്നിന് ഒന്നര കിലോഗ്രാം യൂറിയ, ഒന്നേമുക്കാൽ കിലോ റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ്, രണ്ടേകാൽ കിലോ മ്യൂറേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് എന്നിവ വീതം ഇട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്
കവുങ്ങ്	-	കവുങ്ങിൽ ആദ്യ വളപ്രയോഗം നടത്താവുന്നതാണ്. കവുങ്ങൊന്നിന് 109 ഗ്രാം യൂറിയ, 111 ഗ്രാം റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ്, 117 ഗ്രാം മ്യൂറേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് എന്നിവ വീതം ഇട്ടുകൊടുക്കാവുന്നതാണ് .

മൃഗസംരക്ഷണം:- എലിപ്പനിക്കും ബാഹ്യപരാദങ്ങൾക്കും എതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. കാലിത്തീറ്റയിൽ പൂപ്പൽ വിഷബാധ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചാണക പരിശോധന നടത്തി വിദഗ്ദ്ധോപദേശ പ്രകാരം വിരമരത്ന നൽകുക. (CAAECCS KVASU, Mannuthy)