



തൃശ്ശൂർജില

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 48/2020(96), വൈള്ളിയാഴ്ച

തീയതി 27.11.2020

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ വൈള്ളാനിക്കരയിൽ 0.5 മി.മീ മഴ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 32.7 മുതൽ 33.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറവെന്തതാപനില 17.9 മുതൽ 22.9 ഡിഗ്രിസെൽഷ്യസും, രാവിലെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത 74 മുതൽ 93 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത 33 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറ്റിന്റെ വേഗത മൺകുറിൽ 0.8 മുതൽ 6.1 കിലോമീറ്ററും, സൂര്യ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 4.4 മുതൽ 10.0 മൺകുറിും, പ്രാപ്തിപീകരണം ദിനം പ്രതി 1.8 മുതൽ 4.9 മില്ലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തെക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	28.11.2020	29.11.2020	30.11.2020	01.12.2020	02.12.2020
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	8	6	0	1	9
ഉയർന്ന താപനില (°C)	31	31	31	31	31
കുറവെന്ത താപനില (°C)	21	21	21	21	21
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	96	96	96	96	96
കുറവെന്ത അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	65	65	65	65	65
കാറ്റിന്റെവേഗത(കിലോമീറ്റർ/മൺകുറ)	8	6	8	10	12
കാറ്റിന്റെ ദി (ഡിഗ്രി)	200	90	70	70	50
മോഡവ്യാപ്തി (കേംടി)	7	7	6	3	8

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച്, ജില്ലയിൽ ഒരുപ്പേട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: കാർഷികോൽപ്പനങ്ങൾ ഉണക്കുമ്പോഴും, കീടനാശിനി പ്രയോഗം നടത്തുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.		
നെല്ല് (മുണ്ടകൾ) കത്രി വരുന്ന പരുവം	ബാക്കടീരിയൽ ഇലകരിച്ചിൽ	നെല്ലിൽ ബാക്കടീരിയ മുലമുള്ള ഇലകരിച്ചിൽ പടരാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ 6 ശ്രാം സ്വർഡപ്രോസൈക്കിൾ മുപ്പത് ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ കലകൾ തളിക്കാവുന്നതാണ്.
	ബാലചുരുട്ടിപ്പുഴു	മുടികൈടക്കിയ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാൽ നെല്ലിൽ ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിന് 2 സിസി ബെട്ടക്കോഗ്രമ കാർഡ് ചെരു കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വയലിന്റെ പലഭാഗത്ത് ഓലയുടെ അടിഭാഗത്തായി കൂത്തി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 3 മില്ലി ക്രോറാഡാൻട്രോലിഫോൾ പത്ത് ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ലായിപ്പിച്ചു തളിക്കുക.
	തവിട്ട് മുണ്ട	നെല്ലിൽ മുണ്ടയുടെ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തയോമെന്തോക്സാം റണ്ട് ശ്രാം പത്ത് ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലകൾ തളിക്കുക.
പച്ചക്കരികൾ (പയർ)	കായ്തുരപ്പൻ പുഴു	പയറിൽ കായ്തുരപ്പൻ്റെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാനായി വേപ്പിൻ കുരുസത്ത് 5 ശതമാനം പീരുത്തിൽ തയ്യാറാക്കി തളിക്കുക. ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ 2 മി.ലി പ്രജൂഡെവൈന്റൊമെല്ല് പത്ത് ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന തോതിലേ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോറാഡാൻട്രോലിഫോൾ 3 മി.ലി. പത്ത് ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന തോതിലേ തളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.
മുളക്	വൈള്ളിച്ച	മുളകിൽ വൈള്ളിച്ചയുടെ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2 ശതമാനം വീരുമുള്ള വേപ്പേണ്ണ് വൈള്ളത്തുള്ളി എമർഷണ്ട് തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ലെക്കാനിസീലിയം ലെക്കാൻ എന മിത്രകുമിൾ 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ പത്തു ദിവസം ഇടപിട്ട തളിക്കുക.
മുഖസംരക്ഷണം	1. ചെള്ള്, ഇളച്ച്, പേൻ തുടങ്ങിയ ബാഹ്യപരാധാധനകൾ എത്തിരെ ജാഗ്രത പൂലർത്തണം. 2. പനി, വിറയൽ, വിശ്വാസ്യായ്മ, മുത്രത്തിൽ തവിട്ടു നിറം എന്നിവ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ ഉടൻ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടണം	