



കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെള്ളാനിക്കര ,കെ എ യു പോസ്റ്റ്, തൃശൂർ, കേരള കണ്ണൂർ പിരിയോഡ്



0054/2015/1383

02/06/2015 - 06/06/2015

:02/06/2015

		(mm)	(°C)	(°C)	(octa)	(%)	(%)	(Kmph)	(deg)
01/06	KANNUR (CANNANORE)		35.70	25.60	6.00	55.00		3.20	E
02/06	KANNUR (CANNANORE)	0.20	33.00	26.70	7.00	68.00	55.00	3.20	S
28/05	KANNUR (CANNANORE)		35.20		2.00		50.00	6.40	W
29/05	KANNUR (CANNANORE)		34.10	27.00	6.00	68.00		0.00	Calm

കണ്ണൂർ

	(mm)	(°C)	(°C)	(octa)	(%)	(%)	(Kmph)	(deg)
03/06	0	34	26	5	90	75	15	270
04/06	18	34	26	7	92	75	15	290
05/06	40	34	26	8	91	75	15	290
06/06	58	32	25	8	91	75	15	270
07/06	18	32	25	7	91	75	15	250

Weather summary of the preceding week

Weather forecast valid

ആകാശം മേഘാവൃതമായിരിക്കും. ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കൊപ്ര മുതലായ ഉത്പന്നങ്ങള് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ വേണം. വൃക്ഷ വിളകൾ നട്ടു തുടങ്ങാം. ഒട്ടു തൈകൾ നടുമ്പോള് ഒട്ടിച്ച ഭാഗം മണ്ണിനു മുകളിൽ ആയിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒട്ടിച്ച ഭാഗത്തിന് താഴെ നിന്ന് വരുന്ന മൂളകള് നുളളിക്കളയണം. തടത്തിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കണം.

1 മൂന്നാം വിള പലയിടത്തും കൊയ്ത്തു തുടരുന്ന ജലലഭ്യത അനുസരിച്ച് ഒന്നാം വിളയിറക്കാൻ സമയമായി. നഴ്സറി തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ചതുരശ്ര മീറ്ററിനു ചുരുങ്ങിയത് 1കി.ഗ്രാം ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച ചാണകം/കമ്പോസ്റ്റ് മണ്ണിൽ നന്നായി ഇളക്കി ചേർക്കേണ്ടതാകുന്നു. പൊടിവിത ആണെങ്കില് പാടം ഉഴുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സെന്റിന് 20 കി.ഗ്രാം ജൈവ വളവും 1400 ഗ്രാം കുമ്മായവും ചേർത്ത് ഇളക്കണം. രോഗബാധ തടയുന്നതിനായി നടുന്നതിന് മുൻപ് വിത്ത് കുമിൾ നാശിനിയുമായി (1കി.ഗ്രാം വിത്തിന് 2 ഗ്രാം 'ബാവിസ്റ്റിൻ' അല്ലെങ്കില് 'സ്യൂഡോമോണാസ്' എന്ന

	<p>ജീവാണു 10 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തയ്യാർ ചെയ്യണം. ചെമ്പ്,നാകം എന്നീ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളുടെ കുറവ് നികത്താൻ വിത്ത് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ്+ 1/4% കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയിൽ 24 മണിക്കൂർ മുക്കിവെച്ച ശേഷം തണലിൽ ഉണക്കി വിതയ്ക്കുക.</p>
2	<p>പുതുതായി നടുന്ന തൈകൾക്ക് താങ്ങും തണലും നൽകണം. തെങ്ങിന് വളം ചേർക്കുവാൻ സമയമായി. തടം തുറന്ന് തെങ്ങ് ഒന്നിനു 1 കി.ഗ്രാം കുമ്മായം ചേർക്കണം. തുടർന്ന് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച ചാണകം/കമ്പോസ്റ്റ്/പച്ചില വളം (25 കി.ഗ്രാം),മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് (1/2കി.ഗ്രാം) എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. കുമ്മായം ചേർത്ത് മൂന്നാഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞാൽ രാസവളം നൽകിത്തുടങ്ങാം.</p>
3	<p>ഉണക്ക രോഗം ബാധിച്ച കൊമ്പുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി ബോർഡോകുഴമ്പ് പുരട്ടുക.</p>
4	<p>റോബസ്റ്റ്, പൂവൻ, പാളയംകോടന്, എന്നിവ നട്ടു തുടങ്ങാം. നേന്ത്രവാഴത്തോട്ടങ്ങളിൽ ഒടിഞ്ഞുതൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. നേന്ത്രവഴകളിന് താങ്ങു നൽകുവാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.</p>

