



ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ യൂണിറ്റ്
കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം കൊല്ലം

കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം

തീയതി: 11.10.2022

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	2022 ഒക്ടോബർ 12	2022 ഒക്ടോബർ 13	2022 ഒക്ടോബർ 14	2022 ഒക്ടോബർ 15	2022 ഒക്ടോബർ 16
മഴ (മില്ലി മീറ്റർ)	0.1	2	4	1	5
ഉയർന്ന താപനില (°C)	33	33	33	33	33
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	20	20	20	20	20
കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	90	90	90	90	90
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	70	70	70	70	70
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കി.മീ/മണിക്കൂർ)	2	2	2	2	2
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	250	270	270	270	230
അല സ്റ്റാപ്പിൾ മൂല്യം	4	4	6	4	8

മഴ മുനനിയിൽ

2022 ഒക്ടോബർ 11	2022 ഒക്ടോബർ 12	2022 ഒക്ടോബർ 13	2022 ഒക്ടോബർ 14	2022 ഒക്ടോബർ 15
മഴ (മില്ലി മീറ്റർ) സാമാന്യം	മഴ (മില്ലി മീറ്റർ) സാമാന്യം	മഴ (മില്ലി മീറ്റർ) സാമാന്യം	മഴ (മില്ലി മീറ്റർ) സാമാന്യം	മഴ (മില്ലി മീറ്റർ) സാമാന്യം
അനുയോജ്യമായ മഴ	അനുയോജ്യമായ മഴ	അനുയോജ്യമായ മഴ	അനുയോജ്യമായ മഴ	അനുയോജ്യമായ മഴ

കാലാവസ്ഥാ ഉള്ളടക്കം

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പൊതുവെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ജില്ലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട കൂടിയ താപനില 33.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു.

ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ അടുത്ത 5 ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 15 വരെ നേരിയതും സാമാന്യം മേഘമൂർച്ഛമായ മഴയില്ലാ (പച്ച അലൈൻ) സാധ്യത. കൂടിയ താപനില 33°C വരെയും കുറഞ്ഞ താപനില 20°C വരെയും ആകാൻ സാധ്യത.

40 - മത് കാലാവസ്ഥാ ആഴ്ചയുടെ (01.10.2022 to 07.10.2022) NDVI നീരീക്ഷണ ഫലപ്രകാരം ജില്ലയിലെ വിളകളുടെ ഊർജ്ജസ്വല നിലയിലാണ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഏരിൽ സയൻസിന്റെയും ഐ. ഐ. ഡിയുടെയും SP1 ഇൻഡക്സ് ഫലപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 2022 സെപ്റ്റംബർ 08 മുതൽ 2022 ഒക്ടോബർ 05 വരെ ജില്ലയിൽ വരണ്ട അവസ്ഥയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ

- > വളപ്രയോഗം കീടനാശിനി പ്രയോഗം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുകൂല കാലാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് നടത്താവുന്നതാണ്.
- > മരുന്ന് തളി നടത്തുമ്പോൾ അതിരാവിലെയോ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ വെയിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അനുവർത്തിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
- > വളപ്രയോഗം നടത്തിയ ശേഷം നന ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.

കാർഷികനിർദ്ദേശങ്ങൾ

ശീതകാല പച്ചക്കറികൾ (കോബോ, കോളിഫ്ലവർ)

- > ഒക്ടോബർ ആദ്യ വാരത്തിൽ വിത്തിട്ടു മുളപ്പിച്ച തൈകൾ നവംബർ ആദ്യവാരത്തോടെയാണ് പനിച്ചു നടയിൽ നടത്തേണ്ടത്. ഇതിനായി പനിച്ചു നടയിൽ നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രധാന കൃഷിയിടത്തിലെ നിലമൊരുക്കൽ ഇംഗ്ലീസ് ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ്.
- > നല്ല നീർവാർച്ചയുള്ളതും സൂര്യപകാശം ലഭിക്കുന്നതുമായ സ്ഥലം ആണ് ഇവയുടെ കൃഷിയിടമായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.
- > മണ്ണിലെ അളവേറിയ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നിലമൊരുക്കുമ്പോൾ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ 1 മുതൽ 2 കിടോ കൂടായം എന്ന തോതിൽ മണ്ണിൽ ചേർക്കണം.



നെല്ല്

- > മുണ്ടകൾ നെൽകൃഷിയിടമായി തൊട്ടടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കർഷകർ പനിച്ചു നടീലിനു 2 മുതൽ 3 ദിവസം മുൻപായി നെല്ലിൽ അടിയ്ക്കുന്ന കെ എ യു സമ്പുരീറ്റർ മൾട്ടിപിക്ട് 5 ഗ്രാം ഒരു ഹിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് തൊട്ടടിയിൽ തളിക്കണം.



വാഴ

- > മഴയെ തുടർന്ന് വാഴയിൽ സിഗട്ടോക ഇലകരിച്ചിരിക്കുന്ന സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ സ്യൂഡോമോണാസ് 20 ഗ്രാം ഒരു ഹിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ആഴപ്പയിൽ ഒരിക്കൽ ഇലകളിൽ തളിച്ച് കൊടുക്കുക.



കന്നുകാലികൾ

- > ബാഹ്യപരാദങ്ങളായ കൊതുക്, കടിയിച്ചുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപദ്രവം അയ്യുന്നതിനായി ചാണക കൂഴികളിൽ കൂടായം വിതരണം.
- > വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ബാഹ്യപരാദങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകൾ ചെയ്യുക.
- > പശു ആട് കോഴി എന്നിവയുടെ ശരീരഭാരത്തിനനുസരിച്ച് വിരമരുന്ന് നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

