

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

(ജൂൺ 29 – ജൂലൈ 05, 2023)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്റർ, മല്ലുത്തി – 680651

E-mail: cmannuthy@kau.in, Phone: 0487-2370773)

No. C3/4/2023 – 26

Dt. 27. 06.2023

ഇന്ത്യാച്ചർത്ത വിള പരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

മഴക്കാലത്ത് തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന കുമിൾരോഗമാണ് കുമ്പുചീയൽ. കാറു വീഴ്ച ബാധിച്ച തെങ്ങിന് തോട്ടങ്ങളിൽ കുമ്പുചീയൽ രോഗവും സാധാരണ കാണാറുണ്ട്. നടുനാമിന്റെ അഴുകിത്തുടങ്ങിയ ഭാഗം ചെത്തി മാറ്റി തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കുക. പിന്നീട് ബോർഡോ കുഴന്നു പൂരടി വെള്ളം ഇരങ്ങാത്തവിധം മണ്ണചട്ടികൊണ്ട് മുടിവായ്ക്കുക. കുടാതെ ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോർഡോമിശ്രിതം തെങ്ങാലകളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം. വർഷത്തിൽ 10 തേങ്ങയിലും കുറവു ലഭിക്കുന്ന തെങ്ങുകളും സാരമായ രോഗബാധയുള്ള തെങ്ങുകളും വെട്ടിമാറ്റി നശിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം രോഗപതിരോധശൈലിയും അത്യുല്പാദനശൈലിയുമുള്ള ഇനങ്ങളുടെ തെക്കൾ നടണം.

മുടി കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാൽ നെല്ലിൽ ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കാണാനിടയുണ്ട്. അതിനാൽ ഒരു ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിന് 2 സിസി ചെടുക്കാഗ്രഹം കാർബ് വീതം, ചെരു കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വയലിന്റെ പലഭാഗത്ത് ഓലയുടെ അടിഭാഗത്തായി സ്ഥാപിക്കുക. ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കാണുകയാണെങ്കിൽ 1 മില്ലി എൽജൂവെൻഡിയാമിഡ് 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ 3 മില്ലി ക്ലോറാന്ട്രനിലിപ്രോശ് 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു തളിക്കുക.

കുരുമുളകിന്റെ കൊടിത്തലകൾ ഇളക്കി വീണിട്ടുള്ളവ ഹിടിച്ചു കെട്ടണം. തന്നെ കുടിയാൽ പൊള്ളുവണ്ടിന്റെ ആക്രമണവും കുമിൾരോഗങ്ങളും കൂടും. തന്മുലം കായ പിടുത്തം കുറയും. അതുകൊണ്ട് താങ്ങുമരത്തിന്റെ ചില്ലകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി കഴിയുന്നതെ സുരൂപ്രകാശം കൊടിയിൽ പതിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യം ചെയ്യണം. കുരുമുളകു തോട്ടങ്ങളിൽ ദ്രുതവാട്ടത്തിനെതിരെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം. ദ്രുതവാട്ടം വന്ന ഉണ്ടായിരുമായ വള്ളികൾ മുറിച്ചു മാറ്റി തീയിട്ടുനശിപ്പിക്കണം. ദ്രുതവാട്ടത്തിനെതിരെ ചെടുക്കാശെൻമു എന്ന കുമിളിന്റെ കർച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മലപ്രദമായി തിരുത്താം. ഒരു കിലോഗ്രാം ചെടുക്കാശെൻമു 10 കിലോ ശ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, 90 കിലോഗ്രാം ഉണക്കിപ്പോടിച്ച ചാണകം എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ല തണലുള്ളതും വെള്ളം കയറാത്തതുമായ സ്ഥലത്ത് കുട്ടിക്കലർത്തി രണ്ടാഴ്ചയിടുക. ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കികൊടുക്കുകയും, ചെറിയ ഇന്തർപ്പം നിലനിർത്താൻ വെള്ളം തളിയ്ക്കുകയും വേണം. ഈ മിശ്രിതം കുരുമുളക് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ വാട്ടരോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സ്വീഡോമോണാസ് ഒരു കിലോഗ്രാം 20

കിലോഗ്രാം ചാണകപ്പൊടിയുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതും രോഗം നിയ ന്റിക്കാൻ സഹായിക്കും.

വാഴയിൽ പിണ്ടിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം തടയുന്നതിനായി പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. വണ്ണുകൾ ചെടിയുടെ അവസ്ഥിഷ്ട ഭാഗങ്ങളിലും അഴുകിയ വസ്തുകളിലുമാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ ആക്രമണം തടയുന്നതിന് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് കൂഷിയിടം വൃത്തിയാക്കി വെയ്ക്കുക എന്നതാണ്. വാഴയിൽ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും വേപ്പിന് സത്തടങ്ങിയ കീടനാശിനിരൂപികകൾ (1%) 4 മി.ലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ള തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി വാഴയുടെ തടാകത്തും ഇലകവീളുകളിലും തജിക്കുന്നത് നല്കാം. ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോർപ്പോറേഷൻ എന്ന കീടനാശിനി 2.5 മിലി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലെന്ന തോതിൽ കലക്കി ഇലകവീളിൽ ഒഴികുക. നേന്ത്രവാഴയ്ക്ക് ചിലയിടങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയമുലം ഉണ്ടാകുന്ന മാണം അഴുകൽ രോഗം കാണുന്നുണ്ട്. വാഴയുടെ ഇലകൾ മഞ്ഞളിക്കുകയും വാഴക്കൈകൾ ഓയുകയും ക്രമേണ വാഴ കടയോടെ മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യും. വാഴയുടെ മാണം ചീഞ്ഞത് അഴുകിയ തായും കാണാം. മണ്ണിലും ദയാം രോഗം പകരുന്നത് എന്നതു കൊണ്ട് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നീർവാർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തണം. ബീച്ചിംഗ് പരിധി ഒരു ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ വാഴയോനിന് 5 ലിറ്റർ എന്ന കണക്കിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.

പച്ചകരികളിൽ ആമവണ്ടിനെ കാണാനിടയുണ്ട്. പുഴു ബാധിച്ച ഇലകൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയതിനു ശേഷം 2% വീരുമുള്ള വേപ്പേണ്ണ എമർഷൻ തജികുക. പച്ചകരികളിൽ ഇല പേനിന്നേയും മണ്ഡിയും ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കാൻ ബിവേറിയ 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തജികുക.

ഒഴ്ഘ്/-
പ്രോഫസർ & ഫെല്ല